

SCHEDA
1 **AIDS**
AIDS

VOLUME DI ATTIVITÀ OSPEDALIERA			
ESITO	MORTALITÀ OSPEDALIERA O A 30 GIORNI	USO DI FARMACI RETROVIRALI	PROFILASSI PER PNEUMOCYSTIS CARINI PNEUMONIA
n. studi (n. partecipanti)	14 (111.197) *	2 (1.997)	4 (4.493)
n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)	9 (106.583) *	2 (1.997)	1 (229)
Cut-off ad alto volume (casi/anno) range: media: mediana:	30-1.000 ** 387,6 270	16	230-1.100 *** 665 665
Metanalisi n. studi (n. partecipanti) Odds Ratio (IC95%) Cut-off ad alto volume (casi/anno)	Handford 2011 10 (65.760) 0,71 (0,57-0,90) 31	Handford 2011 2 (1.997) 4,41 (2,70-7,19) 16	
* Dato mancante per 1 studio / <i>Missing data from 1 study</i> ** Dato mancante per 4 studi / <i>Missing data from 4 studies</i> *** Dato mancante per 2 studi / <i>Missing data from 2 studies</i>			

Tabella 1. AIDS; risultati della revisione sistematica.

Table 1. AIDS; systematic review results.

In Italia, nel 2011 risultano 163 le strutture con almeno 3 casi annui che svolgono attività assistenziale in pazienti con AIDS; di queste, 13 hanno un volume di attività annuo superiore ai 100 casi. La numerosità dei casi osservati, unitamente ai problemi di validità nella misura della gravità della condizione, non permettono un'analisi empirica dell'associazione tra volume ed esito.

AIDS. DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI STRUTTURE PER VOLUME DI ATTIVITÀ




Figura 1. AIDS. Distribuzione del numero di strutture per volume di attività, Italia 2011.

Figure 1. AIDS; distribution of the facilities by volume of activity, Italy 2011.