

SCHEDA
3

Aneurisma dell'aorta addominale rotto

Ruptured abdominal aortic aneurysm

VOLUME DI ATTIVITÀ OSPEDALIERA	
ESITO	MORTALITÀ OSPEDALIERA O A 30 GIORNI
n. studi (n. partecipanti)	19 (38.101) *
n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)	11 (24.988) *
Cut-off ad alto volume (casi/anno)	range: 2-100 media: 25 mediana: 20
Metanalisi	Holt 2007
n. studi (n. partecipanti)	12 (29.100)
Odds Ratio (IC95%)	0,78 (0,73-0,82)
Cut-off ad alto volume (casi/anno)	43

* Dato che molti studi non riportavano i dati separati per ospedale e per chirurgo, si è deciso di riportare i valori in questo modo; il cut-off si riferisce ai soli dati ospedalieri.
Many studies did not report separated data related to hospital and surgeon, so values are shown in the same way; the cut-off is related only to hospital data.

Tabella 3. Aneurisma dell'aorta addominale rotto; risultati della revisione sistematica.

Table 3. Ruptured abdominal aortic aneurysm; systematic review results.

In Italia, nel 2011 risultano 113 strutture con almeno 3 casi annui. Il volume medio di attività annuo è pari a 7 con uno scarto interquartile di 6; solo una struttura (0,9%) presenta un volume di attività annuo superiore ai 30 casi.

La numerosità dei casi osservati e la rarità dell'esito misurabile attraverso i sistemi informativi correnti non permettono un'analisi empirica dell'associazione tra volume ed esito.

ANEURISMA DELL'AORTA ADDOMINALE ROTTO.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI STRUTTURE PER VOLUME DI ATTIVITÀ




Figura 3.1. Aneurisma dell'aorta addominale rotto; distribuzione del numero di strutture per volume di attività, Italia 2011.

Figure 3.1. Ruptured abdominal aortic aneurysm; distribution of the facilities by volume of activity, Italy 2011.