



Emorragia subaracnoidea

Subarachnoid hemorrhage

VOLUME DI ATTIVITÀ OSPEDALIERA		
ESITO		MORTALITÀ OSPEDALIERA O A 30 GIORNI
n. studi (n. partecipanti)		8 (120.774) *
n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)		6 (117.186) **
Cut-off ad alto volume (casi/anno)	range: media: mediana:	15-49 * 31,6 30
* Dato mancante per 2 studi / Missing data from 2 studies ** Dato mancante per 1 studio / Missing data from 1 study		

Tabella 20. Emorragia subaracnoidea; risultati della revisione sistematica.
Table 20. Subarachnoid hemorrhage; systematic review results.

In Italia, nel 2011 risultano 446 strutture con almeno 3 interventi annui. Il volume medio di attività annuo è pari a 7, con uno scarto interquartile di 13; 6 strutture (1,3%) hanno un volume di attività annuo superiore ai 100 interventi.

EMORRAGIA SUBARACNOIDEA. DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI STRUTTURE PER VOLUME DI ATTIVITÀ




Figura 20.1. Emorragia subaracnoidea; distribuzione del numero di strutture per volume di attività, Italia 2011.
Figure 20.1. Subarachnoid hemorrhage; distribution of facilities by volume of activity, Italy 2011.