

**MORTALITÀ per MESOTELIOMA secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	174	3.116.418	6,4 (5,5-7,5)
1982-1991	128	3.032.331	4,1 (3,4-5,0)
1992-2001	168	2.987.046	4,9 (4,2-5,7)
2002-2011	171	3.120.488	4,1 (3,5-4,8)

**MORTALITÀ per AIDS secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	0	3.116.418	0,0 (0,0-0,0)
1982-1991	66	3.032.331	2,2 (1,7-2,8)
1992-2001	384	2.987.046	13,6 (12,3-15,0)
2002-2011	138	3.120.488	4,8 (4,0-5,6)

**MORTALITÀ per CAUSE DROGA-CORRELATE secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	10	3.116.418	0,3 (0,1-0,6)
1982-1991	69	3.032.331	2,3 (1,8-3,0)
1992-2001	199	2.987.046	7,0 (6,0-8,0)
2002-2011	178	3.120.488	6,2 (5,3-7,2)

**MORTALITÀ per MESOTELIOMA secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	122	3.633.446	3,1 (2,5-3,7)
1982-1991	103	3.562.652	2,1 (1,7-2,6)
1992-2001	107	3.466.312	2,0 (1,6-2,5)
2002-2011	114	3.570.499	1,9 (1,6-2,4)

**MORTALITÀ per TUMORI della CERVICЕ secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	174	3.633.446	4,8 (4,1-5,5)
1982-1991	154	3.562.652	3,8 (3,2-4,5)
1992-2001	127	3.466.312	2,8 (2,3-3,4)
2002-2011	84	3.570.499	1,9 (1,5-2,4)

**MORTALITÀ per AIDS secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	0	3.633.446	0,0 (0,0-0,0)
1982-1991	9	3.562.652	0,3 (0,1-0,5)
1992-2001	83	3.466.312	2,9 (2,3-3,6)
2002-2011	32	3.570.499	1,1 (0,8-1,6)

**MORTALITÀ per CAUSE DROGA-CORRELATE secondo il periodo di calendario**

Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)
1972-1981	4	3.633.446	0,1 (0,0-0,3)
1982-1991	15	3.562.652	0,5 (0,3-0,8)
1992-2001	41	3.466.312	1,4 (1,0-1,9)
2002-2011	46	3.570.499	1,5 (1,0-2,0)