

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 1.412 | 497.959 | 299,0 (283,5-315,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 446 | 141.208 | 282,0 (256,0-310,3) | 0,94 (0,85-1,05) | -27,0 |
| | Disagiata | 2.282 | 685.018 | 348,7 (334,3-363,5) | 1,16 (1,08-1,24) | 312,8 |
| 1977-1981 | Agiata | 1.283 | 495.612 | 263,7 (249,4-278,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 356 | 131.706 | 233,9 (210,1-260,1) | 0,90 (0,80-1,01) | -39,4 |
| | Disagiata | 2.001 | 691.598 | 318,1 (304,3-332,5) | 1,20 (1,12-1,29) | 334,5 |
| 1982-1986 | Agiata | 1.179 | 470.838 | 241,4 (227,7-255,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 717 | 234.098 | 253,0 (234,4-273,1) | 1,04 (0,97-1,12) | 28,3 |
| | Disagiata | 1.761 | 599.103 | 298,1 (284,3-312,3) | 1,24 (1,16-1,31) | 335,1 |
| 1987-1991 | Agiata | 1.067 | 447.948 | 210,7 (198,1-224,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 564 | 217.023 | 205,3 (188,0-224,1) | 0,98 (0,89-1,09) | -11,2 |
| | Disagiata | 1.567 | 581.612 | 267,9 (254,7-281,5) | 1,28 (1,18-1,38) | 343,1 |
| 1992-1996 | Agiata | 922 | 427.269 | 188,2 (176,1-201,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 828 | 346.296 | 200,8 (186,9-215,5) | 1,07 (0,97-1,17) | 52,8 |
| | Disagiata | 1.029 | 401.830 | 251,5 (236,2-267,6) | 1,34 (1,22-1,46) | 258,3 |
| 1997-2001 | Agiata | 844 | 411.461 | 175,1 (163,2-187,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 685 | 326.831 | 182,3 (168,5-197,0) | 1,05 (0,95-1,16) | 30,8 |
| | Disagiata | 866 | 396.826 | 221,4 (206,8-236,8) | 1,27 (1,16-1,40) | 185,0 |
| 2002-2006 | Agiata | 677 | 378.884 | 153,3 (141,8-165,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 760 | 379.309 | 177,7 (165,0-191,2) | 1,15 (1,03-1,27) | 97,9 |
| | Disagiata | 586 | 268.016 | 234,3 (215,5-254,3) | 1,53 (1,37-1,71) | 202,5 |
| 2007-2011 | Agiata | 577 | 329.498 | 142,3 (130,6-155,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 577 | 324.843 | 154,5 (141,9-168,2) | 1,06 (0,95-1,19) | 34,8 |
| | Disagiata | 511 | 237.818 | 216,9 (198,4-236,8) | 1,52 (1,35-1,71) | 174,5 |

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 666 | 497.959 | 141,0 (130,4-152,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 205 | 141.208 | 130,5 (113,0-150,4) | 0,92 (0,79-1,08) | -17,3 |
| | Disagiata | 968 | 685.018 | 150,0 (140,6-160,0) | 1,05 (0,95-1,16) | 46,5 |
| 1977-1981 | Agiata | 631 | 495.612 | 127,6 (117,8-138,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 178 | 131.706 | 116,7 (100,1-135,8) | 0,92 (0,78-1,09) | -15,2 |
| | Disagiata | 840 | 691.598 | 133,1 (124,2-142,5) | 1,03 (0,93-1,14) | 26,5 |
| 1982-1986 | Agiata | 649 | 470.838 | 132,3 (122,3-143,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 380 | 234.098 | 132,1 (118,9-146,7) | 1,00 (0,90-1,11) | 1,2 |
| | Disagiata | 835 | 599.103 | 142,2 (132,7-152,2) | 1,07 (0,99-1,17) | 56,4 |
| 1987-1991 | Agiata | 629 | 447.948 | 123,6 (114,0-133,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 309 | 217.023 | 112,0 (99,4-126,1) | 0,92 (0,82-1,03) | -25,9 |
| | Disagiata | 771 | 581.612 | 132,4 (123,2-142,1) | 1,08 (0,99-1,18) | 55,7 |
| 1992-1996 | Agiata | 531 | 427.269 | 107,0 (98,0-116,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 461 | 346.296 | 110,3 (100,2-121,3) | 1,03 (0,92-1,15) | 14,5 |
| | Disagiata | 490 | 401.830 | 120,1 (109,6-131,4) | 1,12 (1,00-1,25) | 52,3 |
| 1997-2001 | Agiata | 539 | 411.461 | 110,8 (101,4-120,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 413 | 326.831 | 108,9 (98,4-120,3) | 1,00 (0,89-1,12) | -1,3 |
| | Disagiata | 452 | 396.826 | 117,2 (106,6-128,6) | 1,06 (0,95-1,18) | 24,4 |
| 2002-2006 | Agiata | 454 | 378.884 | 102,7 (93,3-112,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 470 | 379.309 | 110,0 (100,1-120,7) | 1,06 (0,93-1,21) | 27,4 |
| | Disagiata | 289 | 268.016 | 116,5 (103,4-131,0) | 1,13 (0,98-1,31) | 33,8 |
| 2007-2011 | Agiata | 397 | 329.498 | 97,6 (88,0-108,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 356 | 324.843 | 93,9 (84,2-104,7) | 0,96 (0,83-1,10) | -16,5 |
| | Disagiata | 274 | 237.818 | 116,3 (102,9-131,1) | 1,19 (1,02-1,39) | 43,3 |

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 15 | 497.959 | 3,2 (1,8-5,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 3 | 141.208 | 2,0 (0,4-6,7) | 0,58 (0,17-2,01) | -2,2 |
| | Disagiata | 16 | 685.018 | 2,5 (1,4-4,2) | 0,76 (0,37-1,54) | -5,1 |
| 1977-1981 | Agiata | 9 | 495.612 | 1,7 (0,8-3,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 2 | 131.706 | 1,3 (0,2-5,8) | 0,74 (0,16-3,42) | -0,7 |
| | Disagiata | 8 | 691.598 | 1,3 (0,6-2,6) | 0,68 (0,26-1,77) | -3,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 17 | 470.838 | 3,5 (2,0-5,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 3 | 234.098 | 0,9 (0,2-3,6) | 0,28 (0,12-0,64) | -7,8 |
| | Disagiata | 22 | 599.103 | 3,7 (2,3-5,6) | 1,05 (0,68-1,61) | 1,0 |
| 1987-1991 | Agiata | 17 | 447.948 | 3,5 (2,0-5,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 217.023 | 2,7 (1,1-6,3) | 0,76 (0,32-1,84) | -2,2 |
| | Disagiata | 20 | 581.612 | 3,4 (2,1-5,3) | 1,02 (0,53-1,94) | 0,3 |
| 1992-1996 | Agiata | 16 | 427.269 | 3,2 (1,8-5,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 10 | 346.296 | 2,5 (1,2-4,8) | 0,74 (0,33-1,63) | -3,6 |
| | Disagiata | 13 | 401.830 | 3,1 (1,7-5,5) | 0,95 (0,46-1,99) | -0,6 |
| 1997-2001 | Agiata | 10 | 411.461 | 2,1 (1,0-4,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 4 | 326.831 | 1,0 (0,3-2,9) | 0,52 (0,21-1,29) | -3,6 |
| | Disagiata | 16 | 396.826 | 4,2 (2,4-6,9) | 2,06 (1,12-3,80) | 8,2 |
| 2002-2006 | Agiata | 13 | 378.884 | 2,7 (1,4-4,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 10 | 379.309 | 2,4 (1,1-4,5) | 0,77 (0,41-1,45) | -3,0 |
| | Disagiata | 7 | 268.016 | 2,7 (1,1-5,8) | 0,97 (0,48-1,97) | -0,2 |
| 2007-2011 | Agiata | 6 | 329.498 | 1,4 (0,5-3,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 6 | 324.843 | 1,6 (0,6-4,0) | 1,07 (0,34-3,31) | 0,4 |
| | Disagiata | 11 | 237.818 | 4,7 (2,3-8,6) | 3,41 (1,26-9,24) | 7,8 |

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 30 | 497.959 | 6,4 (4,3-9,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 141.208 | 10,0 (5,7-17,0) | 1,51 (0,82-2,78) | 5,4 |
| | Disagiata | 61 | 685.018 | 9,3 (7,1-12,1) | 1,41 (0,91-2,18) | 17,8 |
| 1977-1981 | Agiata | 29 | 495.612 | 6,1 (4,1-8,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 9 | 131.706 | 6,0 (2,7-12,2) | 1,00 (0,47-2,11) | 0,0 |
| | Disagiata | 58 | 691.598 | 9,3 (7,1-12,0) | 1,54 (0,99-2,41) | 20,4 |
| 1982-1986 | Agiata | 30 | 470.838 | 6,1 (4,1-8,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 22 | 234.098 | 8,0 (4,9-12,7) | 1,27 (0,73-2,21) | 4,7 |
| | Disagiata | 32 | 599.103 | 5,4 (3,7-7,7) | 0,88 (0,54-1,46) | -4,2 |
| 1987-1991 | Agiata | 21 | 447.948 | 4,1 (2,5-6,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 217.023 | 5,6 (3,1-9,8) | 1,44 (0,83-2,49) | 4,9 |
| | Disagiata | 36 | 581.612 | 6,1 (4,3-8,5) | 1,48 (0,94-2,33) | 11,7 |
| 1992-1996 | Agiata | 20 | 427.269 | 4,0 (2,4-6,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 20 | 346.296 | 4,0 (2,4-6,5) | 1,14 (0,61-2,13) | 2,5 |
| | Disagiata | 24 | 401.830 | 6,2 (3,9-9,2) | 1,41 (0,78-2,55) | 7,0 |
| 1997-2001 | Agiata | 13 | 411.461 | 2,6 (1,4-4,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 18 | 326.831 | 4,6 (2,7-7,6) | 1,79 (0,59-5,40) | 7,9 |
| | Disagiata | 25 | 396.826 | 6,5 (4,2-9,7) | 2,43 (0,85-6,99) | 14,7 |
| 2002-2006 | Agiata | 19 | 378.884 | 4,1 (2,5-6,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 14 | 379.309 | 3,5 (1,9-6,0) | 0,75 (0,38-1,49) | -4,7 |
| | Disagiata | 7 | 268.016 | 2,8 (1,1-5,9) | 0,62 (0,26-1,48) | -4,3 |
| 2007-2011 | Agiata | 21 | 329.498 | 5,0 (3,0-8,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 14 | 324.843 | 4,0 (2,2-7,1) | 0,71 (0,36-1,39) | -5,8 |
| | Disagiata | 14 | 237.818 | 6,0 (3,3-10,3) | 1,09 (0,55-2,15) | 1,1 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 52 | 497.959 | 11,2 (8,3-14,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 22 | 141.208 | 13,8 (8,6-21,6) | 1,21 (0,78-1,87) | 3,8 |
| | Disagiata | 57 | 685.018 | 8,8 (6,7-11,5) | 0,77 (0,56-1,08) | -16,6 |
| 1977-1981 | Agiata | 50 | 495.612 | 10,3 (7,6-13,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 12 | 131.706 | 8,0 (4,1-14,8) | 0,75 (0,40-1,42) | -3,9 |
| | Disagiata | 50 | 691.598 | 8,1 (6,0-10,7) | 0,78 (0,53-1,16) | -13,9 |
| 1982-1986 | Agiata | 30 | 470.838 | 6,1 (4,1-8,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 34 | 234.098 | 11,5 (7,9-16,7) | 1,85 (1,35-2,53) | 15,6 |
| | Disagiata | 55 | 599.103 | 9,3 (7,0-12,1) | 1,52 (1,14-2,02) | 18,8 |
| 1987-1991 | Agiata | 41 | 447.948 | 7,8 (5,6-10,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 18 | 217.023 | 6,0 (3,5-10,1) | 0,79 (0,46-1,38) | -4,7 |
| | Disagiata | 42 | 581.612 | 7,0 (5,1-9,6) | 0,90 (0,58-1,38) | -4,9 |
| 1992-1996 | Agiata | 51 | 427.269 | 10,0 (7,4-13,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 39 | 346.296 | 9,3 (6,5-13,0) | 0,90 (0,65-1,24) | -4,4 |
| | Disagiata | 37 | 401.830 | 9,1 (6,4-12,7) | 0,89 (0,64-1,23) | -4,7 |
| 1997-2001 | Agiata | 45 | 411.461 | 9,2 (6,6-12,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 28 | 326.831 | 7,5 (4,9-11,0) | 0,81 (0,56-1,18) | -6,4 |
| | Disagiata | 31 | 396.826 | 8,1 (5,5-11,6) | 0,87 (0,61-1,25) | -4,7 |
| 2002-2006 | Agiata | 31 | 378.884 | 6,8 (4,6-9,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 37 | 379.309 | 8,4 (5,9-11,8) | 1,23 (0,84-1,80) | 6,8 |
| | Disagiata | 18 | 268.016 | 7,3 (4,3-11,7) | 1,06 (0,67-1,70) | 1,1 |
| 2007-2011 | Agiata | 32 | 329.498 | 7,8 (5,3-11,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 29 | 324.843 | 7,9 (5,2-11,7) | 0,97 (0,58-1,60) | -1,0 |
| | Disagiata | 17 | 237.818 | 7,1 (4,1-11,6) | 0,92 (0,51-1,65) | -1,6 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 23 | 497.959 | 4,8 (3,1-7,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 10 | 141.208 | 6,5 (3,1-12,8) | 1,32 (0,63-2,78) | 2,4 |
| | Disagiata | 27 | 685.018 | 4,0 (2,6-6,0) | 0,84 (0,48-1,46) | -5,2 |
| 1977-1981 | Agiata | 17 | 495.612 | 3,4 (2,0-5,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 5 | 131.706 | 3,3 (1,0-8,6) | 0,96 (0,35-2,61) | -0,2 |
| | Disagiata | 28 | 691.598 | 4,5 (3,0-6,5) | 1,28 (0,70-2,34) | 6,1 |
| 1982-1986 | Agiata | 26 | 470.838 | 5,3 (3,5-7,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 10 | 234.098 | 3,3 (1,6-6,8) | 0,65 (0,40-1,04) | -5,5 |
| | Disagiata | 29 | 599.103 | 4,9 (3,3-7,1) | 0,92 (0,65-1,29) | -2,7 |
| 1987-1991 | Agiata | 15 | 447.948 | 2,9 (1,6-4,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 10 | 217.023 | 3,6 (1,7-7,3) | 1,22 (0,81-1,82) | 1,8 |
| | Disagiata | 19 | 581.612 | 3,3 (2,0-5,2) | 1,08 (0,77-1,52) | 1,4 |
| 1992-1996 | Agiata | 14 | 427.269 | 2,8 (1,5-5,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 346.296 | 3,6 (2,0-6,1) | 1,35 (0,74-2,49) | 4,2 |
| | Disagiata | 15 | 401.830 | 3,9 (2,2-6,4) | 1,29 (0,69-2,39) | 3,3 |
| 1997-2001 | Agiata | 15 | 411.461 | 3,3 (1,8-5,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 326.831 | 1,5 (0,6-3,5) | 0,61 (0,25-1,49) | -4,5 |
| | Disagiata | 16 | 396.826 | 4,2 (2,4-6,9) | 1,36 (0,67-2,76) | 4,3 |
| 2002-2006 | Agiata | 11 | 378.884 | 2,7 (1,3-5,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 13 | 379.309 | 3,2 (1,7-5,6) | 1,23 (0,55-2,74) | 2,4 |
| | Disagiata | 11 | 268.016 | 4,3 (2,1-7,9) | 1,77 (0,76-4,08) | 4,8 |
| 2007-2011 | Agiata | 7 | 329.498 | 1,6 (0,6-3,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 8 | 324.843 | 2,0 (0,8-4,4) | 1,22 (0,44-3,35) | 1,4 |
| | Disagiata | 9 | 237.818 | 3,6 (1,7-7,2) | 2,40 (0,89-6,47) | 5,3 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 15 | 497.959 | 3,4 (1,9-5,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 6 | 141.208 | 3,8 (1,4-9,1) | 1,16 (0,50-2,69) | 0,8 |
| | Disagiata | 21 | 685.018 | 3,3 (2,0-5,1) | 0,99 (0,55-1,78) | -0,2 |
| 1977-1981 | Agiata | 6 | 495.612 | 1,2 (0,5-2,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 5 | 131.706 | 3,3 (1,1-8,6) | 2,63 (0,92-7,55) | 3,1 |
| | Disagiata | 22 | 691.598 | 3,6 (2,3-5,5) | 2,86 (1,28-6,37) | 14,3 |
| 1982-1986 | Agiata | 15 | 470.838 | 3,0 (1,7-5,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 14 | 234.098 | 4,8 (2,6-8,7) | 1,57 (0,76-3,26) | 5,1 |
| | Disagiata | 14 | 599.103 | 2,4 (1,3-4,0) | 0,76 (0,37-1,58) | -4,3 |
| 1987-1991 | Agiata | 8 | 447.948 | 1,5 (0,6-3,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 10 | 217.023 | 3,0 (1,4-6,3) | 2,19 (0,86-5,55) | 5,4 |
| | Disagiata | 29 | 581.612 | 4,9 (3,3-7,1) | 3,19 (1,46-6,99) | 19,9 |
| 1992-1996 | Agiata | 6 | 427.269 | 1,2 (0,4-2,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 11 | 346.296 | 2,2 (1,1-4,3) | 2,00 (0,45-8,94) | 5,5 |
| | Disagiata | 13 | 401.830 | 2,9 (1,6-5,2) | 2,55 (0,60-10,94) | 7,9 |
| 1997-2001 | Agiata | 11 | 411.461 | 2,1 (1,0-4,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 8 | 326.831 | 2,0 (0,8-4,2) | 0,92 (0,48-1,76) | -0,7 |
| | Disagiata | 11 | 396.826 | 2,7 (1,3-4,9) | 1,28 (0,71-2,34) | 2,4 |
| 2002-2006 | Agiata | 10 | 378.884 | 2,3 (1,1-4,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 11 | 379.309 | 2,4 (1,2-4,5) | 1,11 (0,47-2,63) | 1,1 |
| | Disagiata | 7 | 268.016 | 2,8 (1,1-6,0) | 1,28 (0,48-3,36) | 1,5 |
| 2007-2011 | Agiata | 8 | 329.498 | 1,9 (0,8-4,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 324.843 | 1,7 (0,7-4,0) | 0,93 (0,34-2,55) | -0,6 |
| | Disagiata | 6 | 237.818 | 2,7 (1,0-6,1) | 1,30 (0,45-3,77) | 1,4 |

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 49 | 497.959 | 10,7 (7,9-14,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 141.208 | 4,1 (1,6-9,4) | 0,41 (0,19-0,91) | -10,0 |
| | Disagiata | 59 | 685.018 | 9,4 (7,1-12,1) | 0,85 (0,58-1,24) | -10,6 |
| 1977-1981 | Agiata | 53 | 495.612 | 11,1 (8,3-14,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 15 | 131.706 | 10,1 (5,6-17,4) | 0,88 (0,57-1,36) | -2,0 |
| | Disagiata | 53 | 691.598 | 8,6 (6,5-11,3) | 0,78 (0,59-1,04) | -14,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 66 | 470.838 | 13,4 (10,4-17,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 22 | 234.098 | 6,9 (4,3-11,1) | 0,56 (0,34-0,90) | -17,5 |
| | Disagiata | 61 | 599.103 | 10,5 (8,1-13,5) | 0,78 (0,55-1,10) | -17,7 |
| 1987-1991 | Agiata | 54 | 447.948 | 10,4 (7,8-13,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 23 | 217.023 | 8,2 (5,1-12,9) | 0,79 (0,49-1,29) | -6,0 |
| | Disagiata | 73 | 581.612 | 12,5 (9,8-15,8) | 1,22 (0,86-1,74) | 13,2 |
| 1992-1996 | Agiata | 50 | 427.269 | 9,9 (7,3-13,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 39 | 346.296 | 9,5 (6,7-13,3) | 0,92 (0,60-1,40) | -3,5 |
| | Disagiata | 52 | 401.830 | 12,5 (9,3-16,4) | 1,26 (0,85-1,86) | 10,8 |
| 1997-2001 | Agiata | 53 | 411.461 | 10,2 (7,6-13,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 28 | 326.831 | 6,9 (4,6-10,3) | 0,69 (0,46-1,02) | -12,9 |
| | Disagiata | 40 | 396.826 | 10,2 (7,3-14,0) | 1,00 (0,70-1,43) | 0,0 |
| 2002-2006 | Agiata | 66 | 378.884 | 14,8 (11,4-19,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 48 | 379.309 | 11,3 (8,3-15,1) | 0,75 (0,52-1,09) | -16,0 |
| | Disagiata | 43 | 268.016 | 17,7 (12,7-23,9) | 1,18 (0,80-1,73) | 6,5 |
| 2007-2011 | Agiata | 52 | 329.498 | 12,9 (9,6-17,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 43 | 324.843 | 11,3 (8,1-15,6) | 0,89 (0,59-1,33) | -5,5 |
| | Disagiata | 44 | 237.818 | 18,6 (13,5-25,2) | 1,48 (0,99-2,22) | 14,3 |

MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 185 | 497.959 | 38,5 (33,1-44,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 63 | 141.208 | 40,9 (31,3-53,0) | 1,05 (0,79-1,40) | 3,1 |
| | Disagiata | 276 | 685.018 | 43,0 (38,0-48,5) | 1,10 (0,91-1,33) | 25,6 |
| 1977-1981 | Agiata | 199 | 495.612 | 39,4 (34,1-45,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 57 | 131.706 | 37,2 (28,1-48,8) | 0,95 (0,67-1,33) | -3,3 |
| | Disagiata | 248 | 691.598 | 38,5 (33,8-43,7) | 0,98 (0,77-1,26) | -4,5 |
| 1982-1986 | Agiata | 201 | 470.838 | 40,9 (35,4-47,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 109 | 234.098 | 39,3 (32,1-47,9) | 0,96 (0,78-1,18) | -4,6 |
| | Disagiata | 241 | 599.103 | 41,4 (36,4-47,0) | 1,01 (0,86-1,19) | 2,8 |
| 1987-1991 | Agiata | 214 | 447.948 | 42,5 (36,9-48,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 92 | 217.023 | 33,7 (27,0-41,9) | 0,83 (0,65-1,05) | -19,4 |
| | Disagiata | 209 | 581.612 | 36,2 (31,5-41,5) | 0,86 (0,71-1,04) | -33,7 |
| 1992-1996 | Agiata | 172 | 427.269 | 35,0 (29,9-40,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 141 | 346.296 | 34,2 (28,6-40,6) | 0,99 (0,85-1,15) | -2,0 |
| | Disagiata | 147 | 401.830 | 36,3 (30,6-42,7) | 1,04 (0,89-1,21) | 5,6 |
| 1997-2001 | Agiata | 153 | 411.461 | 31,7 (26,8-37,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 120 | 326.831 | 32,2 (26,5-38,8) | 1,02 (0,83-1,27) | 2,9 |
| | Disagiata | 122 | 396.826 | 32,0 (26,5-38,3) | 0,99 (0,80-1,22) | -1,2 |
| 2002-2006 | Agiata | 123 | 378.884 | 28,6 (23,7-34,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 134 | 379.309 | 32,9 (27,4-39,1) | 1,12 (0,91-1,39) | 14,7 |
| | Disagiata | 76 | 268.016 | 30,9 (24,3-38,9) | 1,07 (0,84-1,38) | 5,2 |
| 2007-2011 | Agiata | 120 | 329.498 | 30,8 (25,4-37,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 102 | 324.843 | 27,3 (22,2-33,5) | 0,91 (0,70-1,18) | -10,6 |
| | Disagiata | 77 | 237.818 | 33,2 (26,2-41,7) | 1,07 (0,80-1,42) | 4,9 |

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 33 | 497.959 | 7,6 (5,2-10,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 4 | 141.208 | 2,7 (0,7-7,7) | 0,33 (0,12-0,94) | -8,0 |
| | Disagiata | 54 | 685.018 | 8,1 (6,1-10,7) | 1,13 (0,73-1,74) | 6,2 |
| 1977-1981 | Agiata | 20 | 495.612 | 4,3 (2,6-6,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 3 | 131.706 | 2,4 (0,5-7,8) | 0,45 (0,13-1,51) | -3,7 |
| | Disagiata | 54 | 691.598 | 9,1 (6,8-11,9) | 2,06 (1,23-3,43) | 27,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 12 | 470.838 | 2,4 (1,3-4,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 18 | 234.098 | 5,7 (3,4-9,7) | 2,30 (1,11-4,78) | 10,2 |
| | Disagiata | 20 | 599.103 | 3,3 (2,0-5,1) | 1,34 (0,65-2,73) | 5,0 |
| 1987-1991 | Agiata | 10 | 447.948 | 1,9 (0,9-3,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 12 | 217.023 | 4,4 (2,2-8,4) | 2,13 (0,92-4,93) | 6,4 |
| | Disagiata | 30 | 581.612 | 5,1 (3,5-7,3) | 2,65 (1,29-5,42) | 18,7 |
| 1992-1996 | Agiata | 13 | 427.269 | 2,6 (1,4-4,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 11 | 346.296 | 2,6 (1,3-4,9) | 0,95 (0,43-2,13) | -0,5 |
| | Disagiata | 20 | 401.830 | 4,6 (2,8-7,2) | 1,81 (0,90-3,64) | 8,9 |
| 1997-2001 | Agiata | 6 | 411.461 | 1,3 (0,4-3,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 8 | 326.831 | 2,0 (0,8-4,2) | 1,68 (0,66-4,27) | 3,2 |
| | Disagiata | 34 | 396.826 | 8,3 (5,7-11,7) | 7,35 (3,41-15,81) | 29,4 |
| 2002-2006 | Agiata | 10 | 378.884 | 2,2 (1,1-4,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 9 | 379.309 | 2,4 (1,1-4,6) | 0,95 (0,21-4,24) | -0,5 |
| | Disagiata | 13 | 268.016 | 5,1 (2,7-8,9) | 2,24 (0,56-9,01) | 7,2 |
| 2007-2011 | Agiata | 10 | 329.498 | 2,3 (1,1-4,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 324.843 | 1,6 (0,7-3,9) | 0,74 (0,28-1,94) | -2,5 |
| | Disagiata | 9 | 237.818 | 3,7 (1,7-7,3) | 1,66 (0,67-4,10) | 3,6 |

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 340 | 497.959 | 72,8 (65,2-81,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 113 | 141.208 | 69,6 (57,2-84,4) | 0,95 (0,81-1,12) | -5,4 |
| | Disagiata | 614 | 685.018 | 93,5 (86,2-101,4) | 1,27 (1,15-1,41) | 131,9 |
| 1977-1981 | Agiata | 324 | 495.612 | 68,2 (60,9-76,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 90 | 131.706 | 58,1 (46,7-72,0) | 0,87 (0,69-1,10) | -13,3 |
| | Disagiata | 529 | 691.598 | 85,6 (78,5-93,3) | 1,26 (1,10-1,45) | 109,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 230 | 470.838 | 46,8 (40,9-53,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 163 | 234.098 | 54,7 (46,5-64,4) | 1,16 (0,97-1,38) | 22,4 |
| | Disagiata | 455 | 599.103 | 76,6 (69,7-84,0) | 1,63 (1,42-1,88) | 176,6 |
| 1987-1991 | Agiata | 188 | 447.948 | 36,2 (31,1-41,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 104 | 217.023 | 35,3 (28,6-43,5) | 0,98 (0,77-1,25) | -1,7 |
| | Disagiata | 370 | 581.612 | 62,8 (56,6-69,6) | 1,75 (1,47-2,08) | 158,2 |
| 1992-1996 | Agiata | 155 | 427.269 | 31,0 (26,3-36,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 147 | 346.296 | 34,0 (28,6-40,3) | 1,11 (0,93-1,34) | 15,1 |
| | Disagiata | 231 | 401.830 | 56,2 (49,1-64,1) | 1,82 (1,54-2,14) | 103,9 |
| 1997-2001 | Agiata | 126 | 411.461 | 25,3 (21,0-30,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 91 | 326.831 | 23,4 (18,7-29,1) | 0,92 (0,71-1,21) | -7,4 |
| | Disagiata | 164 | 396.826 | 41,3 (35,1-48,2) | 1,63 (1,29-2,06) | 63,7 |
| 2002-2006 | Agiata | 77 | 378.884 | 16,9 (13,3-21,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 110 | 379.309 | 25,0 (20,4-30,3) | 1,45 (1,08-1,94) | 34,1 |
| | Disagiata | 122 | 268.016 | 48,6 (40,3-58,2) | 2,88 (2,17-3,84) | 79,7 |
| 2007-2011 | Agiata | 60 | 329.498 | 14,1 (10,7-18,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 69 | 324.843 | 19,0 (14,6-24,4) | 1,23 (0,87-1,73) | 12,8 |
| | Disagiata | 88 | 237.818 | 37,5 (30,0-46,4) | 2,60 (1,87-3,62) | 54,2 |

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 43 | 497.959 | 21,9 (17,7-26,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 170 | 141.208 | 26,8 (19,3-36,8) | 1,23 (0,95-1,59) | 8,0 |
| | Disagiata | 114 | 685.018 | 26,2 (22,4-30,6) | 1,21 (1,01-1,44) | 28,9 |
| 1977-1981 | Agiata | 36 | 495.612 | 24,4 (20,1-29,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 163 | 131.706 | 23,1 (16,2-32,7) | 0,97 (0,73-1,31) | -1,0 |
| | Disagiata | 73 | 691.598 | 26,6 (22,7-31,0) | 1,11 (0,92-1,34) | 16,0 |
| 1982-1986 | Agiata | 56 | 470.838 | 14,8 (11,6-18,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 150 | 234.098 | 18,5 (13,9-24,6) | 1,24 (0,87-1,75) | 10,8 |
| | Disagiata | 61 | 599.103 | 25,2 (21,3-29,6) | 1,69 (1,28-2,24) | 61,3 |
| 1987-1991 | Agiata | 30 | 447.948 | 11,4 (8,7-14,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 104 | 217.023 | 10,1 (6,7-15,0) | 0,86 (0,56-1,33) | -4,8 |
| | Disagiata | 44 | 581.612 | 17,6 (14,4-21,4) | 1,54 (1,12-2,11) | 36,4 |
| 1992-1996 | Agiata | 39 | 427.269 | 8,6 (6,2-11,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 72 | 346.296 | 8,7 (6,1-12,1) | 1,03 (0,73-1,48) | 1,3 |
| | Disagiata | 31 | 401.830 | 17,5 (13,7-22,2) | 2,01 (1,47-2,74) | 36,1 |
| 1997-2001 | Agiata | 16 | 411.461 | 5,9 (4,0-8,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 40 | 326.831 | 3,9 (2,2-6,6) | 0,66 (0,36-1,21) | -8,2 |
| | Disagiata | 19 | 396.826 | 9,9 (7,0-13,5) | 1,70 (1,06-2,71) | 16,4 |
| 2002-2006 | Agiata | 25 | 378.884 | 3,9 (2,3-6,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 34 | 379.309 | 5,0 (3,2-7,6) | 1,31 (0,42-4,04) | 5,9 |
| | Disagiata | 16 | 268.016 | 13,7 (9,5-19,3) | 3,32 (1,15-9,63) | 23,8 |
| 2007-2011 | Agiata | 16 | 329.498 | 3,5 (2,0-6,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 23 | 324.843 | 4,6 (2,6-7,8) | 1,07 (0,54-2,14) | 1,1 |
| | Disagiata | | 237.818 | 9,5 (6,0-14,5) | 2,67 (1,41-5,07) | 14,4 |

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 108 | 497.959 | 23,1 (18,9-28,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 35 | 141.208 | 22,8 (15,7-32,4) | 0,93 (0,64-1,36) | -2,6 |
| | Disagiata | 179 | 685.018 | 27,1 (23,2-31,5) | 1,17 (0,92-1,48) | 25,7 |
| 1977-1981 | Agiata | 100 | 495.612 | 20,9 (17,0-25,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 30 | 131.706 | 19,6 (13,2-28,6) | 0,94 (0,63-1,42) | -1,8 |
| | Disagiata | 183 | 691.598 | 29,9 (25,7-34,5) | 1,41 (1,11-1,80) | 53,5 |
| 1982-1986 | Agiata | 75 | 470.838 | 15,2 (12,0-19,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 55 | 234.098 | 18,7 (14,0-24,9) | 1,21 (0,85-1,71) | 9,5 |
| | Disagiata | 142 | 599.103 | 23,8 (20,0-28,1) | 1,57 (1,19-2,07) | 51,4 |
| 1987-1991 | Agiata | 64 | 447.948 | 12,8 (9,8-16,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 36 | 217.023 | 12,1 (8,3-17,3) | 1,01 (0,67-1,52) | 0,4 |
| | Disagiata | 112 | 581.612 | 19,0 (15,6-22,9) | 1,52 (1,12-2,07) | 38,3 |
| 1992-1996 | Agiata | 55 | 427.269 | 11,3 (8,5-14,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 44 | 346.296 | 9,9 (7,1-13,5) | 0,92 (0,62-1,37) | -3,8 |
| | Disagiata | 66 | 401.830 | 15,8 (12,2-20,2) | 1,43 (1,00-2,05) | 20,0 |
| 1997-2001 | Agiata | 47 | 411.461 | 9,6 (7,0-13,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 30 | 326.831 | 7,8 (5,2-11,3) | 0,82 (0,52-1,29) | -6,8 |
| | Disagiata | 50 | 396.826 | 12,8 (9,5-17,0) | 1,31 (0,88-1,95) | 11,8 |
| 2002-2006 | Agiata | 25 | 378.884 | 5,7 (3,6-8,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 28 | 379.309 | 6,8 (4,5-10,1) | 1,14 (0,67-1,96) | 3,5 |
| | Disagiata | 43 | 268.016 | 17,1 (12,3-23,2) | 3,07 (1,87-5,04) | 29,0 |
| 2007-2011 | Agiata | 17 | 329.498 | 3,8 (2,2-6,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 19 | 324.843 | 5,5 (3,2-8,9) | 1,19 (0,62-2,29) | 3,0 |
| | Disagiata | 25 | 237.818 | 10,9 (7,1-16,3) | 2,55 (1,37-4,73) | 15,2 |

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 35 | 497.959 | 7,3 (5,1-10,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 14 | 141.208 | 8,0 (4,3-14,3) | 1,15 (0,62-2,13) | 1,8 |
| | Disagiata | 81 | 685.018 | 11,7 (9,3-14,7) | 1,61 (1,08-2,40) | 30,8 |
| 1977-1981 | Agiata | 24 | 495.612 | 5,1 (3,3-7,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 131.706 | 4,5 (1,8-10,2) | 0,91 (0,44-1,87) | -0,7 |
| | Disagiata | 54 | 691.598 | 8,8 (6,6-11,5) | 1,72 (1,14-2,60) | 22,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 23 | 470.838 | 4,7 (3,0-7,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 20 | 234.098 | 6,9 (4,1-11,2) | 1,46 (0,80-2,66) | 6,3 |
| | Disagiata | 50 | 599.103 | 8,5 (6,3-11,2) | 1,79 (1,09-2,93) | 22,1 |
| 1987-1991 | Agiata | 17 | 447.948 | 3,7 (2,1-6,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 11 | 217.023 | 3,9 (1,9-7,6) | 1,18 (0,62-2,22) | 1,6 |
| | Disagiata | 32 | 581.612 | 5,4 (3,7-7,7) | 1,58 (0,96-2,58) | 11,7 |
| 1992-1996 | Agiata | 9 | 427.269 | 1,9 (0,8-3,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 19 | 346.296 | 4,6 (2,7-7,5) | 2,50 (1,13-5,53) | 11,4 |
| | Disagiata | 29 | 401.830 | 7,0 (4,7-10,1) | 3,92 (1,85-8,29) | 21,6 |
| 1997-2001 | Agiata | 17 | 411.461 | 3,9 (2,2-6,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 24 | 326.831 | 6,7 (4,2-10,2) | 1,79 (1,08-2,97) | 10,6 |
| | Disagiata | 23 | 396.826 | 5,8 (3,7-8,8) | 1,59 (0,95-2,65) | 8,5 |
| 2002-2006 | Agiata | 18 | 378.884 | 3,9 (2,3-6,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 23 | 379.309 | 5,1 (3,2-7,9) | 1,31 (0,76-2,25) | 5,4 |
| | Disagiata | 14 | 268.016 | 5,5 (3,0-9,5) | 1,43 (0,77-2,65) | 4,2 |
| 2007-2011 | Agiata | 11 | 329.498 | 2,4 (1,2-4,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 324.843 | 4,5 (2,5-7,6) | 1,54 (0,72-3,33) | 5,6 |
| | Disagiata | 28 | 237.818 | 11,8 (7,9-17,3) | 4,48 (2,23-9,03) | 21,8 |

MORTALITÀ per BPCO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 10 | 497.959 | 2,0 (1,0-3,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 9 | 141.208 | 5,4 (2,5-11,2) | 2,52 (1,02-6,20) | 5,4 |
| | Disagiata | 32 | 685.018 | 4,7 (3,2-6,7) | 2,20 (1,08-4,47) | 17,4 |
| 1977-1981 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |
| 1982-1986 | Agiata | 7 | 470.838 | 1,4 (0,6-3,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 5 | 234.098 | 1,5 (0,5-4,4) | 1,12 (0,36-3,55) | 0,6 |
| | Disagiata | 15 | 599.103 | 2,5 (1,4-4,2) | 1,73 (0,70-4,24) | 6,3 |
| 1987-1991 | Agiata | 4 | 447.948 | 0,7 (0,2-2,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 3 | 217.023 | 1,1 (0,2-4,0) | 1,27 (0,28-5,69) | 0,6 |
| | Disagiata | 11 | 581.612 | 1,8 (0,9-3,3) | 2,42 (0,77-7,62) | 6,5 |
| 1992-1996 | Agiata | 3 | 427.269 | 0,6 (0,1-2,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 346.296 | 1,7 (0,7-3,8) | 2,69 (1,03-7,00) | 4,4 |
| | Disagiata | 15 | 401.830 | 3,6 (2,0-6,1) | 5,92 (2,46-14,21) | 12,5 |
| 1997-2001 | Agiata | 3 | 411.461 | 0,8 (0,2-2,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 5 | 326.831 | 1,4 (0,4-3,5) | 2,08 (0,50-8,72) | 2,6 |
| | Disagiata | 10 | 396.826 | 2,4 (1,1-4,5) | 4,07 (1,12-14,84) | 7,5 |
| 2002-2006 | Agiata | 4 | 378.884 | 0,9 (0,2-2,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 6 | 379.309 | 1,2 (0,4-2,9) | 1,51 (0,43-5,34) | 2,0 |
| | Disagiata | 4 | 268.016 | 1,6 (0,4-4,2) | 1,87 (0,47-7,51) | 1,9 |
| 2007-2011 | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> | <i>n.c.</i> |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 68 | 497.959 | 14,5 (11,2-18,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 141.208 | 9,7 (5,5-16,5) | 0,71 (0,41-1,22) | -6,7 |
| | Disagiata | 139 | 685.018 | 22,1 (18,5-26,2) | 1,50 (1,12-2,00) | 46,0 |
| 1977-1981 | Agiata | 51 | 495.612 | 10,4 (7,7-13,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 13 | 131.706 | 8,8 (4,6-15,8) | 0,83 (0,50-1,40) | -2,6 |
| | Disagiata | 138 | 691.598 | 21,7 (18,2-25,7) | 2,10 (1,60-2,76) | 72,2 |
| 1982-1986 | Agiata | 53 | 470.838 | 10,9 (8,2-14,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 24 | 234.098 | 8,8 (5,5-13,6) | 0,80 (0,49-1,29) | -6,0 |
| | Disagiata | 103 | 599.103 | 17,6 (14,4-21,4) | 1,63 (1,17-2,27) | 39,7 |
| 1987-1991 | Agiata | 35 | 447.948 | 6,6 (4,6-9,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 23 | 217.023 | 9,2 (5,7-14,3) | 1,23 (0,73-2,08) | 4,3 |
| | Disagiata | 79 | 581.612 | 13,6 (10,8-17,0) | 2,01 (1,35-3,00) | 39,8 |
| 1992-1996 | Agiata | 33 | 427.269 | 6,5 (4,5-9,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 39 | 346.296 | 9,4 (6,6-13,1) | 1,42 (0,89-2,26) | 11,5 |
| | Disagiata | 56 | 401.830 | 13,8 (10,4-18,1) | 2,08 (1,35-3,19) | 29,0 |
| 1997-2001 | Agiata | 23 | 411.461 | 4,6 (2,9-7,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 20 | 326.831 | 5,0 (3,0-8,0) | 1,11 (0,61-2,02) | 2,0 |
| | Disagiata | 46 | 396.826 | 11,8 (8,6-15,8) | 2,48 (1,50-4,10) | 27,5 |
| 2002-2006 | Agiata | 23 | 378.884 | 5,3 (3,3-8,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 26 | 379.309 | 6,3 (4,1-9,4) | 1,16 (0,66-2,04) | 3,6 |
| | Disagiata | 28 | 268.016 | 11,4 (7,5-16,6) | 2,19 (1,26-3,80) | 15,2 |
| 2007-2011 | Agiata | 11 | 329.498 | 3,0 (1,5-5,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 18 | 324.843 | 4,6 (2,7-7,7) | 1,75 (0,83-3,71) | 7,7 |
| | Disagiata | 16 | 237.818 | 6,6 (3,8-11,0) | 2,43 (1,12-5,25) | 9,4 |

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 58 | 497.959 | 12,2 (9,3-15,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 141.208 | 10,5 (6,0-17,7) | 0,87 (0,70-1,09) | -2,4 |
| | Disagiata | 105 | 685.018 | 16,0 (13,1-19,5) | 1,31 (1,15-1,48) | 24,5 |
| 1977-1981 | Agiata | 51 | 495.612 | 10,3 (7,6-13,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 12 | 131.706 | 8,1 (4,2-15,0) | 0,81 (0,56-1,16) | -2,9 |
| | Disagiata | 100 | 691.598 | 15,4 (12,5-18,8) | 1,49 (1,23-1,81) | 33,1 |
| 1982-1986 | Agiata | 54 | 470.838 | 11,2 (8,4-14,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 26 | 234.098 | 10,3 (6,6-15,6) | 0,89 (0,65-1,21) | -3,2 |
| | Disagiata | 82 | 599.103 | 13,9 (11,1-17,3) | 1,26 (1,00-1,58) | 16,8 |
| 1987-1991 | Agiata | 36 | 447.948 | 7,4 (5,1-10,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 20 | 217.023 | 8,1 (4,9-13,1) | 1,09 (0,71-1,65) | 1,6 |
| | Disagiata | 72 | 581.612 | 12,3 (9,6-15,5) | 1,69 (1,24-2,30) | 29,3 |
| 1992-1996 | Agiata | 37 | 427.269 | 7,7 (5,4-10,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 38 | 346.296 | 10,1 (7,1-14,1) | 1,27 (0,91-1,77) | 8,2 |
| | Disagiata | 46 | 401.830 | 11,3 (8,3-15,2) | 1,47 (1,07-2,02) | 14,7 |
| 1997-2001 | Agiata | 26 | 411.461 | 5,7 (3,7-8,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 24 | 326.831 | 6,6 (4,1-10,0) | 1,15 (0,72-1,83) | 3,0 |
| | Disagiata | 39 | 396.826 | 10,2 (7,3-14,0) | 1,76 (1,16-2,66) | 17,0 |
| 2002-2006 | Agiata | 22 | 378.884 | 5,3 (3,3-8,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 26 | 379.309 | 6,4 (4,1-9,5) | 1,21 (0,85-1,72) | 4,5 |
| | Disagiata | 23 | 268.016 | 9,3 (5,9-14,1) | 1,78 (1,24-2,55) | 10,2 |
| 2007-2011 | Agiata | 15 | 329.498 | 4,0 (2,2-7,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 19 | 324.843 | 5,2 (3,1-8,5) | 1,35 (0,85-2,13) | 4,8 |
| | Disagiata | 17 | 237.818 | 7,3 (4,2-11,9) | 1,83 (1,15-2,94) | 7,7 |

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 138 | 497.959 | 29,7 (24,9-35,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 45 | 141.208 | 28,1 (20,4-38,4) | 0,94 (0,77-1,14) | -3,0 |
| | Disagiata | 226 | 685.018 | 34,7 (30,3-39,6) | 1,15 (1,02-1,31) | 30,2 |
| 1977-1981 | Agiata | 142 | 495.612 | 29,8 (25,1-35,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 40 | 131.706 | 26,3 (18,8-36,4) | 0,89 (0,71-1,10) | -5,2 |
| | Disagiata | 205 | 691.598 | 33,6 (29,1-38,5) | 1,13 (0,99-1,28) | 22,8 |
| 1982-1986 | Agiata | 125 | 470.838 | 25,5 (21,2-30,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 69 | 234.098 | 22,8 (17,7-29,4) | 0,91 (0,76-1,08) | -7,1 |
| | Disagiata | 189 | 599.103 | 31,9 (27,5-36,9) | 1,25 (1,09-1,43) | 37,7 |
| 1987-1991 | Agiata | 105 | 447.948 | 20,3 (16,6-24,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 52 | 217.023 | 18,0 (13,3-24,3) | 0,89 (0,70-1,14) | -6,3 |
| | Disagiata | 166 | 581.612 | 28,3 (24,1-33,0) | 1,41 (1,18-1,68) | 48,1 |
| 1992-1996 | Agiata | 90 | 427.269 | 17,9 (14,3-22,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 76 | 346.296 | 17,7 (13,8-22,5) | 0,99 (0,78-1,25) | -1,1 |
| | Disagiata | 114 | 401.830 | 27,5 (22,6-33,1) | 1,55 (1,25-1,92) | 40,4 |
| 1997-2001 | Agiata | 85 | 411.461 | 16,9 (13,4-21,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 50 | 326.831 | 12,6 (9,3-16,9) | 0,76 (0,62-0,93) | -15,6 |
| | Disagiata | 86 | 396.826 | 21,7 (17,3-26,9) | 1,30 (1,09-1,55) | 19,8 |
| 2002-2006 | Agiata | 79 | 378.884 | 17,6 (13,9-22,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 72 | 379.309 | 16,6 (12,9-21,1) | 0,94 (0,74-1,19) | -4,9 |
| | Disagiata | 73 | 268.016 | 29,4 (23,0-37,1) | 1,67 (1,31-2,13) | 29,1 |
| 2007-2011 | Agiata | 60 | 329.498 | 14,5 (11,0-19,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 55 | 324.843 | 14,8 (11,0-19,6) | 0,97 (0,67-1,40) | -1,6 |
| | Disagiata | 65 | 237.818 | 27,8 (21,4-35,6) | 1,93 (1,35-2,73) | 31,4 |

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 632 | 497.959 | 134,3 (124,0-145,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 220 | 141.208 | 139,8 (121,6-160,3) | 1,03 (0,88-1,20) | 6,3 |
| | Disagiata | 1.012 | 685.018 | 155,3 (145,8-165,3) | 1,15 (1,04-1,27) | 130,0 |
| 1977-1981 | Agiata | 620 | 495.612 | 127,3 (117,4-137,8) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 170 | 131.706 | 110,7 (94,6-129,2) | 0,88 (0,74-1,05) | -22,7 |
| | Disagiata | 883 | 691.598 | 141,1 (131,9-150,8) | 1,10 (0,99-1,22) | 81,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 496 | 470.838 | 101,0 (92,3-110,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 319 | 234.098 | 110,5 (98,5-124,0) | 1,09 (0,96-1,23) | 25,8 |
| | Disagiata | 792 | 599.103 | 134,1 (124,9-143,8) | 1,33 (1,20-1,46) | 194,6 |
| 1987-1991 | Agiata | 474 | 447.948 | 92,7 (84,4-101,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 231 | 217.023 | 82,1 (71,5-94,2) | 0,90 (0,80-1,01) | -25,3 |
| | Disagiata | 659 | 581.612 | 112,9 (104,4-121,9) | 1,23 (1,12-1,34) | 121,3 |
| 1992-1996 | Agiata | 392 | 427.269 | 79,7 (71,9-88,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 354 | 346.296 | 85,5 (76,5-95,3) | 1,07 (0,96-1,21) | 24,6 |
| | Disagiata | 439 | 401.830 | 107,8 (97,9-118,5) | 1,35 (1,21-1,51) | 113,7 |
| 1997-2001 | Agiata | 339 | 411.461 | 70,1 (62,7-78,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 259 | 326.831 | 69,3 (60,9-78,6) | 0,99 (0,84-1,16) | -3,4 |
| | Disagiata | 344 | 396.826 | 88,1 (79,0-98,0) | 1,25 (1,08-1,46) | 69,5 |
| 2002-2006 | Agiata | 245 | 378.884 | 55,9 (49,0-63,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 299 | 379.309 | 71,5 (63,4-80,3) | 1,25 (1,08-1,44) | 60,0 |
| | Disagiata | 235 | 268.016 | 94,7 (82,9-107,8) | 1,69 (1,45-1,97) | 96,1 |
| 2007-2011 | Agiata | 213 | 329.498 | 52,8 (45,7-60,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 200 | 324.843 | 54,2 (46,8-62,7) | 1,00 (0,83-1,21) | 0,2 |
| | Disagiata | 192 | 237.818 | 81,9 (70,6-94,5) | 1,55 (1,27-1,88) | 67,8 |

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 106 | 497.959 | 21,6 (17,7-26,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 37 | 141.208 | 23,9 (16,8-33,6) | 1,12 (0,77-1,63) | 4,1 |
| | Disagiata | 146 | 685.018 | 21,2 (17,9-25,0) | 0,99 (0,77-1,27) | -1,1 |
| 1977-1981 | Agiata | 96 | 495.612 | 19,5 (15,8-23,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 26 | 131.706 | 17,7 (11,5-26,7) | 0,96 (0,63-1,49) | -1,0 |
| | Disagiata | 149 | 691.598 | 22,4 (19,0-26,4) | 1,15 (0,89-1,48) | 18,9 |
| 1982-1986 | Agiata | 105 | 470.838 | 21,7 (17,8-26,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 53 | 234.098 | 22,2 (16,4-29,6) | 1,00 (0,67-1,50) | 0,0 |
| | Disagiata | 123 | 599.103 | 20,5 (17,1-24,5) | 0,95 (0,67-1,35) | -6,2 |
| 1987-1991 | Agiata | 75 | 447.948 | 16,2 (12,7-20,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 32 | 217.023 | 12,4 (8,3-18,2) | 0,83 (0,55-1,26) | -6,3 |
| | Disagiata | 110 | 581.612 | 18,8 (15,4-22,7) | 1,17 (0,87-1,57) | 15,7 |
| 1992-1996 | Agiata | 73 | 427.269 | 16,2 (12,6-20,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 64 | 346.296 | 17,8 (13,6-23,0) | 1,08 (0,77-1,52) | 4,9 |
| | Disagiata | 61 | 401.830 | 15,1 (11,5-19,5) | 0,93 (0,66-1,31) | -4,4 |
| 1997-2001 | Agiata | 48 | 411.461 | 10,5 (7,7-14,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 41 | 326.831 | 12,2 (8,7-16,7) | 1,09 (0,72-1,65) | 3,3 |
| | Disagiata | 43 | 396.826 | 11,0 (7,9-14,9) | 1,00 (0,66-1,52) | 0,2 |
| 2002-2006 | Agiata | 34 | 378.884 | 8,5 (5,8-12,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 36 | 379.309 | 8,7 (6,1-12,3) | 1,07 (0,67-1,72) | 2,5 |
| | Disagiata | 29 | 268.016 | 11,0 (7,3-16,0) | 1,31 (0,79-2,15) | 6,8 |
| 2007-2011 | Agiata | 29 | 329.498 | 7,7 (5,1-11,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 26 | 324.843 | 7,6 (4,9-11,4) | 0,94 (0,55-1,59) | -1,7 |
| | Disagiata | 22 | 237.818 | 9,7 (6,0-14,9) | 1,15 (0,66-2,01) | 2,9 |

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 33 | 497.959 | 6,8 (4,7-9,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 15 | 141.208 | 9,9 (5,5-17,0) | 1,46 (0,93-2,29) | 4,7 |
| | Disagiata | 50 | 685.018 | 7,3 (5,4-9,7) | 1,10 (0,80-1,52) | 4,6 |
| 1977-1981 | Agiata | 32 | 495.612 | 6,4 (4,3-9,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 14 | 131.706 | 9,8 (5,3-17,1) | 1,56 (0,83-2,93) | 5,0 |
| | Disagiata | 55 | 691.598 | 8,2 (6,2-10,8) | 1,27 (0,82-1,97) | 11,7 |
| 1982-1986 | Agiata | 26 | 470.838 | 5,5 (3,6-8,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 15 | 234.098 | 6,4 (3,5-11,2) | 1,16 (0,47-2,89) | 2,1 |
| | Disagiata | 37 | 599.103 | 6,1 (4,3-8,5) | 1,12 (0,55-2,28) | 3,8 |
| 1987-1991 | Agiata | 18 | 447.948 | 3,7 (2,2-6,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 11 | 217.023 | 3,9 (1,9-7,7) | 1,18 (0,56-2,50) | 1,7 |
| | Disagiata | 35 | 581.612 | 6,0 (4,2-8,4) | 1,59 (0,90-2,81) | 12,9 |
| 1992-1996 | Agiata | 27 | 427.269 | 6,1 (4,0-9,1) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 16 | 346.296 | 4,5 (2,5-7,5) | 0,75 (0,40-1,38) | -5,5 |
| | Disagiata | 14 | 401.830 | 3,7 (2,0-6,3) | 0,59 (0,31-1,14) | -9,6 |
| 1997-2001 | Agiata | 19 | 411.461 | 4,3 (2,6-7,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 11 | 326.831 | 3,3 (1,6-6,0) | 0,73 (0,38-1,41) | -4,0 |
| | Disagiata | 12 | 396.826 | 2,9 (1,5-5,2) | 0,69 (0,37-1,32) | -5,3 |
| 2002-2006 | Agiata | 6 | 378.884 | 1,5 (0,5-3,5) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 9 | 379.309 | 2,0 (0,9-4,0) | 1,50 (0,53-4,22) | 3,0 |
| | Disagiata | 3 | 268.016 | 1,3 (0,3-3,9) | 0,77 (0,19-3,09) | -0,9 |
| 2007-2011 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 16 | 497.959 | 3,4 (1,9-5,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 4 | 141.208 | 2,6 (0,7-7,5) | 0,77 (0,26-2,30) | -1,2 |
| | Disagiata | 30 | 685.018 | 4,3 (2,9-6,2) | 1,31 (0,71-2,41) | 7,1 |
| 1977-1981 | Agiata | 15 | 495.612 | 3,1 (1,8-5,2) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 3 | 131.706 | 2,1 (0,4-7,0) | 0,68 (0,20-2,35) | -1,4 |
| | Disagiata | 15 | 691.598 | 2,4 (1,3-4,0) | 0,76 (0,37-1,55) | -4,8 |
| 1982-1986 | Agiata | 23 | 470.838 | 4,8 (3,1-7,4) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 8 | 234.098 | 3,4 (1,4-7,3) | 0,63 (0,28-1,42) | -4,6 |
| | Disagiata | 22 | 599.103 | 3,7 (2,3-5,6) | 0,76 (0,42-1,37) | -7,0 |
| 1987-1991 | Agiata | 16 | 447.948 | 3,4 (1,9-5,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 3 | 217.023 | 1,2 (0,2-4,2) | 0,35 (0,10-1,21) | -5,5 |
| | Disagiata | 18 | 581.612 | 3,1 (1,8-4,9) | 0,93 (0,47-1,82) | -1,4 |
| 1992-1996 | Agiata | 9 | 427.269 | 1,8 (0,8-3,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 9 | 346.296 | 2,5 (1,1-4,9) | 1,22 (0,48-3,07) | 1,6 |
| | Disagiata | 5 | 401.830 | 1,1 (0,4-2,8) | 0,66 (0,22-1,98) | -2,5 |
| 1997-2001 | Agiata | 4 | 411.461 | 0,8 (0,2-2,3) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 8 | 326.831 | 2,0 (0,8-4,2) | 2,45 (0,74-8,13) | 4,7 |
| | Disagiata | 5 | 396.826 | 1,2 (0,4-3,0) | 1,45 (0,39-5,43) | 1,6 |
| 2002-2006 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 2007-2011 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

| PERIODO | Tipologia abitativa | Osservati | Anni persona | Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%) | Rischio relativo (lim. conf. 95%) | Morti attribuibili |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1972-1976 | Agiata | 44 | 497.959 | 8,8 (6,4-11,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 14 | 141.208 | 8,7 (4,7-15,3) | 1,04 (0,57-1,89) | 0,5 |
| | Disagiata | 52 | 685.018 | 7,6 (5,7-10,1) | 0,86 (0,57-1,28) | -8,7 |
| 1977-1981 | Agiata | 42 | 495.612 | 8,6 (6,2-11,7) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 7 | 131.706 | 4,6 (1,8-10,3) | 0,60 (0,27-1,33) | -4,7 |
| | Disagiata | 64 | 691.598 | 9,6 (7,4-12,3) | 1,13 (0,76-1,67) | 7,2 |
| 1982-1986 | Agiata | 39 | 470.838 | 7,9 (5,6-10,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 22 | 234.098 | 8,9 (5,5-14,1) | 1,08 (0,64-1,83) | 1,7 |
| | Disagiata | 43 | 599.103 | 7,2 (5,2-9,7) | 0,91 (0,59-1,41) | -4,0 |
| 1987-1991 | Agiata | 32 | 447.948 | 6,9 (4,7-10,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 12 | 217.023 | 4,4 (2,2-8,3) | 0,74 (0,38-1,45) | -4,1 |
| | Disagiata | 40 | 581.612 | 6,8 (4,8-9,3) | 1,00 (0,63-1,60) | 0,0 |
| 1992-1996 | Agiata | 34 | 427.269 | 7,6 (5,3-10,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 28 | 346.296 | 7,7 (5,0-11,3) | 1,02 (0,62-1,69) | 0,7 |
| | Disagiata | 28 | 401.830 | 7,0 (4,7-10,3) | 0,91 (0,55-1,51) | -2,7 |
| 1997-2001 | Agiata | 18 | 411.461 | 3,6 (2,1-6,0) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 18 | 326.831 | 5,7 (3,3-9,1) | 1,33 (0,47-3,73) | 4,4 |
| | Disagiata | 18 | 396.826 | 4,7 (2,8-7,5) | 1,16 (0,43-3,14) | 2,5 |
| 2002-2006 | Agiata | 16 | 378.884 | 4,1 (2,3-6,9) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 12 | 379.309 | 3,1 (1,6-5,5) | 0,76 (0,36-1,60) | -3,8 |
| | Disagiata | 11 | 268.016 | 3,8 (1,9-7,1) | 1,01 (0,47-2,19) | 0,1 |
| 2007-2011 | Agiata | 16 | 329.498 | 4,4 (2,4-7,6) | 1 | 0,0 |
| | Mediamente agiata | 17 | 324.843 | 4,9 (2,8-8,1) | 1,09 (0,42-2,80) | 1,4 |
| | Disagiata | 9 | 237.818 | 3,9 (1,8-7,7) | 0,81 (0,26-2,51) | -2,2 |