

**MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	3.518	109.501	3054,2 (2953,6-3157,4)	1	0,0	124,5
	Mediamente agiata	1.231	45.652	2770,4 (2617,6-2929,9)	0,90 (0,83-0,99)	-130,8	107,7
	Disagiata	6.610	188.727	3404,4 (3322,7-3487,6)	<b>1,11 (1,05-1,18)</b>	663,2	147,1
1977-1981	Agiata	3.658	128.009	2685,9 (2599,0-2775,1)	1	0,0	106,5
	Mediamente agiata	1.503	55.684	2559,2 (2431,0-2692,7)	0,95 (0,90-1,01)	-72,1	96,9
	Disagiata	6.950	211.227	3056,8 (2984,8-3130,2)	<b>1,13 (1,09-1,18)</b>	821,7	126,4
1982-1986	Agiata	3.071	107.041	2504,3 (2414,3-2597,2)	1	0,0	101
	Mediamente agiata	2.509	88.873	2532,7 (2432,7-2636,2)	1,01 (0,96-1,06)	18,3	102,5
	Disagiata	6.774	193.020	3024,2 (2949,9-3100,2)	<b>1,19 (1,14-1,24)</b>	1.091,9	129,5
1987-1991	Agiata	3.046	126.784	2137,1 (2059,6-2217,0)	1	0,0	88,9
	Mediamente agiata	2.449	101.530	2073,3 (1988,9-2160,7)	0,97 (0,92-1,02)	-80,6	84,8
	Disagiata	6.085	194.201	2608,1 (2539,1-2678,6)	<b>1,20 (1,15-1,25)</b>	1.018,5	113
1992-1996	Agiata	2.682	131.271	1874,1 (1801,8-1948,6)	1	0,0	76,1
	Mediamente agiata	3.358	152.042	1986,1 (1917,6-2056,4)	1,06 (0,97-1,16)	195,7	79
	Disagiata	4.640	161.635	2386,7 (2314,0-2461,4)	<b>1,26 (1,16-1,38)</b>	963,6	106,5
1997-2001	Agiata	2.769	154.978	1684,1 (1621,7-1748,4)	1	0,0	67,5
	Mediamente agiata	3.262	170.521	1731,8 (1672,1-1793,3)	1,03 (0,98-1,08)	89,8	71
	Disagiata	3.814	154.668	2092,1 (2023,6-2162,6)	<b>1,23 (1,17-1,30)</b>	723,4	87,6
2002-2006	Agiata	2.930	163.406	1551,1 (1493,9-1610,1)	1	0,0	58,5
	Mediamente agiata	4.158	223.511	1556,5 (1507,7-1606,6)	1,00 (0,96-1,05)	15,2	61
	Disagiata	3.029	118.431	2018,0 (1940,9-2097,9)	<b>1,27 (1,21-1,34)</b>	647,0	85
2007-2011	Agiata	2.856	178.169	1333,1 (1282,6-1385,2)	1	0,0	53,1
	Mediamente agiata	4.145	221.927	1429,7 (1382,9-1478,0)	<b>1,08 (1,03-1,13)</b>	294,9	55,5
	Disagiata	2.599	106.182	1880,8 (1801,8-1962,9)	<b>1,37 (1,30-1,45)</b>	705,3	81,3

**MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	780	109.501	696,1 (647,9-747,0)	1	0,0	38,8
	Mediamente agiata	286	45.652	634,3 (562,9-712,6)	0,91 (0,81-1,01)	-28,6	35,2
	Disagiata	1.376	188.727	720,0 (682,4-759,1)	1,03 (0,96-1,11)	41,8	41,7
1977-1981	Agiata	869	128.009	661,1 (617,7-706,9)	1	0,0	35,4
	Mediamente agiata	335	55.684	585,4 (524,1-652,1)	0,89 (0,81-0,98)	-42,7	32
	Disagiata	1.498	211.227	684,3 (649,8-720,2)	1,03 (0,97-1,10)	49,2	38,5
1982-1986	Agiata	879	107.041	761,4 (710,6-815,2)	1	0,0	41,6
	Mediamente agiata	680	88.873	723,6 (669,1-781,9)	0,94 (0,85-1,04)	-42,9	41,2
	Disagiata	1.681	193.020	809,8 (769,9-851,4)	1,04 (0,96-1,13)	71,4	47,8
1987-1991	Agiata	943	126.784	695,3 (650,5-742,7)	1	0,0	39,2
	Mediamente agiata	751	101.530	686,3 (636,4-739,2)	0,97 (0,90-1,06)	-20,9	38
	Disagiata	1.590	194.201	741,2 (703,3-780,8)	1,05 (0,98-1,12)	74,1	42,3
1992-1996	Agiata	929	131.271	677,6 (633,7-723,7)	1	0,0	35,6
	Mediamente agiata	1.049	152.042	652,5 (612,8-694,2)	0,97 (0,88-1,05)	-37,4	36,7
	Disagiata	1.340	161.635	754,2 (712,2-798,2)	<b>1,09 (1,01-1,19)</b>	114,9	42,8
1997-2001	Agiata	970	154.978	603,6 (566,0-643,0)	1	0,0	31
	Mediamente agiata	1.125	170.521	622,0 (585,7-660,2)	1,03 (0,94-1,12)	32,0	33,6
	Disagiata	1.136	154.668	674,0 (633,9-716,2)	<b>1,10 (1,01-1,20)</b>	106,1	38,8
2002-2006	Agiata	1.027	163.406	580,2 (544,4-617,8)	1	0,0	30,2
	Mediamente agiata	1.391	223.511	564,9 (534,5-596,6)	0,97 (0,92-1,02)	-45,4	30,2
	Disagiata	936	118.431	687,8 (641,1-737,5)	<b>1,18 (1,11-1,24)</b>	139,4	37,5
2007-2011	Agiata	1.070	178.169	542,0 (508,9-577,0)	1	0,0	28,5
	Mediamente agiata	1.477	221.927	560,9 (530,3-593,1)	1,05 (0,97-1,14)	74,2	29,2
	Disagiata	852	106.182	686,3 (636,6-739,4)	<b>1,25 (1,14-1,37)</b>	169,9	38,8

**MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	17	109.501	15,1 (8,8-24,4)	1	0,0	1
	Mediamente agiata	4	45.652	8,8 (2,4-22,9)	0,58 (0,19-1,71)	-2,9	0,5
	Disagiata	29	188.727	15,3 (10,2-21,9)	0,99 (0,54-1,80)	-0,3	0,8
1977-1981	Agiata	14	128.009	10,8 (5,9-18,3)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	6	55.684	10,7 (3,9-23,7)	0,98 (0,59-1,62)	-0,1	0,8
	Disagiata	36	211.227	16,5 (11,5-22,9)	<b>1,54 (1,12-2,14)</b>	12,7	1
1982-1986	Agiata	25	107.041	20,2 (12,9-30,7)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	13	88.873	14,6 (7,6-25,8)	0,64 (0,33-1,24)	-7,4	1,1
	Disagiata	27	193.020	14,0 (9,0-21,0)	0,59 (0,34-1,02)	-18,6	1,1
1987-1991	Agiata	20	126.784	14,4 (8,7-22,9)	1	0,0	0,8
	Mediamente agiata	17	101.530	14,3 (8,2-23,7)	1,02 (0,58-1,82)	0,4	0,4
	Disagiata	45	194.201	20,0 (14,3-27,4)	1,36 (0,85-2,17)	11,9	0,9
1992-1996	Agiata	16	131.271	11,4 (6,4-19,0)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	23	152.042	14,1 (8,9-21,5)	<b>1,23 (1,02-1,49)</b>	4,3	0,9
	Disagiata	33	161.635	18,8 (12,6-27,1)	<b>1,58 (1,32-1,88)</b>	12,1	1,2
1997-2001	Agiata	24	154.978	14,8 (9,4-22,1)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	16	170.521	8,9 (5,0-14,7)	0,59 (0,36-0,96)	-11,2	0,5
	Disagiata	26	154.668	14,8 (9,5-22,5)	1,00 (0,65-1,53)	-0,1	0,9
2002-2006	Agiata	14	163.406	7,9 (4,3-13,7)	1	0,0	0,4
	Mediamente agiata	35	223.511	14,2 (9,7-20,3)	1,80 (0,97-3,34)	15,5	0,9
	Disagiata	20	118.431	16,0 (9,4-25,9)	1,86 (0,94-3,70)	9,3	1
2007-2011	Agiata	16	178.169	8,4 (4,7-14,2)	1	0,0	0,5
	Mediamente agiata	23	221.927	8,7 (5,3-14,0)	1,15 (0,61-2,17)	2,9	0,5
	Disagiata	15	106.182	17,5 (9,5-29,8)	1,55 (0,77-3,15)	5,4	1,8

**MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	76	109.501	66,2 (52,1-83,1)	1	0,0	2,8
	Mediamente agiata	36	45.652	80,6 (56,4-111,8)	1,21 (0,81-1,80)	6,2	2,9
	Disagiata	203	188.727	105,0 (91,0-120,5)	<b>1,57 (1,21-2,05)</b>	73,9	4,7
1977-1981	Agiata	89	128.009	66,9 (53,7-82,5)	1	0,0	3,1
	Mediamente agiata	32	55.684	55,3 (37,7-78,5)	0,83 (0,63-1,10)	-6,5	2,5
	Disagiata	182	211.227	81,0 (69,6-93,9)	<b>1,22 (1,03-1,45)</b>	33,0	3,5
1982-1986	Agiata	54	107.041	45,2 (33,7-59,9)	1	0,0	2,2
	Mediamente agiata	68	88.873	69,2 (53,4-88,7)	<b>1,56 (1,26-1,92)</b>	24,3	3
	Disagiata	149	193.020	67,0 (56,3-79,5)	<b>1,49 (1,24-1,80)</b>	49,3	3
1987-1991	Agiata	50	126.784	35,0 (25,7-46,9)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	59	101.530	51,3 (38,6-67,2)	<b>1,42 (1,03-1,96)</b>	17,5	2
	Disagiata	139	194.201	59,3 (49,3-70,9)	<b>1,68 (1,27-2,20)</b>	56,1	2,6
1992-1996	Agiata	41	131.271	30,9 (22,0-42,4)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	76	152.042	45,6 (35,7-57,5)	<b>1,58 (1,08-2,31)</b>	27,8	2,2
	Disagiata	91	161.635	47,1 (37,4-58,9)	<b>1,62 (1,12-2,35)</b>	35,0	2
1997-2001	Agiata	45	154.978	27,7 (20,1-37,2)	1	0,0	1,3
	Mediamente agiata	48	170.521	25,4 (18,7-34,1)	0,93 (0,62-1,40)	-3,4	1
	Disagiata	57	154.668	31,1 (23,3-41,1)	1,14 (0,77-1,69)	7,1	1,4
2002-2006	Agiata	33	163.406	18,4 (12,6-26,2)	1	0,0	0,8
	Mediamente agiata	71	223.511	30,0 (23,2-38,3)	<b>1,54 (1,07-2,21)</b>	24,8	1,9
	Disagiata	37	118.431	25,8 (17,6-37,0)	1,45 (0,96-2,19)	11,5	1,1
2007-2011	Agiata	35	178.169	18,5 (12,7-26,3)	1	0,0	1,2
	Mediamente agiata	68	221.927	24,8 (18,9-32,4)	<b>1,48 (1,05-2,07)</b>	22,0	1,1
	Disagiata	46	106.182	37,1 (26,4-51,6)	<b>2,06 (1,43-2,97)</b>	23,7	1,9

**MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	105	109.501	92,0 (75,2-111,6)	1	0,0	4,3
	Mediamente agiata	40	45.652	88,7 (63,3-121,1)	0,97 (0,75-1,25)	-1,2	5,3
	Disagiata	148	188.727	76,5 (64,6-89,9)	0,83 (0,70-0,99)	-30,0	3,7
1977-1981	Agiata	90	128.009	66,8 (53,6-82,3)	1	0,0	3,3
	Mediamente agiata	45	55.684	78,3 (57,1-105,3)	1,16 (0,81-1,65)	6,0	4,4
	Disagiata	155	211.227	68,7 (58,3-80,6)	1,03 (0,79-1,33)	4,4	2,8
1982-1986	Agiata	85	107.041	72,9 (57,8-91,1)	1	0,0	3,9
	Mediamente agiata	79	88.873	80,1 (63,1-100,9)	1,14 (0,91-1,43)	9,5	3,3
	Disagiata	162	193.020	74,6 (63,1-87,8)	1,03 (0,85-1,26)	5,2	3,6
1987-1991	Agiata	101	126.784	71,4 (57,9-87,5)	1	0,0	3,3
	Mediamente agiata	76	101.530	67,2 (52,5-85,1)	0,92 (0,68-1,23)	-7,0	3,5
	Disagiata	144	194.201	65,5 (54,6-78,1)	0,88 (0,68-1,13)	-20,1	3,8
1992-1996	Agiata	104	131.271	75,9 (61,7-92,6)	1	0,0	2,9
	Mediamente agiata	106	152.042	66,6 (54,3-81,0)	0,87 (0,58-1,29)	-16,0	4
	Disagiata	124	161.635	63,4 (52,0-76,9)	0,88 (0,60-1,29)	-16,9	3,3
1997-2001	Agiata	102	154.978	63,2 (51,5-76,9)	1	0,0	3,2
	Mediamente agiata	102	170.521	56,9 (46,2-69,4)	0,88 (0,73-1,06)	-13,4	3,3
	Disagiata	99	154.668	55,2 (44,5-68,1)	0,90 (0,74-1,08)	-11,4	2,8
2002-2006	Agiata	98	163.406	53,7 (43,3-65,9)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	148	223.511	58,1 (48,7-68,9)	1,08 (0,83-1,39)	10,4	2,9
	Disagiata	99	118.431	70,4 (56,3-87,6)	1,28 (0,96-1,69)	21,4	3,4
2007-2011	Agiata	98	178.169	48,2 (38,8-59,4)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	159	221.927	57,9 (48,5-68,9)	<b>1,22 (1,06-1,42)</b>	29,1	2,8
	Disagiata	69	106.182	54,0 (41,0-70,5)	1,09 (0,91-1,30)	5,6	2,6

**MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	44	109.501	39,9 (28,9-53,6)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	13	45.652	29,0 (15,4-49,9)	0,73 (0,49-1,08)	-4,8	1,6
	Disagiata	81	188.727	42,4 (33,6-52,7)	1,08 (0,85-1,35)	5,7	2,5
1977-1981	Agiata	46	128.009	35,0 (25,6-46,9)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	18	55.684	30,6 (18,1-48,8)	0,89 (0,64-1,25)	-2,1	0,9
	Disagiata	75	211.227	33,5 (26,3-42,2)	0,97 (0,77-1,22)	-2,5	1,3
1982-1986	Agiata	42	107.041	37,2 (26,6-51,1)	1	0,0	2,2
	Mediamente agiata	22	88.873	22,9 (14,2-35,6)	0,64 (0,42-0,97)	-12,4	1,2
	Disagiata	72	193.020	35,2 (27,2-45,1)	0,94 (0,69-1,28)	-4,7	2,2
1987-1991	Agiata	31	126.784	22,3 (14,9-32,4)	1	0,0	0,8
	Mediamente agiata	30	101.530	28,4 (18,9-41,4)	1,17 (0,79-1,73)	4,3	1,7
	Disagiata	67	194.201	30,0 (22,9-38,9)	1,31 (0,94-1,83)	16,0	1,3
1992-1996	Agiata	33	131.271	24,3 (16,6-34,6)	1	0,0	1
	Mediamente agiata	37	152.042	21,8 (15,2-30,5)	0,95 (0,73-1,24)	-1,9	0,9
	Disagiata	47	161.635	24,0 (17,2-32,9)	1,03 (0,80-1,32)	1,2	1,1
1997-2001	Agiata	35	154.978	20,7 (14,4-29,0)	1	0,0	0,5
	Mediamente agiata	43	170.521	23,7 (17,0-32,2)	1,08 (0,69-1,68)	3,1	1,2
	Disagiata	46	154.668	26,7 (19,3-36,4)	1,19 (0,77-1,86)	7,5	1,4
2002-2006	Agiata	29	163.406	16,6 (11,0-24,2)	1	0,0	0,8
	Mediamente agiata	44	223.511	17,3 (12,4-23,8)	1,09 (0,75-1,59)	3,7	1
	Disagiata	35	118.431	26,0 (17,5-37,7)	1,55 (1,04-2,30)	12,4	1,6
2007-2011	Agiata	16	178.169	8,4 (4,7-14,1)	1	0,0	0,4
	Mediamente agiata	36	221.927	15,4 (10,5-22,2)	1,73 (0,96-3,12)	15,2	1,1
	Disagiata	22	106.182	15,2 (9,0-25,2)	<b>2,18 (1,15-4,16)</b>	11,9	0,6

**MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Agiata	27	128.009	19,9 (13,1-29,2)	1	0,0	0,5
	Mediamente agiata	11	55.684	18,3 (9,2-33,4)	0,93 (0,46-1,88)	-0,8	0,3
	Disagiata	41	211.227	18,6 (13,3-25,4)	0,90 (0,55-1,47)	-4,5	1
1982-1986	Agiata	41	107.041	35,8 (25,4-49,4)	1	0,0	2
	Mediamente agiata	32	88.873	33,5 (22,7-48,3)	0,95 (0,68-1,32)	-1,7	1,8
	Disagiata	95	193.020	45,5 (36,5-56,4)	1,26 (0,97-1,64)	19,8	2,6
1987-1991	Agiata	51	126.784	38,1 (28,1-50,8)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	33	101.530	27,3 (18,5-39,4)	0,79 (0,51-1,23)	-8,7	1,2
	Disagiata	74	194.201	34,6 (26,8-44,2)	0,90 (0,63-1,29)	-8,2	2,1
1992-1996	Agiata	35	131.271	25,2 (17,4-35,5)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	52	152.042	32,7 (24,3-43,3)	1,27 (0,83-1,95)	11,1	1,7
	Disagiata	66	161.635	36,6 (27,9-47,5)	1,43 (0,95-2,15)	19,7	2,1
1997-2001	Agiata	35	154.978	22,1 (15,4-30,9)	1	0,0	1,2
	Mediamente agiata	42	170.521	23,1 (16,5-31,5)	1,06 (0,68-1,66)	2,4	1,2
	Disagiata	57	154.668	33,4 (25,1-43,9)	<b>1,54 (1,01-2,35)</b>	20,1	1,4
2002-2006	Agiata	52	163.406	29,8 (22,1-39,5)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	57	223.511	23,9 (17,9-31,4)	0,79 (0,61-1,02)	-15,5	1,4
	Disagiata	45	118.431	33,5 (23,8-46,4)	1,13 (0,86-1,49)	5,2	1,9
2007-2011	Agiata	37	178.169	18,0 (12,5-25,3)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	67	221.927	24,6 (18,7-32,1)	1,37 (1,00-1,86)	18,0	1
	Disagiata	52	106.182	43,9 (31,9-59,5)	<b>2,20 (1,59-3,04)</b>	28,3	2,5

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	44	109.501	39,7 (28,8-53,4)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	18	45.652	40,4 (23,9-64,1)	1,01 (0,58-1,75)	0,2	1,4
	Disagiata	80	188.727	42,0 (33,3-52,3)	1,06 (0,73-1,53)	4,6	2,7
1977-1981	Agiata	66	128.009	50,6 (39,1-64,5)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	21	55.684	37,4 (23,1-57,5)	0,73 (0,45-1,19)	-7,8	2,3
	Disagiata	106	211.227	49,5 (40,5-60,1)	0,97 (0,71-1,31)	-3,8	3,5
1982-1986	Agiata	70	107.041	63,0 (48,8-80,5)	1	0,0	4,2
	Mediamente agiata	42	88.873	45,4 (32,5-62,2)	0,72 (0,49-1,06)	-16,1	2,8
	Disagiata	151	193.020	71,6 (60,3-84,8)	1,18 (0,89-1,57)	23,0	3,9
1987-1991	Agiata	88	126.784	65,0 (51,8-80,7)	1	0,0	4
	Mediamente agiata	52	101.530	48,3 (35,7-64,2)	0,73 (0,57-0,92)	-19,6	2,7
	Disagiata	166	194.201	80,5 (68,1-94,6)	1,19 (0,99-1,42)	26,4	5,1
1992-1996	Agiata	94	131.271	69,2 (55,7-85,2)	1	0,0	4
	Mediamente agiata	110	152.042	70,6 (57,8-85,4)	1,00 (0,76-1,32)	0,2	3,8
	Disagiata	147	161.635	90,5 (76,0-107,2)	1,22 (0,94-1,58)	26,3	6,1
1997-2001	Agiata	111	154.978	69,0 (56,7-83,3)	1	0,0	3,5
	Mediamente agiata	126	170.521	72,0 (59,8-86,0)	1,01 (0,83-1,24)	1,5	4,8
	Disagiata	133	154.668	79,4 (66,1-95,0)	1,15 (0,94-1,40)	16,8	4,4
2002-2006	Agiata	137	163.406	77,9 (65,1-92,7)	1	0,0	4,3
	Mediamente agiata	156	223.511	67,9 (57,4-79,9)	0,82 (0,65-1,03)	-33,8	4,4
	Disagiata	140	118.431	112,0 (93,0-134,2)	<b>1,36 (1,07-1,72)</b>	37,1	7,8
2007-2011	Agiata	161	178.169	83,0 (70,2-97,6)	1	0,0	4,7
	Mediamente agiata	182	221.927	70,1 (59,5-82,3)	0,87 (0,78-0,96)	-27,6	3,7
	Disagiata	139	106.182	114,9 (94,9-138,5)	<b>1,37 (1,23-1,52)</b>	37,4	6,8



**MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	137	109.501	122,8 (103,0-145,4)	1	0,0	7,5
	Mediamente agiata	49	45.652	108,5 (80,3-143,8)	0,88 (0,74-1,05)	-6,6	6
	Disagiata	182	188.727	95,5 (82,1-110,5)	0,78 (0,69-0,87)	-52,6	6,1
1977-1981	Agiata	157	128.009	121,7 (103,4-142,5)	1	0,0	7,8
	Mediamente agiata	59	55.684	101,9 (77,5-132,0)	0,86 (0,64-1,17)	-9,2	5
	Disagiata	244	211.227	114,0 (100,0-129,4)	0,94 (0,77-1,15)	-16,4	7,8
1982-1986	Agiata	155	107.041	138,9 (117,4-163,5)	1	0,0	8,7
	Mediamente agiata	102	88.873	113,3 (91,9-138,6)	0,79 (0,62-1,02)	-26,5	8
	Disagiata	273	193.020	140,4 (123,5-159,1)	0,97 (0,80-1,18)	-8,0	10,2
1987-1991	Agiata	156	126.784	118,0 (99,8-138,8)	1	0,0	8,6
	Mediamente agiata	134	101.530	125,3 (104,3-149,5)	1,06 (0,84-1,34)	7,8	7,8
	Disagiata	230	194.201	113,9 (99,0-130,6)	0,94 (0,77-1,15)	-14,9	7,4
1992-1996	Agiata	164	131.271	121,1 (102,9-141,7)	1	0,0	8,2
	Mediamente agiata	171	152.042	109,9 (93,8-128,1)	0,90 (0,72-1,11)	-19,4	7,9
	Disagiata	192	161.635	114,5 (98,1-133,0)	0,93 (0,75-1,14)	-15,0	7,9
1997-2001	Agiata	166	154.978	104,7 (89,3-122,1)	1	0,0	6,2
	Mediamente agiata	211	170.521	116,3 (101,0-133,5)	1,16 (0,78-1,73)	29,0	6
	Disagiata	166	154.668	106,9 (90,7-125,3)	0,98 (0,65-1,48)	-3,1	8,1
2002-2006	Agiata	179	163.406	103,0 (88,1-119,8)	1	0,0	5,9
	Mediamente agiata	203	223.511	84,2 (72,7-97,3)	0,81 (0,68-0,96)	-46,9	4,9
	Disagiata	140	118.431	99,5 (82,6-119,4)	1,02 (0,84-1,23)	2,1	4,6
2007-2011	Agiata	164	178.169	83,7 (71,0-98,4)	1	0,0	4,7
	Mediamente agiata	229	221.927	91,1 (78,8-105,1)	1,08 (0,91-1,28)	16,3	5,2
	Disagiata	110	106.182	95,1 (76,6-117,2)	1,07 (0,87-1,31)	7,0	6,3

**MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	136	109.501	120,0 (100,6-142,1)	1	0,0	5,4
	Mediamente agiata	51	45.652	113,9 (84,8-150,0)	0,94 (0,68-1,30)	-3,0	4,7
	Disagiata	272	188.727	141,5 (125,1-159,4)	1,17 (0,96-1,44)	40,2	7,2
1977-1981	Agiata	114	128.009	83,9 (69,1-101,0)	1	0,0	3
	Mediamente agiata	54	55.684	93,0 (69,8-121,8)	1,09 (0,79-1,51)	4,5	3,5
	Disagiata	262	211.227	116,8 (102,9-132,0)	<b>1,37 (1,10-1,71)</b>	70,7	5,3
1982-1986	Agiata	52	107.041	41,4 (30,7-55,2)	1	0,0	1,3
	Mediamente agiata	42	88.873	41,8 (29,9-57,5)	0,99 (0,66-1,49)	-0,4	1,5
	Disagiata	117	193.020	52,2 (42,9-63,3)	1,21 (0,87-1,68)	20,3	2
1987-1991	Agiata	52	126.784	36,0 (26,7-48,0)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	50	101.530	42,6 (31,3-57,1)	1,16 (0,89-1,53)	7,0	1,7
	Disagiata	141	194.201	62,4 (52,0-74,5)	<b>1,65 (1,32-2,06)</b>	55,4	3,2
1992-1996	Agiata	92	131.271	66,1 (53,0-81,6)	1	0,0	2,7
	Mediamente agiata	106	152.042	62,7 (51,0-76,4)	0,98 (0,81-1,18)	-2,4	2,2
	Disagiata	166	161.635	82,6 (69,7-97,4)	<b>1,29 (1,09-1,54)</b>	37,6	3,1
1997-2001	Agiata	92	154.978	56,7 (45,7-69,8)	1	0,0	2,8
	Mediamente agiata	95	170.521	49,5 (39,9-60,8)	0,90 (0,68-1,20)	-10,2	1,6
	Disagiata	152	154.668	83,4 (70,2-98,7)	<b>1,48 (1,14-1,92)</b>	49,5	3,7
2002-2006	Agiata	64	163.406	33,1 (25,3-42,8)	1	0,0	1
	Mediamente agiata	92	223.511	34,6 (27,7-42,9)	1,01 (0,79-1,30)	0,9	1,2
	Disagiata	101	118.431	68,1 (54,7-84,5)	<b>1,94 (1,52-2,48)</b>	48,9	2,4
2007-2011	Agiata	50	178.169	22,2 (16,3-30,0)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	123	221.927	44,8 (36,6-54,7)	<b>1,84 (1,41-2,41)</b>	56,3	2,3
	Disagiata	75	106.182	56,5 (43,1-73,4)	<b>2,28 (1,70-3,06)</b>	42,1	3,1

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	1.911	109.501	1637,3 (1564,3-1712,9)	1	0,0	54,1
	Mediamente agiata	644	45.652	1459,5 (1348,9-1577,0)	0,89 (0,81-0,97)	-81,9	45,8
	Disagiata	3.547	188.727	1814,1 (1754,8-1874,9)	<b>1,10 (1,04-1,17)</b>	333,0	64,8
1977-1981	Agiata	1.948	128.009	1409,3 (1347,0-1473,9)	1	0,0	46
	Mediamente agiata	801	55.684	1347,5 (1255,5-1444,8)	0,96 (0,85-1,07)	-34,8	39,2
	Disagiata	3.787	211.227	1640,3 (1588,1-1694,0)	<b>1,16 (1,07-1,25)</b>	516,2	57,8
1982-1986	Agiata	1.510	107.041	1195,6 (1134,7-1259,3)	1	0,0	39,1
	Mediamente agiata	1.246	88.873	1224,0 (1155,9-1295,5)	1,02 (0,96-1,09)	29,4	38,8
	Disagiata	3.477	193.020	1491,2 (1440,4-1543,6)	<b>1,24 (1,17-1,31)</b>	668,3	50
1987-1991	Agiata	1.387	126.784	937,5 (887,3-990,1)	1	0,0	29,4
	Mediamente agiata	1.141	101.530	923,0 (868,3-980,7)	0,98 (0,91-1,06)	-20,7	29,3
	Disagiata	2.981	194.201	1215,4 (1169,6-1262,7)	<b>1,27 (1,19-1,35)</b>	627,0	41,9
1992-1996	Agiata	1.102	131.271	744,1 (699,4-791,1)	1	0,0	24
	Mediamente agiata	1.477	152.042	840,0 (796,3-885,5)	1,12 (0,98-1,30)	164,1	23,8
	Disagiata	2.093	161.635	1018,1 (971,9-1066,2)	<b>1,35 (1,17-1,56)</b>	547,1	36,4
1997-2001	Agiata	1.062	154.978	633,8 (596,1-673,4)	1	0,0	19,1
	Mediamente agiata	1.273	170.521	654,0 (618,2-691,6)	1,03 (0,94-1,13)	39,8	19,3
	Disagiata	1.595	154.668	829,9 (788,2-873,5)	<b>1,30 (1,19-1,42)</b>	370,7	25,6
2002-2006	Agiata	1.044	163.406	531,2 (498,6-565,6)	1	0,0	14,9
	Mediamente agiata	1.606	223.511	564,7 (536,4-594,3)	1,07 (0,94-1,22)	105,6	16
	Disagiata	1.173	118.431	732,0 (687,3-779,3)	<b>1,36 (1,18-1,56)</b>	307,5	24,5
2007-2011	Agiata	894	178.169	383,2 (357,5-410,5)	1	0,0	9,9
	Mediamente agiata	1.376	221.927	437,9 (413,5-463,8)	1,14 (0,96-1,34)	164,7	11,3
	Disagiata	924	106.182	613,0 (570,4-658,8)	<b>1,56 (1,29-1,89)</b>	331,2	19,4

**MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	563	109.501	488,3 (448,6-530,7)	1	0,0	18,6
	Mediamente agiata	193	45.652	436,2 (376,8-502,5)	0,90 (0,80-1,01)	-22,3	15,9
	Disagiata	1.045	188.727	534,5 (502,5-568,0)	<b>1,10 (1,02-1,19)</b>	96,4	19,3
1977-1981	Agiata	603	128.009	442,6 (407,8-479,8)	1	0,0	16,2
	Mediamente agiata	237	55.684	399,4 (350,0-454,1)	0,91 (0,74-1,13)	-22,5	11,7
	Disagiata	1.158	211.227	506,2 (477,3-536,6)	1,14 (1,00-1,32)	146,3	19,5
1982-1986	Agiata	293	107.041	247,2 (219,1-278,4)	1	0,0	11,5
	Mediamente agiata	250	88.873	257,6 (226,1-292,9)	1,04 (0,88-1,23)	9,6	12,1
	Disagiata	659	193.020	298,1 (275,0-322,8)	<b>1,22 (1,06-1,40)</b>	117,0	12,7
1987-1991	Agiata	329	126.784	234,8 (209,4-262,8)	1	0,0	9
	Mediamente agiata	253	101.530	213,3 (186,9-242,7)	0,93 (0,73-1,17)	-20,4	8,9
	Disagiata	643	194.201	287,9 (264,8-312,5)	1,18 (0,97-1,43)	97,8	13,2
1992-1996	Agiata	267	131.271	187,5 (165,1-212,2)	1	0,0	8,2
	Mediamente agiata	367	152.042	209,3 (187,8-232,7)	1,15 (0,89-1,49)	49,0	6,3
	Disagiata	539	161.635	272,6 (248,5-298,5)	<b>1,44 (1,14-1,82)</b>	164,5	11,1
1997-2001	Agiata	292	154.978	176,8 (157,1-198,5)	1	0,0	6,7
	Mediamente agiata	341	170.521	176,9 (158,4-197,1)	1,01 (0,87-1,18)	4,2	5,9
	Disagiata	433	154.668	229,2 (207,3-253,1)	<b>1,30 (1,12-1,51)</b>	100,4	8,2
2002-2006	Agiata	296	163.406	152,8 (135,5-172,0)	1	0,0	4,6
	Mediamente agiata	435	223.511	154,5 (139,8-170,5)	1,03 (0,83-1,29)	14,6	4,8
	Disagiata	321	118.431	205,3 (181,6-231,8)	<b>1,30 (1,03-1,64)</b>	74,8	8
2007-2011	Agiata	220	178.169	94,7 (82,2-109,0)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	325	221.927	108,8 (96,4-122,7)	1,08 (0,91-1,28)	23,5	3,5
	Disagiata	244	106.182	166,8 (144,7-192,1)	<b>1,64 (1,37-1,97)</b>	95,1	5,3

**MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	602	109.501	514,4 (473,9-557,5)	1	0,0	15,4
	Mediamente agiata	210	45.652	477,4 (415,0-546,8)	0,92 (0,74-1,15)	-18,6	13,1
	Disagiata	1.051	188.727	538,4 (506,3-572,0)	1,04 (0,90-1,19)	38,4	19,8
1977-1981	Agiata	678	128.009	487,4 (451,1-525,9)	1	0,0	15,6
	Mediamente agiata	269	55.684	454,0 (401,2-512,1)	0,93 (0,83-1,04)	-21,7	14,1
	Disagiata	1.172	211.227	504,2 (475,5-534,3)	1,03 (0,95-1,11)	32,7	15,9
1982-1986	Agiata	578	107.041	450,3 (413,6-489,8)	1	0,0	12,8
	Mediamente agiata	471	88.873	456,1 (415,3-500,4)	1,02 (0,90-1,15)	7,3	12,5
	Disagiata	1.244	193.020	530,9 (500,9-562,7)	<b>1,16 (1,05-1,28)</b>	168,3	17,8
1987-1991	Agiata	495	126.784	326,5 (297,5-357,9)	1	0,0	9,4
	Mediamente agiata	415	101.530	326,7 (295,0-361,4)	1,00 (0,88-1,14)	-0,7	8,7
	Disagiata	1.027	194.201	405,9 (380,1-433,3)	<b>1,21 (1,09-1,35)</b>	179,9	12,5
1992-1996	Agiata	383	131.271	251,6 (226,2-279,3)	1	0,0	6,2
	Mediamente agiata	540	152.042	300,2 (274,6-327,7)	1,19 (0,97-1,47)	87,7	7,6
	Disagiata	718	161.635	340,6 (314,5-368,7)	<b>1,31 (1,06-1,63)</b>	171,6	10,7
1997-2001	Agiata	325	154.978	191,1 (170,8-213,3)	1	0,0	4,6
	Mediamente agiata	458	170.521	235,7 (214,3-258,7)	<b>1,25 (1,03-1,53)</b>	92,0	7,2
	Disagiata	513	154.668	261,2 (238,3-286,0)	<b>1,38 (1,14-1,68)</b>	141,0	6,9
2002-2006	Agiata	345	163.406	171,6 (153,5-191,5)	1	0,0	4,4
	Mediamente agiata	529	223.511	181,5 (165,9-198,4)	1,07 (0,94-1,23)	36,5	4
	Disagiata	361	118.431	221,0 (197,0-247,7)	<b>1,23 (1,06-1,43)</b>	68,5	6,7
2007-2011	Agiata	289	178.169	124,7 (110,2-141,0)	1	0,0	3,5
	Mediamente agiata	447	221.927	134,7 (121,8-149,1)	1,11 (0,96-1,29)	45,7	2,5
	Disagiata	308	106.182	197,1 (173,7-223,7)	<b>1,54 (1,31-1,81)</b>	108,1	5,7

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	157	109.501	135,4 (114,9-158,5)	1	0,0	4,8
	Mediamente agiata	49	45.652	112,0 (82,8-148,3)	0,82 (0,60-1,13)	-10,7	2,3
	Disagiata	357	188.727	182,7 (164,2-202,8)	<b>1,35 (1,12-1,63)</b>	92,9	7
1977-1981	Agiata	163	128.009	117,2 (99,8-137,0)	1	0,0	3,6
	Mediamente agiata	61	55.684	103,4 (79,0-133,3)	0,87 (0,65-1,17)	-8,8	4
	Disagiata	348	211.227	151,5 (135,9-168,5)	<b>1,27 (1,06-1,53)</b>	74,6	5,3
1982-1986	Agiata	153	107.041	119,9 (101,2-141,5)	1	0,0	3,8
	Mediamente agiata	149	88.873	149,1 (125,8-176,1)	1,20 (0,96-1,51)	25,3	5,5
	Disagiata	429	193.020	187,0 (169,2-206,6)	<b>1,51 (1,26-1,82)</b>	145,0	7
1987-1991	Agiata	153	126.784	105,2 (88,7-124,3)	1	0,0	3,7
	Mediamente agiata	97	101.530	78,3 (63,0-96,7)	0,76 (0,59-0,98)	-31,2	2,6
	Disagiata	315	194.201	130,4 (115,6-146,7)	<b>1,22 (1,00-1,48)</b>	56,0	4,2
1992-1996	Agiata	118	131.271	79,0 (64,9-95,3)	1	0,0	2
	Mediamente agiata	153	152.042	90,5 (76,3-106,6)	1,10 (0,86-1,40)	13,9	3,1
	Disagiata	240	161.635	120,8 (105,0-138,6)	<b>1,44 (1,16-1,80)</b>	73,4	5,1
1997-2001	Agiata	157	154.978	92,9 (78,9-108,8)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	165	170.521	88,6 (75,5-103,7)	0,91 (0,66-1,27)	-15,7	4,1
	Disagiata	267	154.668	144,1 (126,7-163,5)	<b>1,50 (1,12-2,02)</b>	89,4	5,4
2002-2006	Agiata	178	163.406	89,6 (76,6-104,4)	1	0,0	2,1
	Mediamente agiata	242	223.511	87,3 (76,2-99,7)	0,96 (0,79-1,16)	-11,2	2,9
	Disagiata	218	118.431	139,3 (120,0-161,4)	<b>1,47 (1,21-1,79)</b>	69,8	5
2007-2011	Agiata	184	178.169	80,4 (68,8-93,8)	1	0,0	2
	Mediamente agiata	249	221.927	76,3 (66,4-87,6)	0,98 (0,81-1,18)	-5,5	2
	Disagiata	185	106.182	122,9 (104,4-144,5)	<b>1,46 (1,19-1,80)</b>	58,6	3,3

**MORTALITÀ per BPCO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	58	109.501	51,0 (38,7-66,1)	1	0,0	2,7
	Mediamente agiata	20	45.652	45,8 (28,0-70,9)	0,88 (0,53-1,47)	-2,6	1,1
	Disagiata	128	188.727	66,1 (55,2-78,7)	1,30 (0,96-1,78)	29,7	2,8
1977-1981	Agiata	64	128.009	47,2 (36,3-60,5)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	16	55.684	27,9 (15,9-45,7)	0,58 (0,41-0,83)	-11,5	1,6
	Disagiata	135	211.227	59,6 (49,9-70,7)	<b>1,26 (1,04-1,53)</b>	28,0	2,7
1982-1986	Agiata	63	107.041	52,1 (39,8-67,6)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	54	88.873	56,2 (41,9-74,3)	1,05 (0,79-1,39)	2,5	2,9
	Disagiata	150	193.020	69,7 (58,6-82,6)	<b>1,29 (1,03-1,62)</b>	34,0	3,5
1987-1991	Agiata	74	126.784	50,6 (39,4-64,4)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	52	101.530	42,9 (31,7-57,2)	0,84 (0,59-1,19)	-10,1	1,7
	Disagiata	160	194.201	65,4 (55,2-77,3)	1,27 (0,97-1,68)	34,4	2
1992-1996	Agiata	68	131.271	45,9 (35,4-58,9)	1	0,0	1,1
	Mediamente agiata	80	152.042	47,9 (37,7-60,1)	1,00 (0,72-1,38)	-0,1	1,8
	Disagiata	140	161.635	72,7 (60,4-87,0)	<b>1,47 (1,10-1,97)</b>	45,1	3,6
1997-2001	Agiata	81	154.978	48,2 (38,3-60,1)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	82	170.521	44,7 (35,4-55,8)	0,88 (0,57-1,36)	-11,0	2,1
	Disagiata	133	154.668	72,5 (60,2-86,7)	1,47 (0,99-2,17)	42,4	2,7
2002-2006	Agiata	89	163.406	44,9 (35,8-55,7)	1	0,0	0,9
	Mediamente agiata	106	223.511	35,6 (29,0-43,6)	0,83 (0,53-1,30)	-21,2	0,6
	Disagiata	113	118.431	74,3 (60,2-91,3)	1,51 (0,97-2,35)	38,2	2,9
2007-2011	Agiata	72	178.169	30,3 (23,5-38,8)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	106	221.927	30,9 (24,9-38,4)	1,05 (0,78-1,42)	5,4	0,6
	Disagiata	72	106.182	46,6 (35,9-60,7)	<b>1,44 (1,04-1,99)</b>	21,8	0,8

**MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	39	109.501	35,1 (24,9-48,1)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	19	45.652	41,2 (24,8-64,7)	1,18 (0,68-2,05)	3,0	3,4
	Disagiata	129	188.727	67,9 (56,7-80,8)	<b>1,93 (1,35-2,76)</b>	62,1	5
1977-1981	Agiata	67	128.009	51,4 (39,8-65,5)	1	0,0	3,4
	Mediamente agiata	31	55.684	53,9 (36,6-76,9)	1,06 (0,69-1,63)	1,8	2,5
	Disagiata	147	211.227	68,6 (57,9-80,8)	1,32 (0,99-1,77)	35,8	4,8
1982-1986	Agiata	48	107.041	43,5 (31,8-58,5)	1	0,0	2,8
	Mediamente agiata	45	88.873	49,1 (35,6-66,6)	1,13 (0,75-1,70)	5,1	3,2
	Disagiata	137	193.020	70,6 (58,8-84,4)	<b>1,58 (1,13-2,19)</b>	50,1	5,3
1987-1991	Agiata	56	126.784	44,3 (33,2-58,1)	1	0,0	3
	Mediamente agiata	42	101.530	40,1 (28,5-55,0)	0,92 (0,69-1,22)	-3,7	2,3
	Disagiata	121	194.201	59,2 (48,7-71,5)	<b>1,36 (1,09-1,71)</b>	32,2	3,3
1992-1996	Agiata	41	131.271	31,4 (22,4-42,9)	1	0,0	1,8
	Mediamente agiata	72	152.042	47,2 (36,8-59,7)	<b>1,51 (1,13-2,01)</b>	24,2	3,3
	Disagiata	99	161.635	57,3 (46,1-70,7)	<b>1,89 (1,44-2,49)</b>	46,7	3,2
1997-2001	Agiata	67	154.978	42,3 (32,7-53,8)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	71	170.521	40,1 (31,2-50,9)	0,95 (0,68-1,32)	-4,1	2,6
	Disagiata	92	154.668	55,0 (44,0-68,2)	1,32 (0,96-1,80)	22,1	3
2002-2006	Agiata	75	163.406	40,0 (31,3-50,7)	1	0,0	1,5
	Mediamente agiata	99	223.511	41,9 (33,9-51,5)	0,94 (0,62-1,42)	-6,5	2,4
	Disagiata	75	118.431	54,7 (42,3-70,1)	1,29 (0,82-2,00)	16,6	2,5
2007-2011	Agiata	46	178.169	23,5 (17,0-31,9)	1	0,0	1,2
	Mediamente agiata	73	221.927	28,8 (22,1-37,2)	1,22 (0,84-1,77)	13,3	1,6
	Disagiata	50	106.182	41,5 (29,6-57,2)	<b>1,72 (1,15-2,57)</b>	21,0	3



**MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	72	109.501	61,7 (48,2-78,0)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	27	45.652	59,7 (39,2-87,3)	0,96 (0,70-1,30)	-1,2	2,6
	Disagiata	146	188.727	75,3 (63,5-88,6)	1,20 (0,99-1,46)	24,6	3,6
1977-1981	Agiata	88	128.009	64,3 (51,4-79,4)	1	0,0	2,9
	Mediamente agiata	37	55.684	62,8 (44,1-87,2)	0,98 (0,87-1,10)	-0,9	2,7
	Disagiata	151	211.227	67,1 (56,8-78,9)	1,03 (0,96-1,12)	5,1	3,3
1982-1986	Agiata	63	107.041	52,0 (39,6-67,5)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	51	88.873	52,5 (38,8-69,9)	1,00 (0,85-1,19)	0,1	2,5
	Disagiata	155	193.020	71,1 (59,9-84,0)	<b>1,34 (1,17-1,53)</b>	39,5	3,6
1987-1991	Agiata	58	126.784	42,3 (31,8-55,4)	1	0,0	2,2
	Mediamente agiata	52	101.530	45,0 (33,2-59,9)	1,09 (0,91-1,30)	4,2	1,9
	Disagiata	123	194.201	54,6 (44,8-66,0)	<b>1,28 (1,10-1,48)</b>	26,7	2,7
1992-1996	Agiata	45	131.271	32,8 (23,7-44,3)	1	0,0	1,8
	Mediamente agiata	68	152.042	40,9 (31,5-52,3)	<b>1,28 (1,06-1,54)</b>	14,8	2,1
	Disagiata	85	161.635	45,5 (35,8-57,3)	<b>1,40 (1,17-1,67)</b>	24,3	2,2
1997-2001	Agiata	58	154.978	36,0 (27,3-46,6)	1	0,0	1,7
	Mediamente agiata	66	170.521	36,6 (28,2-46,9)	1,00 (0,76-1,33)	0,2	2,1
	Disagiata	83	154.668	47,3 (37,4-59,4)	<b>1,32 (1,01-1,73)</b>	20,2	2,1
2002-2006	Agiata	60	163.406	31,7 (24,0-41,3)	1	0,0	1,3
	Mediamente agiata	88	223.511	35,6 (28,4-44,4)	1,05 (0,82-1,34)	4,1	1,9
	Disagiata	64	118.431	44,9 (33,9-59,0)	<b>1,35 (1,04-1,75)</b>	16,8	2
2007-2011	Agiata	46	178.169	22,5 (16,3-30,6)	1	0,0	1,2
	Mediamente agiata	75	221.927	27,8 (21,4-35,8)	<b>1,22 (1,04-1,44)</b>	13,7	1,3
	Disagiata	48	106.182	37,1 (26,3-51,5)	<b>1,58 (1,32-1,90)</b>	17,4	2,2

**MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	243	109.501	209,8 (184,1-238,2)	1	0,0	8,1
	Mediamente agiata	89	45.652	201,6 (161,8-248,3)	0,95 (0,80-1,13)	-4,4	6
	Disagiata	470	188.727	241,5 (220,2-264,5)	<b>1,15 (1,03-1,28)</b>	60,6	9,6
1977-1981	Agiata	275	128.009	200,9 (177,7-226,4)	1	0,0	7
	Mediamente agiata	101	55.684	171,3 (139,3-208,7)	0,85 (0,72-1,00)	-17,6	6,4
	Disagiata	523	211.227	229,4 (210,0-250,2)	<b>1,13 (1,02-1,26)</b>	62,0	9,6
1982-1986	Agiata	253	107.041	206,5 (181,2-234,8)	1	0,0	8,6
	Mediamente agiata	194	88.873	196,3 (169,2-227,0)	0,95 (0,86-1,04)	-11,3	8,2
	Disagiata	555	193.020	246,1 (225,3-268,5)	<b>1,19 (1,10-1,28)</b>	86,6	10,1
1987-1991	Agiata	250	126.784	172,3 (151,0-196,2)	1	0,0	6,6
	Mediamente agiata	190	101.530	158,1 (135,7-183,7)	0,91 (0,81-1,04)	-18,1	5,9
	Disagiata	514	194.201	217,2 (197,7-238,2)	<b>1,23 (1,11-1,36)</b>	95,9	8,8
1992-1996	Agiata	211	131.271	146,4 (126,8-168,3)	1	0,0	5,6
	Mediamente agiata	269	152.042	161,0 (141,9-182,1)	1,08 (0,91-1,30)	20,9	6,4
	Disagiata	397	161.635	209,9 (188,5-233,4)	<b>1,36 (1,15-1,61)</b>	105,5	10,2
1997-2001	Agiata	237	154.978	143,8 (126,0-163,5)	1	0,0	5,5
	Mediamente agiata	260	170.521	141,1 (124,2-159,7)	0,96 (0,80-1,14)	-11,2	6,8
	Disagiata	331	154.668	182,5 (162,7-204,4)	<b>1,26 (1,07-1,49)</b>	68,2	7,6
2002-2006	Agiata	256	163.406	136,6 (120,0-155,1)	1	0,0	5,4
	Mediamente agiata	332	223.511	126,5 (112,8-141,7)	0,92 (0,78-1,09)	-28,0	5,3
	Disagiata	282	118.431	199,3 (174,9-226,7)	<b>1,37 (1,16-1,63)</b>	76,8	10,3
2007-2011	Agiata	259	178.169	122,7 (107,6-139,5)	1	0,0	5,2
	Mediamente agiata	333	221.927	114,0 (101,1-128,5)	0,96 (0,84-1,09)	-15,1	4,4
	Disagiata	235	106.182	174,9 (151,2-202,0)	<b>1,37 (1,19-1,59)</b>	64,0	7,8

**MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	770	109.501	730,1 (679,4-783,5)	1	0,0	67,1
	Mediamente agiata	291	45.652	628,1 (558,0-704,9)	0,86 (0,84-0,88)	-47,4	57,1
	Disagiata	1.517	188.727	821,4 (780,6-863,9)	<b>1,13 (1,11-1,14)</b>	168,8	75,6
1977-1981	Agiata	773	128.009	631,5 (587,8-677,6)	1	0,0	56,9
	Mediamente agiata	302	55.684	547,8 (487,6-613,6)	0,87 (0,84-0,91)	-45,3	48,5
	Disagiata	1.474	211.227	729,2 (692,4-767,5)	<b>1,15 (1,12-1,19)</b>	196,7	66,3
1982-1986	Agiata	566	107.041	568,1 (521,6-617,8)	1	0,0	52,9
	Mediamente agiata	454	88.873	541,6 (492,0-595,1)	0,94 (0,90-0,99)	-27,0	52
	Disagiata	1.177	193.020	676,7 (637,6-717,6)	<b>1,18 (1,14-1,23)</b>	181,7	64,4
1987-1991	Agiata	460	126.784	422,0 (384,1-462,8)	1	0,0	40,1
	Mediamente agiata	381	101.530	450,3 (406,2-497,9)	1,06 (0,99-1,14)	22,0	41,8
	Disagiata	881	194.201	569,8 (532,8-608,7)	<b>1,34 (1,26-1,43)</b>	225,2	52
1992-1996	Agiata	454	131.271	357,8 (325,6-392,4)	1	0,0	34
	Mediamente agiata	553	152.042	380,1 (349,1-413,3)	1,07 (0,96-1,19)	34,4	34,3
	Disagiata	646	161.635	467,5 (431,9-505,2)	<b>1,30 (1,17-1,44)</b>	149,5	44,9
1997-2001	Agiata	426	154.978	287,2 (260,6-315,9)	1	0,0	25,8
	Mediamente agiata	491	170.521	308,9 (282,1-337,7)	<b>1,07 (1,03-1,12)</b>	33,9	28,2
	Disagiata	480	154.668	359,6 (328,0-393,6)	<b>1,25 (1,19-1,30)</b>	95,2	33,3
2002-2006	Agiata	379	163.406	257,4 (232,1-284,8)	1	0,0	23,2
	Mediamente agiata	491	223.511	249,3 (227,5-272,6)	0,97 (0,93-1,00)	-17,7	23
	Disagiata	329	118.431	343,7 (307,2-383,6)	<b>1,33 (1,28-1,38)</b>	81,9	31,6
2007-2011	Agiata	264	178.153	169,8 (149,8-191,8)	1	0,0	16,6
	Mediamente agiata	364	221.912	202,3 (181,7-224,8)	<b>1,21 (1,13-1,29)</b>	61,9	18,9
	Disagiata	233	106.166	280,3 (244,9-319,6)	<b>1,67 (1,55-1,80)</b>	93,2	26,4

**MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	185	109.501	158,3 (136,2-183,1)	1	0,0	5,4
	Mediamente agiata	62	45.652	141,0 (108,1-181,0)	0,88 (0,66-1,18)	-8,3	3,9
	Disagiata	297	188.727	152,1 (135,2-170,5)	0,95 (0,79-1,15)	-14,3	5,2
1977-1981	Agiata	173	128.009	124,3 (106,4-144,6)	1	0,0	4,5
	Mediamente agiata	71	55.684	121,9 (95,1-154,2)	0,96 (0,73-1,27)	-2,7	5,9
	Disagiata	271	211.227	114,7 (101,4-129,5)	0,93 (0,77-1,13)	-19,0	3,1
1982-1986	Agiata	124	107.041	98,3 (81,4-118,3)	1	0,0	3,4
	Mediamente agiata	105	88.873	105,8 (86,2-129,2)	1,06 (0,88-1,27)	5,6	4,4
	Disagiata	292	193.020	124,3 (110,0-140,3)	<b>1,27 (1,10-1,47)</b>	62,1	4,2
1987-1991	Agiata	101	126.784	69,8 (56,4-85,7)	1	0,0	2,5
	Mediamente agiata	100	101.530	82,7 (66,8-101,8)	1,19 (1,00-1,42)	15,9	3
	Disagiata	188	194.201	78,4 (67,0-91,5)	1,11 (0,95-1,30)	18,5	3,4
1992-1996	Agiata	70	131.271	50,1 (38,8-63,9)	1	0,0	2,5
	Mediamente agiata	98	152.042	55,5 (44,7-68,2)	1,19 (0,88-1,62)	15,6	1,8
	Disagiata	127	161.635	62,7 (51,5-75,8)	1,29 (0,96-1,73)	28,7	2,5
1997-2001	Agiata	77	154.978	46,5 (36,7-58,4)	1	0,0	1,8
	Mediamente agiata	97	170.521	51,5 (41,6-63,2)	1,10 (0,91-1,32)	8,6	2,2
	Disagiata	108	154.668	58,9 (47,9-71,9)	<b>1,24 (1,04-1,49)</b>	21,2	2,3
2002-2006	Agiata	81	163.406	42,8 (33,7-53,7)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	130	223.511	49,6 (41,2-59,6)	1,14 (0,90-1,44)	15,9	2,1
	Disagiata	74	118.431	48,8 (37,4-63,1)	1,13 (0,86-1,48)	8,5	2,1
2007-2011	Agiata	77	178.153	37,3 (29,1-47,4)	1	0,0	2
	Mediamente agiata	118	221.912	39,8 (32,4-48,7)	1,13 (0,70-1,82)	13,4	1,3
	Disagiata	62	106.166	44,8 (33,2-59,8)	1,21 (0,71-2,07)	10,9	2,1

**MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	41	109.501	36,0 (25,8-49,0)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	16	45.652	35,7 (20,4-58,2)	0,97 (0,54-1,73)	-0,5	1,5
	Disagiata	75	188.727	39,3 (30,9-49,3)	1,07 (0,73-1,56)	4,8	2
1977-1981	Agiata	28	128.009	21,5 (14,3-31,2)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	8	55.684	14,3 (6,2-28,6)	0,66 (0,30-1,44)	-4,2	0,9
	Disagiata	48	211.227	21,2 (15,6-28,3)	1,03 (0,64-1,63)	1,2	0,8
1982-1986	Agiata	26	107.041	23,6 (15,2-35,3)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	19	88.873	21,2 (12,6-34,0)	0,88 (0,55-1,40)	-2,7	1,5
	Disagiata	43	193.020	19,9 (14,3-27,4)	0,90 (0,61-1,33)	-4,6	0,9
1987-1991	Agiata	20	126.784	15,3 (9,2-24,2)	1	0,0	1,1
	Mediamente agiata	10	101.530	9,4 (4,4-18,0)	0,62 (0,33-1,18)	-6,1	0,6
	Disagiata	27	194.201	13,1 (8,5-19,5)	0,87 (0,53-1,42)	-4,0	0,9
1992-1996	Agiata	14	131.271	10,3 (5,6-17,7)	1	0,0	1
	Mediamente agiata	17	152.042	9,9 (5,6-16,2)	1,04 (0,52-2,12)	0,7	0,5
	Disagiata	23	161.635	12,4 (7,6-19,4)	1,27 (0,65-2,47)	4,8	0,6
1997-2001	Agiata	11	154.978	6,9 (3,5-12,6)	1	0,0	0,4
	Mediamente agiata	21	170.521	11,8 (7,2-18,3)	<b>1,71 (1,03-2,85)</b>	8,7	0,7
	Disagiata	8	154.668	5,5 (2,3-11,3)	0,71 (0,37-1,33)	-3,3	0,5
2002-2006	Agiata	18	163.406	10,0 (5,8-16,3)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	20	223.511	7,6 (4,6-12,2)	0,79 (0,42-1,49)	-5,4	0,2
	Disagiata	11	118.431	8,8 (4,2-17,0)	0,78 (0,37-1,65)	-3,1	0,6
2007-2011	Agiata	12	178.153	6,5 (3,3-11,8)	1	0,0	0,4
	Mediamente agiata	7	221.912	2,4 (0,9-6,0)	0,45 (0,18-1,14)	-8,7	0,1
	Disagiata	6	106.166	3,7 (1,1-10,6)	0,77 (0,29-2,07)	-1,7	0,2

**MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	123	109.501	102,9 (85,5-123,1)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	37	45.652	85,3 (60,0-117,7)	0,82 (0,57-1,19)	-8,0	1,6
	Disagiata	188	188.727	94,8 (81,7-109,4)	0,92 (0,73-1,15)	-16,7	2,1
1977-1981	Agiata	125	128.009	86,9 (72,3-103,9)	1	0,0	1,7
	Mediamente agiata	51	55.684	84,9 (63,2-112,2)	0,97 (0,73-1,28)	-1,7	2,5
	Disagiata	189	211.227	77,5 (66,7-89,5)	0,90 (0,74-1,09)	-21,2	1,2
1982-1986	Agiata	84	107.041	62,4 (49,5-78,1)	1	0,0	1,1
	Mediamente agiata	64	88.873	60,6 (46,5-78,3)	0,96 (0,80-1,15)	-2,5	1,2
	Disagiata	202	193.020	81,3 (70,2-94,0)	<b>1,29 (1,12-1,48)</b>	44,9	1,7
1987-1991	Agiata	62	126.784	39,0 (29,7-50,9)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	59	101.530	44,0 (33,2-57,8)	1,13 (0,82-1,55)	6,8	0,8
	Disagiata	136	194.201	52,9 (43,8-63,4)	1,27 (0,97-1,65)	28,6	1,7
1992-1996	Agiata	36	131.271	23,9 (16,5-33,7)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	57	152.042	30,5 (22,9-40,1)	1,34 (0,94-1,91)	14,4	0,8
	Disagiata	64	161.635	28,0 (21,1-36,8)	1,20 (0,84-1,70)	10,6	0,6
1997-2001	Agiata	49	154.978	28,7 (21,2-38,1)	1	0,0	0,5
	Mediamente agiata	49	170.521	24,6 (18,1-32,9)	0,85 (0,68-1,07)	-8,5	0,6
	Disagiata	71	154.668	35,1 (27,2-45,1)	1,21 (0,98-1,49)	12,4	0,7
2002-2006	Agiata	42	163.406	19,9 (14,2-27,5)	1	0,0	0,5
	Mediamente agiata	66	223.511	22,7 (17,5-29,4)	1,10 (0,79-1,52)	5,9	0,4
	Disagiata	46	118.431	26,0 (18,5-36,3)	1,27 (0,89-1,82)	9,9	0,6
2007-2011	Agiata	46	178.153	19,0 (13,8-26,0)	1	0,0	0,3
	Mediamente agiata	75	221.912	23,9 (18,5-30,9)	1,17 (0,81-1,69)	11,0	0,5
	Disagiata	38	106.166	24,3 (16,6-35,6)	1,20 (0,78-1,84)	6,2	0,8

**MORTALITÀ per SUICIDI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	17	109.501	15,8 (9,2-25,3)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	6	45.652	13,4 (4,9-29,6)	0,84 (0,33-2,13)	-1,2	0,5
	Disagiata	22	188.727	11,7 (7,3-17,8)	0,75 (0,40-1,41)	-7,5	0,8
1977-1981	Agiata	19	128.009	15,0 (9,0-23,6)	1	0,0	1,3
	Mediamente agiata	12	55.684	22,6 (11,7-39,8)	1,44 (0,70-2,96)	3,7	2,6
	Disagiata	24	211.227	11,3 (7,2-16,9)	0,77 (0,42-1,40)	-7,3	0,7
1982-1986	Agiata	10	107.041	8,9 (4,1-17,2)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	17	88.873	17,6 (10,1-29,2)	<b>2,10 (1,25-3,52)</b>	8,9	0,9
	Disagiata	31	193.020	15,3 (10,2-22,4)	<b>1,71 (1,06-2,74)</b>	12,8	1
1987-1991	Agiata	15	126.784	12,7 (7,0-21,3)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	26	101.530	24,1 (15,5-36,1)	2,12 (1,27-3,54)	13,7	1,4
	Disagiata	23	194.201	11,5 (7,1-17,7)	0,96 (0,57-1,63)	-0,8	0,7
1992-1996	Agiata	14	131.271	10,9 (5,9-18,5)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	14	152.042	9,3 (5,0-15,7)	0,85 (0,41-1,79)	-2,4	0,2
	Disagiata	25	161.635	14,3 (9,0-21,9)	1,35 (0,70-2,60)	6,4	1
1997-2001	Agiata	8	154.978	5,3 (2,3-10,5)	1	0,0	0,5
	Mediamente agiata	10	170.521	5,9 (2,8-11,1)	1,15 (0,45-2,91)	1,3	0,5
	Disagiata	18	154.668	12,1 (7,1-19,5)	2,30 (1,00-5,29)	10,2	0,9
2002-2006	Agiata	11	163.406	7,1 (3,5-12,9)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	16	223.511	7,3 (4,1-12,2)	1,08 (0,50-2,33)	1,2	0,6
	Disagiata	8	118.431	6,8 (2,7-14,7)	1,02 (0,41-2,55)	0,2	0,6
2007-2011	Agiata	8	178.153	5,0 (2,1-10,2)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	17	221.912	7,5 (4,2-12,7)	1,76 (0,76-4,07)	7,3	0,5
	Disagiata	9	106.166	10,0 (4,5-19,8)	1,96 (0,75-5,08)	4,4	0,8