

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	2.514	456.917	578,0 (555,5-601,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	748	119.456	548,4 (509,2-590,3)	0,96 (0,89-1,04)	-29,8
	Disagiata	4.055	656.510	732,6 (709,8-755,9)	1,27 (1,21-1,34)	865,2
1977-1981	Agiata	2.223	448.338	502,2 (481,3-523,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	565	111.491	455,0 (418,0-494,8)	0,91 (0,83-1,00)	-57,2
	Disagiata	3.631	675.727	661,9 (640,2-684,3)	1,33 (1,26-1,40)	898,4
1982-1986	Agiata	2.223	426.504	481,6 (461,8-502,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	1.144	201.123	470,4 (443,2-499,2)	0,97 (0,91-1,04)	-32,2
	Disagiata	3.433	584.681	664,9 (642,7-687,6)	1,38 (1,31-1,46)	946,2
1987-1991	Agiata	1.997	407.335	416,3 (398,0-435,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	1.019	191.294	419,3 (393,2-446,9)	1,02 (0,95-1,10)	20,7
	Disagiata	3.034	571.444	564,9 (544,9-585,4)	1,36 (1,29-1,44)	803,9
1992-1996	Agiata	1.629	388.440	362,0 (344,3-380,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	1.394	315.642	377,4 (357,4-398,3)	1,06 (0,98-1,14)	76,2
	Disagiata	2.135	402.750	551,2 (528,0-575,2)	1,53 (1,43-1,63)	739,3
1997-2001	Agiata	1.188	376.370	267,5 (252,2-283,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	1.090	304.717	320,8 (301,7-340,9)	1,19 (1,11-1,28)	176,3
	Disagiata	1.637	402.029	431,1 (410,4-452,6)	1,60 (1,50-1,70)	612,8
2002-2006	Agiata	978	343.735	250,5 (234,8-267,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	1.168	354.845	303,0 (285,6-321,3)	1,22 (1,12-1,33)	212,8
	Disagiata	1.182	269.517	487,5 (459,9-516,4)	1,96 (1,80-2,14)	579,4
2007-2011	Agiata	870	299.073	242,8 (226,5-260,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	925	304.321	270,8 (253,3-289,3)	1,11 (1,01-1,22)	92,3
	Disagiata	954	233.793	414,8 (388,8-442,3)	1,71 (1,56-1,88)	396,1

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	816	456.917	189,2 (176,4-202,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	253	119.456	185,2 (162,8-210,4)	0,99 (0,86-1,14)	-2,5
	Disagiata	1.288	656.510	235,0 (222,2-248,5)	1,26 (1,15-1,37)	263,4
1977-1981	Agiata	788	448.338	177,3 (165,0-190,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	207	111.491	164,1 (142,4-188,6)	0,93 (0,80-1,09)	-14,7
	Disagiata	1.207	675.727	221,6 (209,0-234,7)	1,27 (1,16-1,39)	255,6
1982-1986	Agiata	910	426.504	196,1 (183,6-209,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	472	201.123	189,6 (172,7-207,9)	0,97 (0,88-1,07)	-13,7
	Disagiata	1.327	584.681	259,7 (245,9-274,2)	1,33 (1,23-1,43)	325,8
1987-1991	Agiata	903	407.335	184,4 (172,5-197,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	452	191.294	182,1 (165,3-200,5)	1,00 (0,89-1,12)	-0,7
	Disagiata	1.307	571.444	245,9 (232,7-259,6)	1,34 (1,23-1,45)	329,0
1992-1996	Agiata	695	388.440	149,4 (138,4-161,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	646	315.642	169,1 (156,0-183,0)	1,15 (1,04-1,28)	86,2
	Disagiata	852	402.750	222,2 (207,5-237,8)	1,50 (1,35-1,65)	282,6
1997-2001	Agiata	552	376.370	119,8 (109,8-130,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	465	304.717	136,1 (123,8-149,4)	1,11 (0,98-1,25)	45,7
	Disagiata	736	402.029	197,2 (183,1-212,0)	1,62 (1,45-1,81)	281,6
2002-2006	Agiata	462	343.735	113,5 (103,2-124,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	552	354.845	139,6 (128,0-152,1)	1,23 (1,09-1,39)	104,2
	Disagiata	495	269.517	208,5 (190,5-227,9)	1,84 (1,62-2,09)	226,0
2007-2011	Agiata	420	299.073	110,2 (99,7-121,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	460	304.321	131,1 (119,2-144,1)	1,16 (1,02-1,32)	63,5
	Disagiata	374	233.793	164,8 (148,5-182,6)	1,46 (1,27-1,68)	118,7

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	75	456.917	17,6 (13,8-22,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	33	119.456	24,5 (16,8-35,3)	1,40 (0,93-2,11)	9,4
	Disagiata	164	656.510	30,0 (25,5-35,0)	1,76 (1,34-2,31)	70,7
1977-1981	Agiata	63	448.338	14,4 (11,1-18,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	18	111.491	13,9 (8,2-22,7)	1,01 (0,60-1,70)	0,2
	Disagiata	160	675.727	29,7 (25,2-34,7)	2,15 (1,60-2,87)	85,5
1982-1986	Agiata	76	426.504	16,5 (13,0-20,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	52	201.123	20,7 (15,4-27,6)	1,27 (0,89-1,81)	11,1
	Disagiata	146	584.681	28,8 (24,3-33,9)	1,77 (1,34-2,33)	63,5
1987-1991	Agiata	62	407.335	12,3 (9,4-16,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	39	191.294	16,8 (11,8-23,5)	1,26 (0,84-1,87)	7,9
	Disagiata	160	571.444	30,0 (25,6-35,1)	2,39 (1,78-3,21)	93,1
1992-1996	Agiata	48	388.440	10,1 (7,4-13,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	45	315.642	11,7 (8,4-15,8)	1,17 (0,78-1,76)	6,6
	Disagiata	105	402.750	27,9 (22,8-33,8)	2,70 (1,92-3,80)	66,1
1997-2001	Agiata	35	376.370	8,1 (5,6-11,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	34	304.717	9,9 (6,8-14,0)	1,27 (0,79-2,04)	7,2
	Disagiata	87	402.029	23,4 (18,8-29,0)	2,91 (1,96-4,31)	57,1
2002-2006	Agiata	38	343.735	9,5 (6,7-13,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	44	354.845	11,3 (8,2-15,3)	1,20 (0,84-1,70)	7,3
	Disagiata	60	269.517	25,2 (19,2-32,6)	2,69 (1,93-3,74)	37,7
2007-2011	Agiata	34	299.073	9,2 (6,3-13,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	43	304.321	12,5 (9,0-17,1)	1,34 (0,85-2,10)	10,9
	Disagiata	37	233.793	16,3 (11,5-22,7)	1,74 (1,09-2,77)	15,7

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	83	456.917	19,5 (15,5-24,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	31	119.456	22,4 (15,1-32,7)	1,18 (0,78-1,78)	4,8
	Disagiata	148	656.510	27,0 (22,8-31,9)	1,42 (1,08-1,85)	43,4
1977-1981	Agiata	61	448.338	13,7 (10,4-17,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	17	111.491	13,5 (7,8-22,3)	0,99 (0,62-1,57)	-0,2
	Disagiata	99	675.727	18,1 (14,7-22,2)	1,34 (1,02-1,76)	24,9
1982-1986	Agiata	62	426.504	13,4 (10,2-17,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	34	201.123	14,1 (9,7-20,1)	1,04 (0,73-1,47)	1,2
	Disagiata	98	584.681	19,0 (15,4-23,2)	1,42 (1,09-1,86)	29,1
1987-1991	Agiata	63	407.335	12,8 (9,8-16,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	31	191.294	12,3 (8,2-18,0)	0,98 (0,64-1,50)	-0,7
	Disagiata	80	571.444	15,2 (12,0-18,9)	1,18 (0,85-1,65)	12,5
1992-1996	Agiata	44	388.440	9,4 (6,8-12,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	39	315.642	9,8 (7,0-13,7)	1,09 (0,71-1,68)	3,2
	Disagiata	59	402.750	15,1 (11,5-19,5)	1,63 (1,10-2,41)	22,8
1997-2001	Agiata	29	376.370	6,1 (4,1-9,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	21	304.717	6,4 (3,9-9,9)	0,95 (0,54-1,67)	-1,0
	Disagiata	32	402.029	8,6 (5,9-12,2)	1,34 (0,81-2,21)	8,1
2002-2006	Agiata	31	343.735	7,6 (5,2-11,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	33	354.845	8,9 (6,1-12,6)	1,10 (0,71-1,69)	2,9
	Disagiata	24	269.517	10,3 (6,6-15,4)	1,31 (0,82-2,11)	5,7
2007-2011	Agiata	25	299.073	6,7 (4,3-10,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	24	304.321	7,1 (4,5-10,9)	1,01 (0,58-1,77)	0,3
	Disagiata	23	233.793	10,0 (6,4-15,3)	1,44 (0,82-2,55)	7,1

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	57	456.917	13,3 (10,0-17,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	119.456	7,2 (3,4-14,2)	0,56 (0,29-1,09)	-7,9
	Disagiata	61	656.510	10,9 (8,3-14,2)	0,85 (0,60-1,23)	-10,4
1977-1981	Agiata	42	448.338	9,1 (6,6-12,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	16	111.491	12,6 (7,2-21,3)	1,36 (0,76-2,41)	4,2
	Disagiata	42	675.727	7,6 (5,5-10,5)	0,82 (0,53-1,26)	-9,2
1982-1986	Agiata	64	426.504	14,0 (10,8-18,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	31	201.123	12,3 (8,3-17,9)	0,91 (0,63-1,33)	-2,9
	Disagiata	69	584.681	13,4 (10,5-17,1)	0,96 (0,71-1,30)	-2,8
1987-1991	Agiata	63	407.335	12,9 (9,9-16,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	25	191.294	10,1 (6,5-15,5)	0,80 (0,50-1,26)	-6,4
	Disagiata	61	571.444	11,5 (8,8-14,8)	0,89 (0,63-1,27)	-7,4
1992-1996	Agiata	41	388.440	8,7 (6,2-11,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	33	315.642	8,4 (5,7-12,0)	1,00 (0,63-1,58)	-0,1
	Disagiata	41	402.750	10,6 (7,6-14,5)	1,23 (0,80-1,90)	7,8
1997-2001	Agiata	33	376.370	7,0 (4,8-10,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	38	304.717	11,3 (7,9-15,7)	1,51 (0,95-2,41)	12,9
	Disagiata	41	402.029	10,8 (7,7-14,6)	1,54 (0,97-2,44)	14,4
2002-2006	Agiata	44	343.735	11,0 (7,9-14,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	41	354.845	10,0 (7,1-13,8)	0,96 (0,63-1,48)	-1,5
	Disagiata	33	269.517	14,1 (9,7-19,9)	1,31 (0,84-2,06)	7,9
2007-2011	Agiata	41	299.073	10,4 (7,4-14,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	39	304.321	10,6 (7,5-14,8)	1,00 (0,65-1,56)	0,2
	Disagiata	19	233.793	8,4 (5,0-13,3)	0,78 (0,45-1,34)	-5,4

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	33	456.917	7,7 (5,3-10,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	7	119.456	5,3 (2,1-11,9)	0,69 (0,30-1,55)	-3,2
	Disagiata	50	656.510	9,6 (7,1-12,7)	1,19 (0,76-1,84)	7,9
1977-1981	Agiata	27	448.338	6,2 (4,1-9,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	7	111.491	5,7 (2,3-12,7)	0,93 (0,40-2,13)	-0,5
	Disagiata	42	675.727	7,8 (5,6-10,6)	1,29 (0,80-2,10)	9,5
1982-1986	Agiata	19	426.504	4,1 (2,4-6,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	201.123	4,0 (1,9-7,8)	0,99 (0,46-2,13)	-0,1
	Disagiata	33	584.681	6,3 (4,3-8,9)	1,52 (0,86-2,67)	11,2
1987-1991	Agiata	24	407.335	4,9 (3,1-7,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	11	191.294	4,5 (2,2-8,6)	0,92 (0,49-1,71)	-1,0
	Disagiata	31	571.444	5,8 (3,9-8,2)	1,18 (0,74-1,88)	4,7
1992-1996	Agiata	23	388.440	4,7 (2,9-7,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	18	315.642	4,7 (2,7-7,7)	0,95 (0,51-1,76)	-1,0
	Disagiata	28	402.750	7,3 (4,8-10,6)	1,42 (0,82-2,47)	8,3
1997-2001	Agiata	13	376.370	2,9 (1,5-5,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	12	304.717	3,6 (1,8-6,4)	1,22 (0,56-2,67)	2,1
	Disagiata	22	402.029	5,9 (3,7-9,0)	2,01 (1,01-3,99)	11,0
2002-2006	Agiata	15	343.735	3,9 (2,1-6,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	16	354.845	4,3 (2,4-7,2)	1,10 (0,55-2,23)	1,5
	Disagiata	13	269.517	5,6 (3,0-9,7)	1,47 (0,70-3,09)	4,1
2007-2011	Agiata	15	299.073	3,9 (2,2-6,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	13	304.321	3,8 (2,0-6,8)	0,92 (0,44-1,93)	-1,1
	Disagiata	13	233.793	5,7 (3,0-10,0)	1,38 (0,66-2,91)	3,6

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	18	456.917	4,1 (2,4-6,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	9	119.456	5,8 (2,6-12,2)	1,55 (0,70-3,45)	3,2
	Disagiata	28	656.510	5,2 (3,4-7,6)	1,21 (0,67-2,19)	4,9
1977-1981	Agiata	25	448.338	5,6 (3,6-8,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	111.491	7,8 (3,7-15,1)	1,42 (0,68-2,95)	2,9
	Disagiata	47	675.727	8,8 (6,4-11,8)	1,57 (0,96-2,55)	17,0
1982-1986	Agiata	34	426.504	7,3 (5,1-10,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	22	201.123	8,9 (5,6-13,9)	1,19 (0,77-1,85)	3,6
	Disagiata	65	584.681	12,9 (9,9-16,5)	1,71 (1,22-2,40)	27,1
1987-1991	Agiata	47	407.335	9,2 (6,7-12,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	27	191.294	10,6 (6,9-15,9)	1,12 (0,70-1,80)	3,0
	Disagiata	65	571.444	12,3 (9,5-15,6)	1,29 (0,89-1,88)	14,6
1992-1996	Agiata	24	388.440	5,1 (3,2-7,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	41	315.642	10,7 (7,6-14,7)	2,11 (1,27-3,49)	21,6
	Disagiata	44	402.750	11,5 (8,4-15,5)	2,26 (1,37-3,72)	24,5
1997-2001	Agiata	32	376.370	6,7 (4,6-9,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	32	304.717	9,2 (6,3-13,2)	1,32 (0,86-2,01)	7,7
	Disagiata	59	402.029	15,7 (12,0-20,3)	2,30 (1,59-3,34)	33,4
2002-2006	Agiata	21	343.735	4,9 (3,0-7,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	44	354.845	11,0 (8,0-15,0)	2,16 (1,41-3,33)	23,7
	Disagiata	34	269.517	14,3 (9,9-20,1)	2,85 (1,82-4,47)	22,1
2007-2011	Agiata	24	299.073	6,1 (3,9-9,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	36	304.321	10,5 (7,3-14,9)	1,61 (1,01-2,55)	13,6
	Disagiata	28	233.793	12,7 (8,4-18,6)	1,93 (1,19-3,14)	13,5

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	241	456.917	55,7 (48,8-63,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	70	119.456	51,5 (40,0-65,9)	0,92 (0,73-1,16)	-6,0
	Disagiata	418	656.510	77,5 (70,2-85,5)	1,39 (1,21-1,60)	118,1
1977-1981	Agiata	259	448.338	58,1 (51,2-65,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	59	111.491	46,4 (35,3-60,5)	0,81 (0,61-1,07)	-13,9
	Disagiata	425	675.727	78,0 (70,6-85,9)	1,37 (1,18-1,60)	115,6
1982-1986	Agiata	316	426.504	67,3 (60,0-75,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	163	201.123	64,5 (54,9-75,6)	0,96 (0,80-1,16)	-6,5
	Disagiata	479	584.681	94,5 (86,2-103,4)	1,40 (1,21-1,61)	136,9
1987-1991	Agiata	305	407.335	61,4 (54,7-68,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	147	191.294	57,0 (48,0-67,5)	0,96 (0,78-1,16)	-6,8
	Disagiata	485	571.444	91,7 (83,7-100,3)	1,50 (1,30-1,73)	161,0
1992-1996	Agiata	248	388.440	52,8 (46,4-60,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	214	315.642	56,1 (48,7-64,5)	1,07 (0,90-1,29)	14,9
	Disagiata	295	402.750	77,3 (68,7-86,7)	1,48 (1,25-1,75)	95,6
1997-2001	Agiata	203	376.370	43,2 (37,4-49,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	145	304.717	42,3 (35,6-50,1)	0,95 (0,77-1,17)	-8,0
	Disagiata	247	402.029	66,7 (58,6-75,6)	1,51 (1,26-1,82)	83,9
2002-2006	Agiata	140	343.735	33,7 (28,3-40,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	183	354.845	45,7 (39,2-53,0)	1,36 (1,16-1,59)	48,0
	Disagiata	171	269.517	73,2 (62,6-85,2)	2,16 (1,84-2,54)	91,9
2007-2011	Agiata	118	299.073	29,7 (24,5-35,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	137	304.321	38,4 (32,2-45,7)	1,24 (0,97-1,59)	26,5
	Disagiata	141	233.793	62,2 (52,3-73,6)	2,04 (1,60-2,61)	71,9

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	16	456.917	3,7 (2,1-6,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	9	119.456	6,2 (2,8-12,8)	1,66 (0,73-3,75)	3,6
	Disagiata	27	656.510	4,9 (3,2-7,2)	1,29 (0,69-2,39)	6,0
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Agiata	16	426.504	3,5 (2,0-5,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	201.123	3,7 (1,8-7,5)	1,10 (0,50-2,42)	0,9
	Disagiata	20	584.681	4,2 (2,5-6,4)	1,16 (0,60-2,24)	2,7
1987-1991	Agiata	19	407.335	3,8 (2,3-6,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	14	191.294	5,0 (2,7-9,0)	1,40 (0,51-3,84)	4,0
	Disagiata	19	571.444	3,7 (2,2-5,7)	0,96 (0,38-2,42)	-0,9
1992-1996	Agiata	15	388.440	2,9 (1,6-5,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	20	315.642	4,9 (3,0-7,9)	1,61 (0,83-3,15)	7,6
	Disagiata	14	402.750	3,7 (2,0-6,2)	1,16 (0,56-2,41)	2,0
1997-2001	Agiata	17	376.370	3,3 (1,9-5,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	304.717	2,7 (1,3-5,2)	0,77 (0,35-1,68)	-3,0
	Disagiata	14	402.029	3,7 (2,0-6,2)	1,06 (0,52-2,15)	0,8
2002-2006	Agiata	7	343.735	1,6 (0,6-3,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	19	354.845	4,4 (2,7-7,1)	2,77 (1,16-6,59)	12,1
	Disagiata	7	269.517	2,9 (1,2-6,1)	1,81 (0,63-5,15)	3,1
2007-2011	Agiata	9	299.073	2,2 (1,0-4,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	9	304.321	2,5 (1,1-5,1)	1,06 (0,42-2,68)	0,5
	Disagiata	5	233.793	2,1 (0,7-5,2)	0,96 (0,32-2,86)	-0,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	38	456.917	9,0 (6,3-12,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	12	119.456	8,0 (4,1-15,1)	0,99 (0,52-1,90)	-0,1
	Disagiata	49	656.510	8,8 (6,5-11,7)	1,02 (0,67-1,56)	1,0
1977-1981	Agiata	28	448.338	6,2 (4,1-9,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	5	111.491	4,2 (1,3-10,6)	0,63 (0,24-1,64)	-2,9
	Disagiata	44	675.727	8,3 (6,0-11,2)	1,31 (0,81-2,11)	10,4
1982-1986	Agiata	9	426.504	1,9 (0,9-3,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	5	201.123	2,0 (0,6-5,3)	1,01 (0,34-3,02)	0,1
	Disagiata	26	584.681	5,1 (3,3-7,6)	2,64 (1,24-5,64)	16,2
1987-1991	Agiata	17	407.335	3,6 (2,1-5,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	12	191.294	4,5 (2,3-8,6)	1,38 (0,66-2,89)	3,3
	Disagiata	21	571.444	4,0 (2,5-6,1)	1,13 (0,60-2,15)	2,4
1992-1996	Agiata	29	388.440	5,9 (3,9-8,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	12	315.642	3,3 (1,7-6,0)	0,51 (0,26-1,00)	-11,4
	Disagiata	43	402.750	11,2 (8,1-15,1)	1,86 (1,16-2,99)	19,9
1997-2001	Agiata	12	376.370	2,6 (1,3-4,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	13	304.717	4,2 (2,2-7,3)	1,41 (0,64-3,08)	3,8
	Disagiata	31	402.029	8,2 (5,5-11,6)	3,02 (1,55-5,88)	20,7
2002-2006	Agiata	13	343.735	3,0 (1,6-5,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	17	354.845	4,4 (2,6-7,3)	1,35 (0,65-2,77)	4,4
	Disagiata	27	269.517	11,3 (7,4-16,6)	3,61 (1,86-7,01)	19,5
2007-2011	Agiata	15	299.073	4,0 (2,2-7,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	11	304.321	3,2 (1,6-6,0)	0,77 (0,35-1,68)	-3,3
	Disagiata	23	233.793	10,2 (6,4-15,5)	2,47 (1,29-4,75)	13,7

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	869	456.917	200,4 (187,2-214,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	298	119.456	216,5 (192,3-243,5)	1,09 (0,95-1,24)	24,1
	Disagiata	1.334	656.510	246,8 (233,5-260,6)	1,22 (1,12-1,33)	244,3
1977-1981	Agiata	812	448.338	184,3 (171,8-197,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	188	111.491	151,8 (130,7-175,7)	0,82 (0,70-0,96)	-42,3
	Disagiata	1.248	675.727	234,3 (221,3-247,9)	1,28 (1,17-1,40)	271,4
1982-1986	Agiata	776	426.504	167,1 (155,5-179,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	372	201.123	150,8 (135,7-167,4)	0,90 (0,79-1,02)	-42,3
	Disagiata	1.082	584.681	211,5 (199,1-224,6)	1,27 (1,15-1,39)	226,9
1987-1991	Agiata	592	407.335	121,0 (111,4-131,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	310	191.294	123,7 (110,1-139,0)	1,04 (0,91-1,19)	11,7
	Disagiata	839	571.444	157,3 (146,8-168,3)	1,30 (1,17-1,45)	194,8
1992-1996	Agiata	479	388.440	101,9 (92,9-111,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	360	315.642	93,2 (83,7-103,7)	0,93 (0,81-1,07)	-26,7
	Disagiata	582	402.750	151,8 (139,7-164,7)	1,48 (1,31-1,67)	189,1
1997-2001	Agiata	294	376.370	64,2 (57,0-72,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	308	304.717	87,7 (78,0-98,4)	1,37 (1,19-1,56)	82,4
	Disagiata	397	402.029	104,5 (94,5-115,4)	1,61 (1,42-1,82)	150,1
2002-2006	Agiata	249	343.735	63,4 (55,6-72,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	281	354.845	72,8 (64,4-82,1)	1,16 (0,98-1,38)	39,2
	Disagiata	278	269.517	116,2 (102,9-130,9)	1,85 (1,56-2,20)	127,8
2007-2011	Agiata	209	299.073	59,4 (51,4-68,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	196	304.321	57,7 (49,8-66,7)	0,99 (0,75-1,29)	-2,8
	Disagiata	226	233.793	99,0 (86,5-113,0)	1,70 (1,29-2,24)	93,2

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	486	456.917	111,7 (101,9-122,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	151	119.456	111,0 (93,8-131,1)	0,99 (0,86-1,14)	-1,2
	Disagiata	707	656.510	131,8 (122,1-142,0)	1,17 (1,07-1,28)	103,7
1977-1981	Agiata	524	448.338	117,5 (107,6-128,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	112	111.491	89,9 (73,9-108,8)	0,76 (0,62-0,93)	-35,8
	Disagiata	672	675.727	125,6 (116,2-135,7)	1,07 (0,95-1,20)	41,5
1982-1986	Agiata	443	426.504	95,1 (86,4-104,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	211	201.123	84,7 (73,6-97,4)	0,90 (0,76-1,05)	-24,7
	Disagiata	584	584.681	114,1 (105,0-123,8)	1,20 (1,06-1,36)	97,0
1987-1991	Agiata	296	407.335	60,6 (53,8-68,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	158	191.294	62,0 (52,6-73,0)	1,06 (0,87-1,29)	9,1
	Disagiata	408	571.444	76,8 (69,5-84,6)	1,28 (1,10-1,48)	88,6
1992-1996	Agiata	235	388.440	49,7 (43,5-56,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	169	315.642	44,1 (37,6-51,6)	0,89 (0,76-1,04)	-20,3
	Disagiata	284	402.750	74,4 (66,0-83,7)	1,48 (1,29-1,69)	91,9
1997-2001	Agiata	159	376.370	34,3 (29,1-40,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	147	304.717	41,3 (34,8-48,9)	1,21 (0,97-1,51)	25,4
	Disagiata	170	402.029	45,1 (38,5-52,4)	1,29 (1,04-1,60)	38,3
2002-2006	Agiata	103	343.735	26,3 (21,4-32,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	135	354.845	34,7 (29,0-41,3)	1,35 (1,05-1,75)	35,4
	Disagiata	132	269.517	56,4 (47,1-67,0)	2,17 (1,68-2,81)	71,2
2007-2011	Agiata	98	299.073	26,0 (21,0-32,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	95	304.321	28,1 (22,7-34,7)	1,03 (0,77-1,36)	2,3
	Disagiata	108	233.793	47,8 (39,2-57,9)	1,77 (1,34-2,33)	46,9

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	194	456.917	45,0 (38,8-51,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	76	119.456	54,4 (42,7-69,0)	1,23 (0,94-1,60)	14,1
	Disagiata	252	656.510	46,3 (40,7-52,5)	1,03 (0,85-1,24)	6,3
1977-1981	Agiata	129	448.338	30,2 (25,2-35,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	34	111.491	27,7 (19,1-39,3)	0,92 (0,63-1,35)	-2,8
	Disagiata	256	675.727	47,7 (42,0-54,1)	1,65 (1,33-2,03)	100,5
1982-1986	Agiata	141	426.504	30,4 (25,6-36,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	78	201.123	31,6 (24,9-39,9)	1,03 (0,78-1,36)	2,5
	Disagiata	217	584.681	42,3 (36,8-48,4)	1,39 (1,13-1,72)	61,2
1987-1991	Agiata	107	407.335	21,8 (17,8-26,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	61	191.294	25,0 (19,0-32,7)	1,13 (0,82-1,55)	7,0
	Disagiata	146	571.444	27,4 (23,1-32,3)	1,26 (0,98-1,61)	29,7
1992-1996	Agiata	101	388.440	21,7 (17,7-26,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	60	315.642	15,8 (12,0-20,6)	0,74 (0,54-1,02)	-21,3
	Disagiata	100	402.750	26,0 (21,2-31,7)	1,19 (0,90-1,57)	15,9
1997-2001	Agiata	40	376.370	9,0 (6,4-12,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	48	304.717	13,5 (9,9-18,1)	1,56 (1,08-2,25)	17,2
	Disagiata	60	402.029	15,6 (11,9-20,2)	1,78 (1,25-2,52)	26,2
2002-2006	Agiata	47	343.735	11,5 (8,4-15,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	35	354.845	9,1 (6,3-12,9)	0,76 (0,49-1,18)	-11,0
	Disagiata	48	269.517	19,4 (14,3-25,9)	1,66 (1,11-2,48)	19,0
2007-2011	Agiata	29	299.073	8,8 (5,8-12,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	31	304.321	8,8 (5,9-12,8)	1,12 (0,67-1,85)	3,2
	Disagiata	37	233.793	16,0 (11,3-22,3)	1,98 (1,22-3,23)	18,3

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	91	456.917	21,0 (16,9-25,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	20	119.456	13,8 (8,4-22,2)	0,69 (0,42-1,11)	-9,1
	Disagiata	185	656.510	33,6 (28,9-39,0)	1,61 (1,25-2,07)	70,0
1977-1981	Agiata	65	448.338	15,0 (11,5-19,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	24	111.491	18,9 (12,1-28,8)	1,29 (0,81-2,06)	5,4
	Disagiata	135	675.727	25,8 (21,6-30,7)	1,74 (1,30-2,34)	57,5
1982-1986	Agiata	54	426.504	11,7 (8,8-15,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	39	201.123	15,3 (10,9-21,4)	1,32 (0,88-2,00)	9,5
	Disagiata	137	584.681	27,2 (22,8-32,1)	2,33 (1,70-3,20)	78,3
1987-1991	Agiata	57	407.335	11,4 (8,6-14,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	28	191.294	10,7 (7,1-16,1)	0,97 (0,61-1,52)	-1,0
	Disagiata	89	571.444	16,7 (13,4-20,6)	1,47 (1,06-2,06)	28,6
1992-1996	Agiata	32	388.440	7,2 (4,9-10,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	29	315.642	6,9 (4,6-10,2)	1,11 (0,67-1,83)	2,8
	Disagiata	61	402.750	15,9 (12,1-20,5)	2,28 (1,49-3,51)	34,3
1997-2001	Agiata	35	376.370	7,5 (5,2-10,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	47	304.717	13,3 (9,7-18,0)	1,75 (1,26-2,41)	20,1
	Disagiata	63	402.029	16,5 (12,6-21,1)	2,14 (1,57-2,90)	33,5
2002-2006	Agiata	26	343.735	6,7 (4,4-10,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	34	354.845	9,0 (6,2-12,8)	1,35 (0,81-2,25)	8,8
	Disagiata	36	269.517	14,7 (10,3-20,5)	2,28 (1,37-3,78)	20,2
2007-2011	Agiata	13	299.073	3,5 (1,9-6,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	26	304.321	7,1 (4,6-10,8)	2,11 (1,08-4,10)	13,7
	Disagiata	32	233.793	14,0 (9,6-20,1)	4,04 (2,12-7,71)	24,1

MORTALITÀ per BPCO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	50	456.917	11,6 (8,6-15,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	119.456	6,6 (3,1-13,3)	0,60 (0,30-1,18)	-6,7
	Disagiata	100	656.510	18,9 (15,3-23,0)	1,58 (1,12-2,22)	36,7
1977-1981	Agiata	27	448.338	6,2 (4,1-9,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	111.491	7,7 (3,7-15,1)	1,27 (0,67-2,38)	2,1
	Disagiata	52	675.727	10,4 (7,7-13,7)	1,66 (1,11-2,49)	20,6
1982-1986	Agiata	24	426.504	5,1 (3,3-7,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	22	201.123	8,5 (5,3-13,4)	1,66 (0,93-2,97)	8,8
	Disagiata	70	584.681	14,0 (10,9-17,8)	2,72 (1,71-4,32)	44,3
1987-1991	Agiata	32	407.335	6,2 (4,2-8,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	17	191.294	6,4 (3,7-10,8)	1,02 (0,57-1,84)	0,4
	Disagiata	48	571.444	9,1 (6,7-12,1)	1,42 (0,90-2,22)	14,1
1992-1996	Agiata	11	388.440	2,2 (1,1-4,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	13	315.642	3,1 (1,6-5,5)	1,40 (1,25-1,56)	3,7
	Disagiata	28	402.750	7,2 (4,8-10,4)	3,14 (2,86-3,46)	19,1
1997-2001	Agiata	14	376.370	3,0 (1,6-5,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	17	304.717	4,5 (2,6-7,4)	1,60 (1,00-2,54)	6,3
	Disagiata	29	402.029	7,7 (5,1-11,1)	2,65 (1,75-4,03)	18,1
2002-2006	Agiata	7	343.735	1,6 (0,6-3,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	15	354.845	3,8 (2,1-6,4)	2,19 (1,06-4,53)	8,1
	Disagiata	14	269.517	5,8 (3,2-9,9)	3,53 (1,69-7,38)	10,0
2007-2011	Agiata	3	299.073	0,8 (0,2-2,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	8	304.321	2,1 (0,9-4,5)	2,79 (0,74-10,53)	5,1
	Disagiata	15	233.793	6,3 (3,5-10,7)	8,27 (2,39-28,64)	13,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	169	456.917	38,5 (32,9-44,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	45	119.456	34,1 (24,7-46,4)	0,86 (0,67-1,11)	-7,1
	Disagiata	342	656.510	62,5 (55,9-69,6)	1,61 (1,40-1,86)	129,9
1977-1981	Agiata	132	448.338	29,6 (24,7-35,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	45	111.491	35,5 (25,9-48,1)	1,23 (0,88-1,72)	8,4
	Disagiata	343	675.727	61,7 (55,2-68,8)	2,10 (1,72-2,57)	180,0
1982-1986	Agiata	133	426.504	28,6 (23,9-34,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	65	201.123	26,6 (20,4-34,4)	0,94 (0,72-1,21)	-4,4
	Disagiata	309	584.681	59,4 (52,9-66,4)	2,07 (1,74-2,48)	160,1
1987-1991	Agiata	81	407.335	17,1 (13,5-21,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	62	191.294	26,8 (20,3-34,9)	1,53 (1,18-1,99)	21,6
	Disagiata	206	571.444	38,3 (33,3-44,0)	2,27 (1,85-2,78)	115,1
1992-1996	Agiata	52	388.440	11,6 (8,6-15,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	57	315.642	17,1 (12,9-22,3)	1,37 (0,94-2,00)	15,5
	Disagiata	128	402.750	33,2 (27,6-39,5)	2,86 (2,07-3,95)	83,2
1997-2001	Agiata	45	376.370	10,4 (7,5-14,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	52	304.717	15,9 (11,8-21,0)	1,51 (1,01-2,25)	17,5
	Disagiata	102	402.029	27,3 (22,2-33,2)	2,55 (1,79-3,62)	62,0
2002-2006	Agiata	28	343.735	7,7 (5,1-11,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	59	354.845	15,9 (12,1-20,7)	2,17 (1,63-2,89)	31,8
	Disagiata	93	269.517	38,6 (31,1-47,5)	5,14 (3,92-6,75)	74,9
2007-2011	Agiata	28	299.073	8,6 (5,7-12,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	47	304.321	13,6 (9,9-18,4)	1,74 (1,09-2,79)	20,1
	Disagiata	72	233.793	30,8 (24,1-39,0)	3,85 (2,48-5,96)	53,3

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	147	456.917	33,2 (28,0-39,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	37	119.456	28,3 (19,7-39,8)	0,85 (0,73-1,00)	-6,3
	Disagiata	281	656.510	48,4 (42,8-54,6)	1,46 (1,34-1,60)	88,7
1977-1981	Agiata	120	448.338	26,9 (22,2-32,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	32	111.491	26,2 (17,9-37,5)	1,00 (0,77-1,30)	0,0
	Disagiata	268	675.727	45,8 (40,3-51,8)	1,71 (1,48-1,98)	111,6
1982-1986	Agiata	115	426.504	25,3 (20,9-30,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	57	201.123	24,5 (18,4-32,3)	0,97 (0,78-1,20)	-2,0
	Disagiata	248	584.681	46,3 (40,6-52,5)	1,83 (1,57-2,12)	112,3
1987-1991	Agiata	97	407.335	21,8 (17,6-26,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	57	191.294	25,8 (19,4-34,1)	1,20 (1,05-1,37)	9,5
	Disagiata	192	571.444	34,9 (30,1-40,2)	1,62 (1,46-1,79)	73,3
1992-1996	Agiata	67	388.440	16,1 (12,4-20,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	64	315.642	19,2 (14,7-24,7)	1,19 (0,97-1,44)	10,0
	Disagiata	136	402.750	34,8 (29,2-41,3)	2,19 (1,85-2,59)	73,8
1997-2001	Agiata	58	376.370	14,2 (10,7-18,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	58	304.717	18,1 (13,7-23,6)	1,28 (0,98-1,68)	12,9
	Disagiata	109	402.029	28,6 (23,5-34,6)	1,99 (1,57-2,52)	54,1
2002-2006	Agiata	49	343.735	13,8 (10,2-18,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	68	354.845	18,6 (14,4-23,7)	1,40 (1,10-1,78)	19,4
	Disagiata	99	269.517	39,7 (32,2-48,5)	2,95 (2,35-3,69)	65,1
2007-2011	Agiata	42	299.073	13,6 (9,7-18,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	56	304.321	17,4 (13,0-22,8)	1,36 (0,95-1,93)	14,6
	Disagiata	76	233.793	32,7 (25,7-41,1)	2,58 (1,85-3,60)	46,8

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	584	456.917	134,9 (124,1-146,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	185	119.456	134,9 (115,9-156,7)	1,00 (0,90-1,11)	0,0
	Disagiata	945	656.510	175,3 (164,1-187,0)	1,30 (1,21-1,39)	216,1
1977-1981	Agiata	562	448.338	127,1 (116,7-138,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	133	111.491	105,9 (88,6-126,2)	0,84 (0,69-1,01)	-26,2
	Disagiata	909	675.727	169,2 (158,2-180,8)	1,35 (1,22-1,50)	236,0
1982-1986	Agiata	592	426.504	126,9 (116,8-137,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	311	201.123	124,1 (110,6-139,2)	0,98 (0,88-1,09)	-6,6
	Disagiata	906	584.681	178,4 (167,0-190,5)	1,40 (1,30-1,52)	260,8
1987-1991	Agiata	514	407.335	103,8 (95,0-113,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	260	191.294	102,0 (89,8-115,8)	1,00 (0,86-1,16)	0,7
	Disagiata	786	571.444	148,4 (138,2-159,1)	1,43 (1,28-1,60)	237,4
1992-1996	Agiata	406	388.440	86,3 (78,0-95,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	332	315.642	86,6 (77,4-96,8)	1,02 (0,92-1,13)	5,6
	Disagiata	506	402.750	132,3 (121,0-144,5)	1,54 (1,40-1,69)	176,9
1997-2001	Agiata	305	376.370	65,5 (58,2-73,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	255	304.717	73,0 (64,2-82,8)	1,10 (0,97-1,25)	23,7
	Disagiata	394	402.029	105,3 (95,1-116,3)	1,59 (1,41-1,78)	145,7
2002-2006	Agiata	221	343.735	54,2 (47,1-62,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	279	354.845	70,5 (62,4-79,6)	1,31 (1,13-1,51)	65,1
	Disagiata	277	269.517	117,5 (104,1-132,4)	2,18 (1,88-2,52)	149,8
2007-2011	Agiata	193	299.073	50,7 (43,7-58,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	212	304.321	60,3 (52,3-69,3)	1,17 (1,01-1,35)	30,2
	Disagiata	225	233.793	98,6 (86,0-112,5)	1,93 (1,66-2,23)	108,1

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	974	456.917	224,7 (210,7-239,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	316	119.456	229,9 (204,9-257,7)	1,03 (0,91-1,17)	10,5
	Disagiata	1.459	656.510	269,1 (255,3-283,5)	1,19 (1,10-1,29)	236,8
1977-1981	Agiata	880	448.338	198,8 (185,8-212,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	214	111.491	171,4 (149,1-196,6)	0,86 (0,74-1,00)	-34,6
	Disagiata	1.300	675.727	242,3 (229,1-256,1)	1,22 (1,12-1,33)	236,8
1982-1986	Agiata	843	426.504	181,8 (169,7-194,6)	1	0,0
	Mediamente agiata	403	201.123	162,7 (147,1-179,9)	0,90 (0,80-1,01)	-45,4
	Disagiata	1.186	584.681	230,5 (217,5-244,1)	1,27 (1,16-1,39)	251,5
1987-1991	Agiata	640	407.335	131,1 (121,1-142,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	335	191.294	134,8 (120,4-150,7)	1,04 (0,91-1,19)	13,8
	Disagiata	905	571.444	168,9 (158,0-180,3)	1,28 (1,16-1,42)	200,6
1992-1996	Agiata	549	388.440	120,6 (110,6-131,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	425	315.642	115,0 (104,1-126,9)	0,95 (0,84-1,08)	-20,3
	Disagiata	681	402.750	175,3 (162,4-189,1)	1,44 (1,28-1,61)	207,3
1997-2001	Agiata	311	376.370	68,9 (61,3-77,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	331	304.717	95,8 (85,6-107,0)	1,38 (1,22-1,56)	91,7
	Disagiata	432	402.029	113,0 (102,6-124,3)	1,63 (1,45-1,83)	166,9
2002-2006	Agiata	288	343.735	73,3 (64,9-82,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	321	354.845	84,1 (75,0-94,0)	1,15 (1,01-1,31)	41,0
	Disagiata	309	269.517	128,7 (114,7-144,1)	1,77 (1,55-2,02)	134,2
2007-2011	Agiata	245	298.835	67,5 (59,1-76,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	236	304.186	68,8 (60,2-78,5)	1,01 (0,85-1,21)	2,7
	Disagiata	248	233.573	108,2 (95,1-122,7)	1,60 (1,34-1,91)	92,6

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	209	456.917	47,3 (41,1-54,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	42	119.456	33,1 (23,7-45,6)	0,72 (0,52-1,01)	-16,1
	Disagiata	359	656.510	57,9 (52,0-64,5)	1,25 (1,05-1,48)	72,1
1977-1981	Agiata	168	448.338	37,9 (32,4-44,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	42	111.491	34,7 (24,9-47,5)	0,96 (0,73-1,27)	-1,8
	Disagiata	279	675.727	44,0 (38,9-49,8)	1,18 (1,00-1,38)	41,9
1982-1986	Agiata	163	426.504	36,9 (31,4-43,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	78	201.123	35,9 (28,2-45,3)	0,98 (0,75-1,28)	-1,6
	Disagiata	254	584.681	45,3 (39,9-51,3)	1,23 (1,01-1,50)	47,2
1987-1991	Agiata	157	407.335	37,4 (31,7-44,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	79	191.294	37,5 (29,4-47,3)	1,05 (0,80-1,38)	4,0
	Disagiata	251	571.444	44,3 (39,0-50,2)	1,19 (0,97-1,45)	40,1
1992-1996	Agiata	126	388.440	32,0 (26,5-38,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	107	315.642	32,9 (26,8-39,9)	1,05 (0,92-1,19)	4,8
	Disagiata	186	402.750	46,8 (40,3-54,2)	1,48 (1,33-1,66)	60,7
1997-2001	Agiata	103	376.370	26,2 (21,3-32,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	88	304.717	27,2 (21,7-33,8)	1,07 (0,81-1,43)	6,1
	Disagiata	104	402.029	26,4 (21,5-32,0)	1,02 (0,77-1,34)	1,9
2002-2006	Agiata	104	343.735	29,4 (24,0-35,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	98	354.845	27,4 (22,1-33,5)	0,94 (0,76-1,15)	-6,5
	Disagiata	117	269.517	45,3 (37,3-54,5)	1,57 (1,29-1,92)	42,5
2007-2011	Agiata	78	298.835	25,8 (20,3-32,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	80	304.186	26,3 (20,8-33,0)	1,01 (0,77-1,32)	0,8
	Disagiata	83	233.573	34,8 (27,6-43,4)	1,38 (1,06-1,80)	22,9

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	102	456.917	23,1 (18,8-28,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	22	119.456	17,7 (11,0-27,6)	0,77 (0,49-1,22)	-6,5
	Disagiata	175	656.510	28,5 (24,4-33,3)	1,26 (0,98-1,61)	35,9
1977-1981	Agiata	62	448.338	13,8 (10,6-17,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	20	111.491	16,2 (9,9-25,8)	1,23 (0,74-2,03)	3,7
	Disagiata	108	675.727	17,4 (14,2-21,2)	1,26 (0,92-1,73)	22,5
1982-1986	Agiata	60	426.504	13,3 (10,2-17,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	24	201.123	10,6 (6,7-16,3)	0,83 (0,52-1,33)	-5,0
	Disagiata	75	584.681	13,0 (10,2-16,4)	0,97 (0,69-1,37)	-2,2
1987-1991	Agiata	57	407.335	13,0 (9,8-17,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	21	191.294	10,0 (6,1-15,7)	0,78 (0,47-1,28)	-6,0
	Disagiata	79	571.444	14,1 (11,1-17,6)	1,07 (0,76-1,50)	4,9
1992-1996	Agiata	39	388.440	9,7 (6,8-13,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	29	315.642	8,8 (5,8-12,8)	0,92 (0,64-1,33)	-2,5
	Disagiata	58	402.750	14,5 (11,0-18,9)	1,53 (1,12-2,09)	20,2
1997-2001	Agiata	29	376.370	7,2 (4,8-10,5)	1	0,0
	Mediamente agiata	25	304.717	7,2 (4,7-10,9)	1,08 (0,63-1,84)	1,8
	Disagiata	44	402.029	10,9 (7,9-14,7)	1,53 (0,96-2,46)	15,3
2002-2006	Agiata	29	343.735	8,1 (5,4-11,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	33	354.845	9,3 (6,4-13,2)	1,11 (0,67-1,82)	3,1
	Disagiata	35	269.517	12,7 (8,8-18,0)	1,57 (0,96-2,58)	12,8
2007-2011	Agiata	17	298.835	6,2 (3,6-10,1)	1	0,0
	Mediamente agiata	22	304.186	8,0 (5,0-12,3)	1,25 (0,71-2,18)	4,4
	Disagiata	18	233.573	7,8 (4,6-12,6)	1,27 (0,71-2,29)	3,9

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	34	456.917	7,7 (5,3-10,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	7	119.456	5,4 (2,1-12,1)	0,74 (0,33-1,68)	-2,4
	Disagiata	86	656.510	13,9 (11,0-17,3)	1,82 (1,22-2,71)	38,8
1977-1981	Agiata	31	448.338	7,0 (4,7-10,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	7	111.491	5,9 (2,3-13,0)	0,86 (0,38-1,95)	-1,2
	Disagiata	57	675.727	9,4 (7,0-12,3)	1,34 (0,86-2,08)	14,4
1982-1986	Agiata	27	426.504	6,4 (4,2-9,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	20	201.123	8,7 (5,3-14,0)	1,50 (0,84-2,68)	6,7
	Disagiata	50	584.681	9,2 (6,8-12,2)	1,51 (0,94-2,41)	16,8
1987-1991	Agiata	27	407.335	6,3 (4,1-9,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	18	191.294	8,6 (5,0-14,2)	1,42 (0,78-2,57)	5,3
	Disagiata	34	571.444	6,0 (4,1-8,4)	0,96 (0,58-1,59)	-1,5
1992-1996	Agiata	17	388.440	4,1 (2,4-6,8)	1	0,0
	Mediamente agiata	18	315.642	5,3 (3,1-8,6)	1,31 (0,67-2,53)	4,2
	Disagiata	38	402.750	9,8 (6,9-13,5)	2,35 (1,32-4,18)	21,8
1997-2001	Agiata	21	376.370	5,3 (3,2-8,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	18	304.717	5,7 (3,3-9,3)	1,08 (0,58-2,03)	1,3
	Disagiata	17	402.029	4,4 (2,6-7,1)	0,84 (0,44-1,60)	-3,2
2002-2006	Agiata	13	343.735	3,6 (1,9-6,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	11	354.845	3,1 (1,5-5,7)	0,85 (0,38-1,90)	-1,9
	Disagiata	15	269.517	6,0 (3,3-10,0)	1,69 (0,80-3,58)	6,1
2007-2011	Agiata	13	298.835	3,7 (1,9-6,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	9	304.186	2,7 (1,2-5,5)	0,70 (0,30-1,63)	-3,9
	Disagiata	18	233.573	7,8 (4,6-12,7)	1,93 (0,94-3,96)	8,7

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Agiata	58	456.917	13,2 (10,0-17,2)	1	0,0
	Mediamente agiata	10	119.456	7,5 (3,6-14,8)	0,61 (0,31-1,20)	-6,3
	Disagiata	66	656.510	10,6 (8,1-13,6)	0,84 (0,59-1,19)	-12,7
1977-1981	Agiata	53	448.338	12,1 (9,1-15,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	11	111.491	9,3 (4,6-17,3)	0,80 (0,46-1,39)	-2,8
	Disagiata	82	675.727	12,8 (10,1-16,0)	1,09 (0,81-1,46)	6,8
1982-1986	Agiata	47	426.504	10,7 (7,8-14,4)	1	0,0
	Mediamente agiata	19	201.123	9,1 (5,4-14,7)	0,81 (0,48-1,38)	-4,4
	Disagiata	76	584.681	13,8 (10,8-17,3)	1,28 (0,89-1,85)	16,7
1987-1991	Agiata	48	407.335	11,6 (8,5-15,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	30	191.294	13,9 (9,2-20,3)	1,30 (0,82-2,05)	6,9
	Disagiata	88	571.444	15,7 (12,6-19,4)	1,40 (0,98-1,99)	25,1
1992-1996	Agiata	52	388.440	13,8 (10,3-18,3)	1	0,0
	Mediamente agiata	42	315.642	13,4 (9,6-18,2)	1,00 (0,70-1,43)	-0,2
	Disagiata	63	402.750	15,9 (12,2-20,5)	1,18 (0,85-1,64)	9,8
1997-2001	Agiata	38	376.370	9,8 (6,9-13,7)	1	0,0
	Mediamente agiata	35	304.717	11,2 (7,7-15,7)	1,16 (0,81-1,66)	4,7
	Disagiata	33	402.029	8,5 (5,8-12,0)	0,86 (0,60-1,24)	-5,3
2002-2006	Agiata	43	343.735	12,6 (9,1-17,0)	1	0,0
	Mediamente agiata	32	354.845	8,8 (6,0-12,5)	0,75 (0,47-1,18)	-10,7
	Disagiata	40	269.517	15,6 (11,1-21,4)	1,31 (0,85-2,03)	9,6
2007-2011	Agiata	39	298.835	12,9 (9,1-17,9)	1	0,0
	Mediamente agiata	36	304.186	11,6 (8,1-16,3)	0,92 (0,58-1,44)	-3,2
	Disagiata	31	233.573	13,0 (8,8-18,7)	1,07 (0,66-1,71)	1,9