

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	4.020	75.048	5602,3 (5429,4-5779,5)	1	0,0	271,4
	Mediamente agiata	1.604	31.943	5246,8 (4991,6-5512,2)	0,94 (0,92-0,95)	-106,5	257,2
	Disagiata	6.713	108.866	6448,5 (6294,4-6605,6)	1,15 (1,14-1,16)	880,4	312,3
1977-1981	Agiata	4.284	91.395	4955,1 (4806,7-5107,0)	1	0,0	237,6
	Mediamente agiata	1.762	37.553	4734,7 (4516,2-4961,2)	0,96 (0,92-1,00)	-82,9	221,4
	Disagiata	6.958	120.067	5982,9 (5842,8-6125,6)	1,21 (1,17-1,24)	1.195,8	285,6
1982-1986	Agiata	3.665	78.547	4619,8 (4471,0-4772,4)	1	0,0	214
	Mediamente agiata	2.982	61.962	4668,7 (4501,4-4841,0)	1,01 (0,94-1,09)	32,5	212,2
	Disagiata	6.403	104.783	5867,8 (5723,8-6014,8)	1,27 (1,19-1,35)	1.359,3	279,3
1987-1991	Agiata	3.928	96.900	4044,4 (3918,1-4174,0)	1	0,0	188,9
	Mediamente agiata	3.001	68.534	4115,4 (3967,3-4267,9)	1,01 (0,97-1,06)	40,6	193,6
	Disagiata	5.696	106.860	5048,7 (4916,5-5183,7)	1,24 (1,19-1,29)	1.108,8	244
1992-1996	Agiata	3.967	107.191	3736,1 (3619,3-3856,0)	1	0,0	174,2
	Mediamente agiata	4.242	104.734	3959,3 (3839,6-4081,8)	1,05 (0,98-1,14)	216,8	178,5
	Disagiata	4.525	88.289	4863,2 (4719,9-5009,9)	1,29 (1,20-1,39)	1.018,3	236,6
1997-2001	Agiata	4.081	127.881	3235,7 (3137,1-3336,8)	1	0,0	142,6
	Mediamente agiata	4.102	117.670	3414,3 (3310,5-3520,6)	1,06 (1,01-1,10)	215,0	146,9
	Disagiata	3.917	92.462	4184,1 (4054,1-4317,4)	1,29 (1,24-1,35)	884,7	189
2002-2006	Agiata	3.878	133.597	2721,4 (2635,9-2809,1)	1	0,0	113,6
	Mediamente agiata	5.382	160.299	3089,4 (3006,6-3174,0)	1,13 (1,03-1,25)	636,5	126,1
	Disagiata	3.156	72.137	4101,8 (3958,5-4249,2)	1,50 (1,36-1,67)	1.056,9	193,2
2007-2011	Agiata	3.998	145.423	2427,8 (2351,4-2506,3)	1	0,0	104
	Mediamente agiata	5.121	161.102	2698,8 (2622,4-2777,2)	1,11 (1,02-1,21)	518,8	116,1
	Disagiata	2.829	70.628	3597,6 (3463,3-3736,1)	1,47 (1,34-1,61)	906,7	163,4

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	991	75.048	1351,8 (1268,4-1439,5)	1	0,0	82,8
	Mediamente agiata	417	31.943	1337,6 (1211,7-1473,7)	0,99 (0,84-1,16)	-5,3	75,2
	Disagiata	1.607	108.866	1514,5 (1441,0-1591,0)	1,12 (1,00-1,25)	168,0	90,6
1977-1981	Agiata	1.128	91.395	1276,5 (1202,6-1354,0)	1	0,0	73,9
	Mediamente agiata	459	37.553	1229,4 (1119,4-1347,3)	0,96 (0,86-1,07)	-18,2	71
	Disagiata	1.861	120.067	1582,2 (1511,0-1656,1)	1,24 (1,15-1,33)	356,5	89,6
1982-1986	Agiata	1.096	78.547	1383,9 (1302,9-1468,8)	1	0,0	80,6
	Mediamente agiata	877	61.962	1384,7 (1293,8-1480,7)	1,00 (0,92-1,09)	1,2	76,1
	Disagiata	1.846	104.783	1716,0 (1637,9-1797,2)	1,24 (1,15-1,34)	356,2	102,7
1987-1991	Agiata	1.348	96.900	1396,9 (1322,8-1474,3)	1	0,0	77,5
	Mediamente agiata	1.055	68.534	1480,4 (1391,1-1574,1)	1,06 (0,98-1,15)	62,6	83
	Disagiata	1.845	106.860	1683,4 (1606,5-1763,3)	1,20 (1,12-1,29)	305,5	101,5
1992-1996	Agiata	1.427	107.191	1343,5 (1273,9-1416,2)	1	0,0	75,1
	Mediamente agiata	1.569	104.734	1480,8 (1407,7-1556,8)	1,10 (1,02-1,18)	139,1	78,6
	Disagiata	1.619	88.289	1778,0 (1691,2-1868,3)	1,31 (1,22-1,41)	386,0	102,5
1997-2001	Agiata	1.578	127.881	1244,5 (1183,8-1307,6)	1	0,0	67,3
	Mediamente agiata	1.524	117.670	1275,6 (1212,3-1341,4)	1,03 (0,96-1,10)	40,9	68
	Disagiata	1.456	92.462	1564,5 (1485,1-1647,0)	1,26 (1,17-1,35)	298,5	87,8
2002-2006	Agiata	1.585	133.597	1134,6 (1079,1-1192,4)	1	0,0	57,6
	Mediamente agiata	2.153	160.299	1268,6 (1215,1-1324,0)	1,12 (1,05-1,19)	227,0	63,4
	Disagiata	1.196	72.137	1592,6 (1502,8-1686,6)	1,39 (1,29-1,50)	333,7	89,1
2007-2011	Agiata	1.672	145.423	1059,1 (1007,8-1112,5)	1	0,0	55,3
	Mediamente agiata	2.076	161.102	1153,2 (1102,2-1206,2)	1,09 (1,03-1,15)	172,6	59,8
	Disagiata	1.084	70.628	1427,5 (1342,0-1517,4)	1,34 (1,25-1,43)	272,4	77

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	68	75.048	92,1 (71,4-117,1)	1	0,0	5,9
	Mediamente agiata	32	31.943	101,9 (69,6-145,0)	1,11 (0,80-1,53)	3,1	5,9
	Disagiata	178	108.866	166,2 (142,5-192,8)	1,80 (1,45-2,24)	79,4	10,8
1977-1981	Agiata	58	91.395	63,8 (48,4-83,0)	1	0,0	4,5
	Mediamente agiata	18	37.553	48,3 (28,6-76,4)	0,74 (0,44-1,25)	-6,3	2,6
	Disagiata	175	120.067	148,4 (127,2-172,3)	2,27 (1,69-3,06)	98,0	9
1982-1986	Agiata	61	78.547	77,2 (59,0-99,4)	1	0,0	5,7
	Mediamente agiata	48	61.962	77,0 (56,5-102,8)	0,99 (0,68-1,45)	-0,3	6
	Disagiata	137	104.783	129,4 (108,4-153,4)	1,68 (1,24-2,27)	55,3	8,7
1987-1991	Agiata	62	96.900	63,7 (48,7-82,1)	1	0,0	4,5
	Mediamente agiata	54	68.534	75,9 (56,8-99,7)	1,22 (0,93-1,59)	9,6	4,6
	Disagiata	126	106.860	116,3 (96,7-138,9)	1,82 (1,46-2,28)	56,9	8,6
1992-1996	Agiata	67	107.191	63,4 (49,0-81,1)	1	0,0	4,2
	Mediamente agiata	70	104.734	64,5 (50,2-81,9)	1,06 (0,76-1,48)	3,9	4
	Disagiata	100	88.289	112,8 (91,6-137,6)	1,78 (1,31-2,43)	43,9	8,2
1997-2001	Agiata	88	127.881	69,4 (55,7-85,7)	1	0,0	3,9
	Mediamente agiata	52	117.670	43,3 (32,3-56,9)	0,63 (0,39-1,04)	-29,9	2,1
	Disagiata	66	92.462	71,5 (55,3-90,9)	1,03 (0,65-1,63)	1,9	6
2002-2006	Agiata	51	133.597	37,6 (28,0-49,7)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	86	160.299	51,8 (41,3-64,2)	1,40 (1,06-1,85)	24,5	3
	Disagiata	69	72.137	95,3 (74,0-121,0)	2,50 (1,87-3,35)	41,4	7
2007-2011	Agiata	71	145.423	46,9 (36,4-59,6)	1	0,0	2,8
	Mediamente agiata	81	161.102	45,8 (36,0-57,8)	1,01 (0,83-1,23)	0,6	2,5
	Disagiata	62	70.628	83,0 (63,3-107,4)	1,80 (1,45-2,22)	27,5	4,8

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	113	75.048	154,7 (127,4-186,5)	1	0,0	9
	Mediamente agiata	71	31.943	233,5 (182,1-295,7)	1,48 (1,21-1,81)	22,9	10,8
	Disagiata	220	108.866	210,7 (183,6-240,7)	1,34 (1,15-1,57)	56,0	10,3
1977-1981	Agiata	116	91.395	130,9 (108,0-157,4)	1	0,0	7,8
	Mediamente agiata	67	37.553	180,0 (139,5-228,7)	1,36 (1,07-1,73)	17,8	9,4
	Disagiata	228	120.067	194,2 (169,8-221,3)	1,47 (1,23-1,76)	73,0	10,3
1982-1986	Agiata	92	78.547	115,4 (93,0-141,8)	1	0,0	6
	Mediamente agiata	62	61.962	98,2 (75,1-126,5)	0,84 (0,65-1,08)	-11,8	4,5
	Disagiata	174	104.783	161,2 (138,0-187,6)	1,38 (1,13-1,69)	48,0	8,7
1987-1991	Agiata	100	96.900	102,6 (83,4-125,3)	1	0,0	6,1
	Mediamente agiata	88	68.534	118,6 (94,8-146,9)	1,19 (0,89-1,59)	14,1	5,5
	Disagiata	142	106.860	128,1 (107,7-151,6)	1,24 (0,96-1,60)	27,3	7,8
1992-1996	Agiata	84	107.191	80,7 (64,1-100,4)	1	0,0	3,6
	Mediamente agiata	122	104.734	114,0 (94,5-136,6)	1,44 (1,09-1,90)	37,1	5,7
	Disagiata	92	88.289	96,7 (77,6-119,3)	1,24 (0,92-1,67)	18,0	5,7
1997-2001	Agiata	70	127.881	55,2 (43,0-69,9)	1	0,0	3,1
	Mediamente agiata	81	117.670	67,8 (53,8-84,3)	1,23 (0,89-1,70)	15,2	3,4
	Disagiata	89	92.462	95,9 (77,0-118,0)	1,73 (1,27-2,37)	37,7	5,4
2002-2006	Agiata	66	133.597	47,9 (37,0-61,1)	1	0,0	2,7
	Mediamente agiata	131	160.299	79,4 (66,3-94,6)	1,64 (1,37-1,96)	51,2	4,9
	Disagiata	54	72.137	71,4 (53,5-93,8)	1,51 (1,21-1,87)	18,2	4,2
2007-2011	Agiata	55	145.423	36,5 (27,3-47,9)	1	0,0	2,2
	Mediamente agiata	105	161.102	59,3 (48,1-72,6)	1,68 (1,36-2,09)	42,6	3,2
	Disagiata	51	70.628	66,9 (49,5-88,9)	1,91 (1,48-2,46)	24,3	3,3

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	87	75.048	120,0 (96,0-148,5)	1	0,0	7
	Mediamente agiata	34	31.943	111,2 (76,8-156,5)	0,92 (0,51-1,65)	-2,9	5,4
	Disagiata	132	108.866	126,0 (105,3-149,7)	1,05 (0,70-1,57)	6,2	7
1977-1981	Agiata	94	91.395	106,2 (85,7-130,3)	1	0,0	6,2
	Mediamente agiata	41	37.553	109,9 (78,8-149,2)	1,03 (0,71-1,49)	1,2	6,8
	Disagiata	135	120.067	115,1 (96,5-136,4)	1,08 (0,83-1,40)	9,7	6,5
1982-1986	Agiata	88	78.547	111,6 (89,5-137,8)	1	0,0	5,7
	Mediamente agiata	81	61.962	128,8 (102,1-160,7)	1,15 (0,92-1,43)	10,5	6,2
	Disagiata	126	104.783	116,6 (97,0-139,3)	1,05 (0,86-1,28)	5,6	6,3
1987-1991	Agiata	115	96.900	117,1 (96,5-141,0)	1	0,0	5,8
	Mediamente agiata	93	68.534	131,7 (106,0-162,2)	1,09 (0,83-1,43)	7,5	7
	Disagiata	133	106.860	117,7 (98,3-140,0)	1,00 (0,78-1,28)	0,1	6,8
1992-1996	Agiata	122	107.191	115,4 (95,6-138,4)	1	0,0	5,9
	Mediamente agiata	122	104.734	115,4 (95,6-138,2)	0,99 (0,94-1,05)	-0,9	5,9
	Disagiata	115	88.289	125,0 (102,9-150,7)	1,08 (1,02-1,14)	8,6	6,3
1997-2001	Agiata	142	127.881	112,4 (94,7-132,6)	1	0,0	5,3
	Mediamente agiata	117	117.670	97,9 (81,0-117,5)	0,87 (0,68-1,12)	-16,9	5,1
	Disagiata	108	92.462	116,2 (95,3-140,3)	1,03 (0,80-1,33)	3,4	7,2
2002-2006	Agiata	146	133.597	103,9 (87,7-122,5)	1	0,0	4,7
	Mediamente agiata	209	160.299	121,8 (105,7-139,9)	1,18 (0,95-1,45)	31,3	6
	Disagiata	85	72.137	111,3 (88,7-138,1)	1,07 (0,82-1,39)	5,4	5,3
2007-2011	Agiata	169	145.423	107,4 (91,4-125,6)	1	0,0	6,4
	Mediamente agiata	194	161.102	105,1 (90,3-122,0)	1,01 (0,82-1,24)	1,5	5
	Disagiata	97	70.628	123,9 (100,0-152,3)	1,18 (0,92-1,52)	15,1	5,7

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	61	75.048	84,1 (64,2-108,4)	1	0,0	4,6
	Mediamente agiata	26	31.943	82,4 (53,7-122,0)	1,00 (0,63-1,59)	0,1	5
	Disagiata	92	108.866	88,2 (71,0-108,4)	1,04 (0,75-1,44)	3,5	4,7
1977-1981	Agiata	58	91.395	67,1 (50,9-87,1)	1	0,0	2,9
	Mediamente agiata	29	37.553	78,0 (52,2-112,1)	1,17 (0,84-1,64)	4,2	3,4
	Disagiata	88	120.067	74,8 (60,0-92,4)	1,13 (0,88-1,45)	10,1	4,1
1982-1986	Agiata	35	78.547	44,3 (30,8-61,9)	1	0,0	3
	Mediamente agiata	42	61.962	66,6 (47,9-90,7)	1,50 (0,96-2,34)	13,9	3,3
	Disagiata	64	104.783	58,1 (44,6-74,6)	1,34 (0,89-2,02)	16,3	3
1987-1991	Agiata	48	96.900	49,4 (36,3-65,9)	1	0,0	2,5
	Mediamente agiata	37	68.534	50,7 (35,5-70,7)	1,02 (0,84-1,24)	0,8	2,2
	Disagiata	50	106.860	44,9 (33,2-59,7)	0,89 (0,75-1,07)	-5,9	2
1992-1996	Agiata	34	107.191	32,0 (22,1-45,3)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	44	104.734	40,4 (29,2-54,7)	1,27 (0,81-1,99)	9,5	2
	Disagiata	48	88.289	52,7 (38,6-70,3)	1,59 (1,03-2,47)	17,9	2,3
1997-2001	Agiata	43	127.881	33,5 (24,3-45,3)	1	0,0	1,7
	Mediamente agiata	55	117.670	46,1 (34,7-60,1)	1,36 (0,91-2,03)	14,7	2,6
	Disagiata	46	92.462	49,3 (36,1-65,8)	1,47 (0,97-2,22)	14,6	2,5
2002-2006	Agiata	50	133.597	35,7 (26,5-47,3)	1	0,0	2,1
	Mediamente agiata	64	160.299	36,4 (27,9-46,7)	1,05 (0,72-1,52)	3,0	1,2
	Disagiata	35	72.137	45,4 (31,5-63,6)	1,28 (0,83-1,97)	7,7	1,9
2007-2011	Agiata	49	145.423	29,6 (21,8-39,6)	1	0,0	0,9
	Mediamente agiata	58	161.102	29,9 (22,5-39,4)	1,02 (0,70-1,50)	1,4	1
	Disagiata	33	70.628	44,0 (30,0-62,8)	1,38 (0,89-2,15)	9,2	2,7

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	25	75.048	33,1 (21,4-49,3)	1	0,0	2,6
	Mediamente agiata	11	31.943	34,2 (17,0-62,6)	1,03 (0,61-1,73)	0,3	2,4
	Disagiata	38	108.866	35,0 (24,7-48,4)	1,04 (0,72-1,51)	1,6	2,6
1977-1981	Agiata	36	91.395	40,8 (28,5-56,9)	1	0,0	2,4
	Mediamente agiata	18	37.553	48,2 (28,6-76,3)	1,19 (0,84-1,67)	2,8	2,5
	Disagiata	63	120.067	53,3 (40,9-68,3)	1,32 (1,03-1,69)	15,2	3,5
1982-1986	Agiata	57	78.547	70,2 (53,1-91,3)	1	0,0	3,6
	Mediamente agiata	49	61.962	79,5 (58,6-105,7)	1,07 (0,73-1,57)	3,4	4,8
	Disagiata	97	104.783	90,2 (73,0-110,5)	1,25 (0,90-1,74)	19,6	5,7
1987-1991	Agiata	82	96.900	85,7 (68,0-106,8)	1	0,0	5,3
	Mediamente agiata	52	68.534	75,3 (56,0-99,5)	0,87 (0,66-1,16)	-7,6	5,2
	Disagiata	86	106.860	79,1 (63,1-98,2)	0,93 (0,73-1,19)	-6,6	4,9
1992-1996	Agiata	101	107.191	97,0 (78,8-118,5)	1	0,0	5,1
	Mediamente agiata	96	104.734	90,7 (73,4-111,2)	0,96 (0,73-1,27)	-4,0	5,6
	Disagiata	120	88.289	135,6 (112,3-162,6)	1,41 (1,08-1,84)	34,9	10,1
1997-2001	Agiata	104	127.881	81,6 (66,7-99,0)	1	0,0	4,4
	Mediamente agiata	97	117.670	81,6 (66,1-99,6)	1,00 (0,76-1,31)	-0,4	5,1
	Disagiata	92	92.462	99,0 (79,8-121,4)	1,22 (0,92-1,61)	16,4	4,7
2002-2006	Agiata	121	133.597	87,1 (72,2-104,3)	1	0,0	4,4
	Mediamente agiata	132	160.299	78,8 (65,8-93,7)	0,90 (0,73-1,10)	-15,0	4
	Disagiata	59	72.137	79,5 (60,4-103,1)	0,90 (0,70-1,16)	-6,6	4,9
2007-2011	Agiata	118	145.423	74,0 (61,0-89,3)	1	0,0	3,5
	Mediamente agiata	152	161.102	88,4 (74,4-104,6)	1,14 (0,92-1,40)	18,2	5,7
	Disagiata	60	70.628	79,7 (60,5-103,6)	1,05 (0,80-1,37)	2,7	4,4

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	211	75.048	282,7 (245,6-324,0)	1	0,0	20,4
	Mediamente agiata	89	31.943	279,8 (224,5-345,5)	0,99 (0,77-1,26)	-1,2	19,2
	Disagiata	381	108.866	349,7 (315,3-387,0)	1,24 (1,05-1,47)	74,2	26,6
1977-1981	Agiata	287	91.395	317,0 (281,2-356,4)	1	0,0	22,1
	Mediamente agiata	109	37.553	290,5 (238,5-350,6)	0,91 (0,75-1,11)	-10,4	20,3
	Disagiata	507	120.067	427,1 (390,7-466,2)	1,33 (1,17-1,52)	127,2	27,2
1982-1986	Agiata	297	78.547	374,3 (332,8-419,7)	1	0,0	24,9
	Mediamente agiata	227	61.962	359,3 (313,6-410,1)	0,96 (0,83-1,12)	-8,9	22,9
	Disagiata	558	104.783	526,7 (483,4-573,0)	1,40 (1,24-1,58)	158,8	37,5
1987-1991	Agiata	380	96.900	395,8 (356,7-438,2)	1	0,0	24,8
	Mediamente agiata	277	68.534	403,7 (357,0-455,1)	1,01 (0,90-1,14)	2,6	26,5
	Disagiata	549	106.860	511,3 (468,9-556,7)	1,29 (1,17-1,42)	122,9	34,6
1992-1996	Agiata	392	107.191	365,7 (330,1-404,5)	1	0,0	25
	Mediamente agiata	479	104.734	459,1 (418,6-502,6)	1,23 (1,08-1,41)	90,9	27,9
	Disagiata	517	88.289	575,4 (526,2-628,0)	1,56 (1,37-1,78)	186,5	36,7
1997-2001	Agiata	467	127.881	366,1 (333,6-401,0)	1	0,0	21,7
	Mediamente agiata	486	117.670	409,1 (373,5-447,3)	1,12 (0,98-1,27)	51,3	25,7
	Disagiata	517	92.462	557,4 (510,4-607,6)	1,52 (1,34-1,73)	177,7	35,6
2002-2006	Agiata	464	133.597	335,1 (305,1-367,3)	1	0,0	17,6
	Mediamente agiata	687	160.299	409,9 (379,6-442,2)	1,22 (1,08-1,37)	124,1	22,2
	Disagiata	448	72.137	606,9 (551,6-666,5)	1,78 (1,56-2,03)	196,2	37,1
2007-2011	Agiata	481	145.423	307,1 (279,7-336,6)	1	0,0	15,8
	Mediamente agiata	636	161.102	364,0 (335,2-394,9)	1,17 (1,04-1,31)	90,2	20,7
	Disagiata	354	70.628	476,1 (426,9-529,9)	1,51 (1,32-1,74)	120,2	27,7

MORTALITÀ per TUMORE DELLA PROSTATA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	116	75.048	165,4 (136,5-198,7)	1	0,0	6,2
	Mediamente agiata	34	31.943	112,3 (77,6-158,0)	0,69 (0,47-1,02)	-15,1	4,6
	Disagiata	145	108.866	143,5 (121,0-169,1)	0,86 (0,68-1,10)	-22,7	4,8
1977-1981	Agiata	108	91.395	129,7 (106,2-156,9)	1	0,0	4,3
	Mediamente agiata	52	37.553	139,7 (104,4-183,4)	1,09 (0,67-1,78)	4,3	6,4
	Disagiata	154	120.067	134,9 (114,4-158,1)	1,05 (0,72-1,52)	6,7	4,2
1982-1986	Agiata	102	78.547	127,6 (104,0-155,1)	1	0,0	3,1
	Mediamente agiata	81	61.962	122,7 (97,3-153,2)	0,98 (0,70-1,36)	-1,7	3,3
	Disagiata	155	104.783	138,5 (117,4-162,5)	1,08 (0,81-1,45)	11,5	4,4
1987-1991	Agiata	131	96.900	136,4 (113,9-162,3)	1	0,0	5,5
	Mediamente agiata	97	68.534	126,2 (102,1-154,8)	0,97 (0,74-1,26)	-3,5	4,7
	Disagiata	144	106.860	127,5 (107,2-150,7)	0,93 (0,73-1,18)	-11,2	5,2
1992-1996	Agiata	137	107.191	129,6 (108,5-153,9)	1	0,0	4,3
	Mediamente agiata	160	104.734	145,5 (123,5-170,5)	1,13 (0,90-1,42)	18,4	3,9
	Disagiata	133	88.289	140,4 (117,1-167,2)	1,06 (0,83-1,34)	7,0	5,8
1997-2001	Agiata	129	127.881	102,9 (85,9-122,4)	1	0,0	3,8
	Mediamente agiata	137	117.670	112,9 (94,8-133,6)	1,10 (0,92-1,32)	12,5	3,3
	Disagiata	113	92.462	119,9 (98,8-144,2)	1,17 (0,97-1,41)	16,1	3,7
2002-2006	Agiata	128	133.597	88,4 (73,6-105,4)	1	0,0	3,4
	Mediamente agiata	181	160.299	101,8 (87,4-118,2)	1,16 (1,01-1,32)	24,5	3,4
	Disagiata	83	72.137	105,1 (83,5-130,9)	1,18 (1,01-1,38)	12,7	4,2
2007-2011	Agiata	138	145.423	82,2 (68,8-97,8)	1	0,0	3,1
	Mediamente agiata	161	161.102	81,5 (69,0-96,1)	1,01 (0,80-1,27)	1,4	2,6
	Disagiata	61	70.628	77,2 (58,6-100,3)	0,91 (0,68-1,23)	-5,8	3,5

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	81	75.048	113,9 (90,4-142,0)	1	0,0	4,8
	Mediamente agiata	28	31.943	91,5 (60,6-133,5)	0,82 (0,64-1,04)	-6,3	4,9
	Disagiata	122	108.866	117,7 (97,6-140,8)	1,04 (0,89-1,22)	4,9	5,6
1977-1981	Agiata	90	91.395	103,3 (82,9-127,3)	1	0,0	5,3
	Mediamente agiata	29	37.553	78,5 (52,5-112,8)	0,75 (0,49-1,14)	-9,7	2,4
	Disagiata	101	120.067	86,3 (70,3-105,0)	0,83 (0,63-1,11)	-20,0	4,3
1982-1986	Agiata	40	78.547	50,7 (36,2-69,3)	1	0,0	2,5
	Mediamente agiata	34	61.962	54,5 (37,6-76,9)	1,06 (0,83-1,34)	1,9	3,2
	Disagiata	67	104.783	61,1 (47,2-78,0)	1,22 (1,00-1,50)	12,1	2,7
1987-1991	Agiata	41	96.900	42,0 (30,0-57,3)	1	0,0	2,2
	Mediamente agiata	30	68.534	42,1 (28,2-60,8)	0,97 (0,66-1,42)	-1,1	1,9
	Disagiata	61	106.860	52,2 (39,7-67,6)	1,27 (0,92-1,75)	12,8	2
1992-1996	Agiata	92	107.191	87,0 (69,9-107,3)	1	0,0	3,3
	Mediamente agiata	96	104.734	90,3 (72,9-110,7)	1,02 (0,77-1,36)	2,0	3
	Disagiata	110	88.289	120,3 (98,6-145,6)	1,33 (1,01-1,76)	27,5	5,8
1997-2001	Agiata	110	127.881	87,4 (71,8-105,4)	1	0,0	3,7
	Mediamente agiata	103	117.670	85,7 (70,0-104,1)	0,98 (0,90-1,07)	-1,9	3,7
	Disagiata	95	92.462	101,5 (82,1-124,1)	1,16 (1,07-1,26)	13,2	4,7
2002-2006	Agiata	88	133.597	62,5 (50,0-77,2)	1	0,0	2,7
	Mediamente agiata	106	160.299	62,0 (50,7-75,3)	0,99 (0,77-1,27)	-1,1	3
	Disagiata	89	72.137	114,8 (91,9-141,8)	1,85 (1,43-2,41)	41,0	5,4
2007-2011	Agiata	61	145.423	37,9 (28,8-49,3)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	108	161.102	56,5 (45,9-69,1)	1,54 (1,13-2,11)	38,0	2,3
	Disagiata	83	70.628	106,2 (84,1-132,8)	2,81 (2,02-3,91)	53,4	5,2

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	1.928	75.048	2708,4 (2588,2-2833,0)	1	0,0	117,9
	Mediamente agiata	767	31.943	2531,1 (2354,0-2718,5)	0,94 (0,86-1,02)	-53,0	115,5
	Disagiata	3.222	108.866	3129,0 (3021,4-3239,6)	1,15 (1,09-1,22)	425,4	131,3
1977-1981	Agiata	2.103	91.395	2459,1 (2354,4-2567,4)	1	0,0	106,1
	Mediamente agiata	877	37.553	2360,0 (2206,4-2521,7)	0,96 (0,90-1,02)	-37,8	97,5
	Disagiata	3.267	120.067	2829,5 (2733,1-2928,6)	1,15 (1,10-1,20)	424,7	119
1982-1986	Agiata	1.718	78.547	2162,6 (2061,3-2267,8)	1	0,0	89,4
	Mediamente agiata	1.424	61.962	2220,2 (2105,6-2339,8)	1,03 (0,96-1,10)	36,5	92,1
	Disagiata	2.933	104.783	2667,3 (2570,9-2766,6)	1,23 (1,16-1,31)	556,8	111,5
1987-1991	Agiata	1.750	96.900	1795,0 (1711,4-1881,9)	1	0,0	74
	Mediamente agiata	1.296	68.534	1745,2 (1650,0-1844,7)	0,97 (0,91-1,03)	-42,8	69,4
	Disagiata	2.385	106.860	2079,4 (1995,6-2166,1)	1,15 (1,09-1,21)	312,3	85,4
1992-1996	Agiata	1.637	107.191	1541,6 (1466,8-1619,4)	1	0,0	64
	Mediamente agiata	1.680	104.734	1555,5 (1481,1-1632,9)	1,00 (0,94-1,07)	6,2	65,1
	Disagiata	1.773	88.289	1882,7 (1794,3-1974,4)	1,20 (1,12-1,29)	298,6	78,6
1997-2001	Agiata	1.478	127.881	1176,4 (1117,0-1238,1)	1	0,0	44,4
	Mediamente agiata	1.553	117.670	1288,2 (1224,9-1354,1)	1,09 (1,02-1,17)	133,3	47
	Disagiata	1.425	92.462	1516,7 (1439,0-1597,7)	1,29 (1,20-1,38)	317,4	58,6
2002-2006	Agiata	1.304	133.597	903,1 (854,4-954,0)	1	0,0	32,1
	Mediamente agiata	1.826	160.299	1026,8 (979,9-1075,7)	1,13 (0,98-1,31)	216,8	33,9
	Disagiata	1.073	72.137	1373,0 (1291,2-1458,8)	1,52 (1,30-1,77)	366,6	55,7
2007-2011	Agiata	1.264	145.401	747,2 (705,6-790,8)	1	0,0	28,1
	Mediamente agiata	1.578	161.098	803,1 (762,4-845,7)	1,08 (0,95-1,22)	114,0	30
	Disagiata	901	70.610	1117,5 (1044,2-1195,1)	1,48 (1,28-1,71)	292,7	43,2

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	776	75.048	1071,1 (996,6-1149,8)	1	0,0	56,8
	Mediamente agiata	283	31.943	918,0 (813,6-1032,8)	0,86 (0,75-0,98)	-47,3	48,3
	Disagiata	1.103	108.866	1060,7 (998,7-1125,7)	0,98 (0,89-1,07)	-23,0	50,9
1977-1981	Agiata	856	91.395	981,8 (916,6-1050,5)	1	0,0	51,4
	Mediamente agiata	350	37.553	939,5 (843,6-1043,4)	0,95 (0,84-1,08)	-16,9	43,8
	Disagiata	1.219	120.067	1045,2 (987,2-1105,8)	1,06 (0,97-1,16)	70,4	51,9
1982-1986	Agiata	565	78.547	714,6 (656,7-776,4)	1	0,0	38,7
	Mediamente agiata	428	61.962	677,9 (614,6-746,3)	0,95 (0,84-1,07)	-23,8	39,9
	Disagiata	808	104.783	749,5 (698,2-803,7)	1,05 (0,94-1,17)	38,2	42,2
1987-1991	Agiata	599	96.900	616,5 (567,8-668,5)	1	0,0	31,3
	Mediamente agiata	382	68.534	530,0 (477,4-587,0)	0,85 (0,78-0,93)	-66,3	26,8
	Disagiata	746	106.860	669,2 (621,4-720,0)	1,07 (1,00-1,16)	51,4	33,5
1992-1996	Agiata	621	107.191	587,6 (541,7-636,7)	1	0,0	29,9
	Mediamente agiata	573	104.734	537,7 (494,2-584,3)	0,91 (0,82-1,02)	-53,4	26,9
	Disagiata	573	88.289	626,8 (575,7-681,4)	1,05 (0,94-1,18)	29,3	31,9
1997-2001	Agiata	531	127.881	420,5 (385,5-458,0)	1	0,0	17,6
	Mediamente agiata	567	117.670	471,0 (433,0-511,6)	1,12 (1,05-1,19)	61,5	19,6
	Disagiata	474	92.462	507,2 (462,6-555,1)	1,21 (1,13-1,29)	80,8	22,9
2002-2006	Agiata	489	133.597	343,7 (313,7-375,9)	1	0,0	14,4
	Mediamente agiata	703	160.299	403,0 (373,5-434,4)	1,18 (0,99-1,40)	106,2	16,5
	Disagiata	377	72.137	496,1 (446,8-549,5)	1,41 (1,15-1,73)	110,0	24,4
2007-2011	Agiata	476	145.401	289,1 (263,1-317,2)	1	0,0	12,9
	Mediamente agiata	597	161.098	314,9 (289,1-342,7)	1,09 (0,92-1,29)	50,5	14
	Disagiata	328	70.610	419,8 (374,7-469,4)	1,42 (1,17-1,74)	97,5	19,1

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	538	75.048	763,6 (700,1-831,5)	1	0,0	29,2
	Mediamente agiata	252	31.943	838,6 (737,6-950,1)	1,10 (0,95-1,28)	23,0	34,8
	Disagiata	1.023	108.866	996,1 (935,7-1059,5)	1,31 (1,18-1,45)	242,2	39,9
1977-1981	Agiata	606	91.395	716,2 (660,0-776,1)	1	0,0	26,8
	Mediamente agiata	272	37.553	733,9 (649,2-826,6)	1,02 (0,94-1,11)	5,8	26,1
	Disagiata	995	120.067	868,3 (815,0-924,2)	1,21 (1,14-1,28)	171,5	31,6
1982-1986	Agiata	564	78.547	709,2 (651,8-770,6)	1	0,0	25,1
	Mediamente agiata	483	61.962	744,1 (678,9-814,4)	1,05 (0,92-1,21)	24,7	26
	Disagiata	971	104.783	871,8 (817,5-929,0)	1,23 (1,09-1,39)	182,8	29,5
1987-1991	Agiata	533	96.900	545,7 (500,1-594,6)	1	0,0	18,9
	Mediamente agiata	399	68.534	526,0 (475,0-581,5)	0,97 (0,92-1,01)	-14,0	18
	Disagiata	737	106.860	631,6 (586,2-679,9)	1,15 (1,11-1,20)	97,5	22,6
1992-1996	Agiata	444	107.191	414,2 (376,0-455,4)	1	0,0	11,9
	Mediamente agiata	509	104.734	462,3 (422,4-505,2)	1,10 (0,97-1,25)	47,5	14
	Disagiata	526	88.289	541,3 (494,9-591,0)	1,27 (1,12-1,44)	112,3	17,6
1997-2001	Agiata	401	127.881	322,3 (291,5-355,6)	1	0,0	10,4
	Mediamente agiata	428	117.670	354,0 (321,3-389,3)	1,10 (0,96-1,26)	38,7	10,5
	Disagiata	412	92.462	436,3 (395,2-480,6)	1,35 (1,18-1,55)	107,1	14,9
2002-2006	Agiata	360	133.597	243,9 (219,2-270,8)	1	0,0	6,2
	Mediamente agiata	465	160.299	255,3 (232,5-280,0)	1,05 (0,92-1,21)	22,2	5,6
	Disagiata	273	72.137	339,5 (300,1-383,1)	1,38 (1,18-1,61)	74,7	10,9
2007-2011	Agiata	355	145.401	199,5 (178,8-222,1)	1	0,0	4,8
	Mediamente agiata	434	161.098	212,9 (192,7-235,1)	1,05 (0,91-1,21)	19,8	6,3
	Disagiata	232	70.610	277,7 (242,4-317,2)	1,35 (1,15-1,60)	60,5	8,2

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	321	75.048	451,8 (403,5-504,6)	1	0,0	19,4
	Mediamente agiata	115	31.943	382,3 (315,2-460,1)	0,84 (0,75-0,94)	-21,7	15,7
	Disagiata	600	108.866	578,7 (533,1-627,3)	1,29 (1,20-1,38)	134,0	26,5
1977-1981	Agiata	305	91.395	360,1 (320,5-403,3)	1	0,0	13,9
	Mediamente agiata	100	37.553	270,3 (219,9-328,9)	0,75 (0,60-0,94)	-33,7	9
	Disagiata	589	120.067	511,9 (471,3-555,2)	1,42 (1,24-1,63)	174,8	19,2
1982-1986	Agiata	305	78.547	382,5 (340,7-428,2)	1	0,0	11,6
	Mediamente agiata	244	61.962	376,1 (330,2-427,1)	0,99 (0,83-1,17)	-3,3	11,7
	Disagiata	612	104.783	556,4 (512,9-602,8)	1,44 (1,25-1,65)	186,9	21,3
1987-1991	Agiata	264	96.900	271,9 (239,9-307,2)	1	0,0	9,2
	Mediamente agiata	221	68.534	300,0 (261,1-343,3)	1,09 (0,82-1,45)	18,8	11,7
	Disagiata	537	106.860	463,9 (425,0-505,8)	1,71 (1,35-2,17)	223,5	17,7
1992-1996	Agiata	235	107.191	221,6 (193,8-252,5)	1	0,0	8
	Mediamente agiata	305	104.734	284,7 (253,2-319,3)	1,26 (0,98-1,61)	62,0	8,3
	Disagiata	381	88.289	397,1 (357,4-440,2)	1,77 (1,39-2,25)	165,7	14,9
1997-2001	Agiata	277	127.881	220,3 (195,1-248,0)	1	0,0	7
	Mediamente agiata	319	117.670	263,8 (235,6-294,5)	1,19 (1,01-1,40)	51,0	8,4
	Disagiata	332	92.462	351,7 (314,9-391,7)	1,59 (1,36-1,87)	123,4	10
2002-2006	Agiata	269	133.597	182,9 (161,6-206,5)	1	0,0	4,9
	Mediamente agiata	449	160.299	247,1 (224,6-271,4)	1,36 (1,17-1,58)	118,9	6,6
	Disagiata	314	72.137	394,6 (351,7-441,6)	2,12 (1,80-2,49)	165,8	14
2007-2011	Agiata	290	145.401	166,5 (147,5-187,5)	1	0,0	4,4
	Mediamente agiata	440	161.098	212,7 (192,7-234,7)	1,30 (1,12-1,51)	101,1	5,6
	Disagiata	278	70.610	333,7 (294,9-376,7)	1,98 (1,68-2,34)	137,7	9,2

MORTALITÀ per BPCO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	204	75.048	284,4 (246,5-326,7)	1	0,0	13,9
	Mediamente agiata	64	31.943	209,3 (160,9-268,4)	0,73 (0,67-0,80)	-23,4	10
	Disagiata	345	108.866	331,5 (297,2-368,7)		47,7	15,4
1977-1981	Agiata	167	91.395	195,1 (166,5-227,5)	1	0,0	8,3
	Mediamente agiata	37	37.553	100,1 (70,5-138,1)	0,51 (0,36-0,73)	-35,4	3,5
	Disagiata	317	120.067	273,1 (243,8-305,1)	1,40 (1,16-1,69)	91,3	11,8
1982-1986	Agiata	153	78.547	192,6 (163,2-225,8)	1	0,0	6,3
	Mediamente agiata	114	61.962	175,2 (144,4-211,2)	0,92 (0,72-1,17)	-9,9	5,3
	Disagiata	323	104.783	294,3 (262,8-328,7)	1,52 (1,25-1,84)	110,2	12
1987-1991	Agiata	180	96.900	184,9 (158,8-214,5)	1	0,0	6,4
	Mediamente agiata	145	68.534	198,7 (167,2-234,8)	1,05 (0,76-1,44)	6,4	8,6
	Disagiata	351	106.860	302,6 (271,3-336,7)	1,64 (1,26-2,13)	136,8	11,5
1992-1996	Agiata	152	107.191	142,7 (120,6-167,9)	1	0,0	5,7
	Mediamente agiata	178	104.734	164,8 (141,1-191,5)	1,14 (0,83-1,55)	21,3	4,9
	Disagiata	258	88.289	274,1 (241,0-310,6)	1,87 (1,39-2,50)	119,7	10,7
1997-2001	Agiata	147	127.881	116,3 (98,2-136,8)	1	0,0	3,2
	Mediamente agiata	209	117.670	173,0 (150,3-198,2)	1,48 (1,17-1,88)	68,1	5,6
	Disagiata	212	92.462	224,5 (195,3-256,9)	1,92 (1,52-2,42)	101,4	6,1
2002-2006	Agiata	137	133.597	92,6 (77,7-109,8)	1	0,0	2,3
	Mediamente agiata	234	160.299	128,2 (112,2-146,1)	1,39 (1,13-1,72)	65,7	3,3
	Disagiata	170	72.137	214,5 (183,2-250,0)	2,25 (1,80-2,82)	94,5	6,9
2007-2011	Agiata	128	145.401	73,0 (60,7-87,5)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	191	161.098	91,3 (78,4-106,1)	1,28 (1,02-1,60)	41,4	2,3
	Disagiata	138	70.610	164,7 (137,9-195,8)	2,23 (1,75-2,84)	76,1	4,6

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	122	75.048	167,3 (138,8-200,3)	1	0,0	10,2
	Mediamente agiata	58	31.943	184,1 (139,6-239,2)	1,11 (0,82-1,52)	5,9	11,2
	Disagiata	297	108.866	273,8 (243,4-307,1)	1,68 (1,36-2,07)	119,8	20
1977-1981	Agiata	136	91.395	149,9 (125,6-177,8)	1	0,0	10,8
	Mediamente agiata	56	37.553	150,0 (113,3-195,0)	1,00 (0,81-1,23)	0,0	9,9
	Disagiata	293	120.067	244,0 (216,8-273,8)	1,64 (1,43-1,88)	114,2	18,7
1982-1986	Agiata	82	78.547	103,1 (81,9-128,2)	1	0,0	5,8
	Mediamente agiata	55	61.962	86,6 (65,0-113,4)	0,84 (0,66-1,08)	-10,3	5,6
	Disagiata	208	104.783	196,4 (170,3-225,5)	1,88 (1,56-2,27)	97,2	13,2
1987-1991	Agiata	82	96.900	85,3 (67,7-106,3)	1	0,0	5,6
	Mediamente agiata	70	68.534	102,9 (80,0-130,7)	1,18 (0,75-1,87)	10,7	8,1
	Disagiata	177	106.860	163,2 (139,8-189,7)	1,92 (1,31-2,81)	84,8	9,6
1992-1996	Agiata	80	107.191	76,5 (60,4-95,7)	1	0,0	3,7
	Mediamente agiata	80	104.734	75,8 (60,0-94,7)	1,01 (0,74-1,37)	0,4	5,5
	Disagiata	127	88.289	142,7 (118,7-170,3)	1,87 (1,41-2,47)	58,9	9
1997-2001	Agiata	76	127.881	59,8 (47,1-74,9)	1	0,0	3,5
	Mediamente agiata	104	117.670	87,1 (71,1-105,6)	1,46 (1,21-1,78)	33,0	4,7
	Disagiata	102	92.462	110,0 (89,7-133,6)	1,84 (1,51-2,23)	46,5	7,2
2002-2006	Agiata	68	133.597	48,8 (37,8-62,1)	1	0,0	2,8
	Mediamente agiata	125	160.299	75,8 (63,0-90,7)	1,53 (1,14-2,05)	43,1	4,8
	Disagiata	72	72.137	100,7 (78,6-127,2)	1,95 (1,40-2,72)	35,2	7,9
2007-2011	Agiata	46	145.401	29,8 (21,7-40,2)	1	0,0	1,7
	Mediamente agiata	107	161.098	61,7 (50,2-75,4)	2,07 (1,47-2,93)	55,3	3,6
	Disagiata	58	70.610	83,0 (62,7-108,2)	2,60 (1,76-3,82)	35,7	6,4

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	106	75.048	147,3 (120,4-178,6)	1	0,0	7,6
	Mediamente agiata	48	31.943	153,9 (113,2-205,5)	1,05 (0,80-1,38)	2,4	8
	Disagiata	208	108.866	195,3 (169,5-224,0)	1,35 (1,12-1,63)	54,1	12,1
1977-1981	Agiata	109	91.395	123,7 (101,4-149,6)	1	0,0	7
	Mediamente agiata	49	37.553	130,7 (96,6-173,1)	1,06 (0,87-1,30)	2,7	6,7
	Disagiata	214	120.067	181,1 (157,6-207,3)	1,48 (1,29-1,70)	69,3	11,3
1982-1986	Agiata	78	78.547	98,1 (77,5-122,7)	1	0,0	5
	Mediamente agiata	66	61.962	103,5 (79,8-132,4)	1,05 (0,93-1,20)	3,4	5,2
	Disagiata	177	104.783	164,6 (141,1-191,2)	1,67 (1,50-1,85)	71,0	9,2
1987-1991	Agiata	79	96.900	80,8 (63,9-101,2)	1	0,0	4,4
	Mediamente agiata	62	68.534	87,5 (66,9-112,9)	1,07 (0,83-1,36)	3,8	5,6
	Disagiata	152	106.860	137,4 (116,1-161,7)	1,68 (1,37-2,05)	61,2	7,6
1992-1996	Agiata	81	107.191	77,3 (61,2-96,6)	1	0,0	3,7
	Mediamente agiata	83	104.734	78,1 (62,0-97,2)	1,02 (0,85-1,21)	1,4	4,3
	Disagiata	111	88.289	122,4 (100,4-147,9)	1,58 (1,34-1,86)	40,8	7,3
1997-2001	Agiata	86	127.881	68,2 (54,6-84,4)	1	0,0	3,5
	Mediamente agiata	102	117.670	85,0 (69,3-103,3)	1,25 (1,07-1,47)	20,7	4
	Disagiata	100	92.462	107,4 (87,4-130,7)	1,58 (1,35-1,84)	36,5	6
2002-2006	Agiata	80	133.597	56,5 (44,7-70,6)	1	0,0	2,7
	Mediamente agiata	123	160.299	72,4 (60,1-86,8)	1,27 (0,96-1,68)	26,0	3,7
	Disagiata	73	72.137	99,7 (78,0-125,8)	1,68 (1,22-2,31)	29,6	6,9
2007-2011	Agiata	66	145.423	41,0 (31,5-52,7)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	115	161.102	63,6 (52,1-77,2)	1,53 (1,13-2,06)	39,6	3,2
	Disagiata	67	70.628	92,5 (71,3-118,5)	2,09 (1,49-2,94)	35,2	6,3

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	669	75.048	927,3 (858,0-1001,0)	1	0,0	48,1
	Mediamente agiata	260	31.943	846,1 (745,8-956,9)	0,91 (0,85-0,97)	-25,5	43,6
	Disagiata	1.175	108.866	1121,3 (1057,8-1187,8)	1,21 (1,16-1,26)	202,9	58,4
1977-1981	Agiata	743	91.395	853,2 (792,5-917,5)	1	0,0	44,1
	Mediamente agiata	269	37.553	723,1 (639,3-814,9)	0,85 (0,77-0,93)	-49,1	36,5
	Disagiata	1.283	120.067	1100,3 (1040,8-1162,5)	1,29 (1,21-1,37)	284,7	54
1982-1986	Agiata	698	78.547	879,5 (815,3-947,5)	1	0,0	42,3
	Mediamente agiata	547	61.962	854,1 (783,5-929,8)	0,97 (0,87-1,09)	-14,3	40,1
	Disagiata	1.298	104.783	1197,8 (1132,9-1265,6)	1,36 (1,24-1,49)	340,6	63,5
1987-1991	Agiata	778	96.900	803,2 (747,4-862,4)	1	0,0	40,1
	Mediamente agiata	590	68.534	821,3 (755,4-891,7)	1,01 (0,91-1,13)	8,7	41,4
	Disagiata	1.190	106.860	1063,2 (1002,9-1126,5)	1,32 (1,21-1,45)	289,4	55,1
1992-1996	Agiata	744	107.191	696,8 (647,0-749,7)	1	0,0	37,4
	Mediamente agiata	850	104.734	799,0 (745,6-855,3)	1,13 (1,03-1,25)	100,1	39,5
	Disagiata	980	88.289	1063,1 (996,5-1133,1)	1,51 (1,37-1,66)	329,3	55,5
1997-2001	Agiata	786	127.881	619,9 (577,2-664,9)	1	0,0	30
	Mediamente agiata	842	117.670	702,9 (656,2-752,2)	1,13 (1,07-1,20)	98,3	34,4
	Disagiata	854	92.462	914,4 (854,1-977,9)	1,47 (1,39-1,56)	274,3	46,3
2002-2006	Agiata	745	133.597	526,9 (489,5-566,5)	1	0,0	23,4
	Mediamente agiata	1.091	160.299	632,4 (595,0-671,6)	1,20 (1,10-1,32)	184,1	28
	Disagiata	719	72.137	947,6 (879,0-1020,5)	1,77 (1,60-1,96)	312,4	48,7
2007-2011	Agiata	748	145.423	462,0 (428,7-497,3)	1	0,0	20,8
	Mediamente agiata	995	161.102	538,1 (503,9-574,4)	1,16 (1,06-1,28)	137,6	25,7
	Disagiata	584	70.628	754,2 (693,1-819,8)	1,61 (1,44-1,79)	221,4	36,1

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	1.007	75.048	1288,5 (1210,0-1371,2)	1	0,0	123,6
	Mediamente agiata	411	31.943	1230,9 (1114,7-1357,0)	0,95 (0,90-1,01)	-19,7	118,2
	Disagiata	1.662	108.866	1461,4 (1391,9-1533,7)	1,13 (1,09-1,18)	192,5	136,8
1977-1981	Agiata	1.105	91.395	1151,3 (1084,2-1221,6)	1	0,0	109,2
	Mediamente agiata	434	37.553	1144,0 (1038,9-1257,0)	0,99 (0,90-1,09)	-3,9	102,1
	Disagiata	1.636	120.067	1320,2 (1257,0-1386,0)	1,14 (1,07-1,22)	206,6	123,2
1982-1986	Agiata	764	78.547	948,6 (882,2-1018,9)	1	0,0	90,1
	Mediamente agiata	637	61.962	1006,1 (928,4-1089,0)	1,06 (1,05-1,07)	36,0	95,7
	Disagiata	1.259	104.783	1198,2 (1132,0-1267,4)	1,26 (1,25-1,28)	263,6	113,3
1987-1991	Agiata	714	96.900	778,6 (722,0-838,7)	1	0,0	74,5
	Mediamente agiata	489	68.534	807,2 (737,2-882,2)	1,03 (0,96-1,10)	13,5	74
	Disagiata	909	106.860	957,9 (896,5-1022,5)	1,22 (1,15-1,30)	164,7	89
1992-1996	Agiata	731	107.191	659,4 (612,4-709,4)	1	0,0	62,8
	Mediamente agiata	716	104.734	683,5 (634,4-735,7)	1,03 (0,98-1,09)	24,2	63,4
	Disagiata	685	88.289	811,8 (752,2-875,0)	1,23 (1,17-1,29)	127,6	74,8
1997-2001	Agiata	632	127.881	484,5 (447,5-523,9)	1	0,0	43,8
	Mediamente agiata	597	117.670	512,1 (471,8-554,9)	1,05 (1,00-1,11)	31,1	47,8
	Disagiata	594	92.462	650,3 (599,1-704,8)	1,34 (1,28-1,41)	151,1	60,2
2002-2006	Agiata	489	133.597	383,6 (350,4-419,3)	1	0,0	34,2
	Mediamente agiata	623	160.299	408,9 (377,3-442,5)	1,06 (1,02-1,10)	36,9	37,3
	Disagiata	426	72.137	618,7 (561,2-680,6)	1,61 (1,55-1,68)	161,9	55,2
2007-2011	Agiata	416	145.401	316,1 (286,3-348,3)	1	0,0	30,9
	Mediamente agiata	481	161.098	341,1 (310,9-373,6)	1,09 (1,04-1,13)	38,1	32,4
	Disagiata	314	70.610	490,6 (437,5-548,5)	1,56 (1,48-1,64)	112,5	46,9

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	157	75.048	219,5 (186,4-257,1)	1	0,0	10,1
	Mediamente agiata	63	31.943	208,6 (160,1-268,0)	0,94 (0,84-1,05)	-3,8	8,4
	Disagiata	210	108.866	203,2 (176,5-232,9)	0,92 (0,85-1,00)	-18,0	8,8
1977-1981	Agiata	138	91.395	161,6 (135,6-191,3)	1	0,0	6,8
	Mediamente agiata	73	37.553	196,2 (153,7-246,8)	1,22 (0,92-1,62)	13,2	9
	Disagiata	227	120.067	195,8 (171,1-223,2)	1,22 (0,99-1,51)	40,9	9,2
1982-1986	Agiata	107	78.547	137,1 (112,3-165,9)	1	0,0	6,6
	Mediamente agiata	102	61.962	158,7 (129,2-193,3)	1,18 (0,90-1,55)	15,7	5,9
	Disagiata	215	104.783	194,3 (169,1-222,6)	1,45 (1,15-1,83)	66,9	7,6
1987-1991	Agiata	98	96.900	98,5 (79,9-120,4)	1	0,0	4,8
	Mediamente agiata	75	68.534	101,8 (79,8-128,4)	1,02 (0,78-1,32)	1,1	5,1
	Disagiata	174	106.860	153,3 (131,0-178,4)	1,52 (1,22-1,89)	59,2	7
1992-1996	Agiata	105	107.191	99,9 (81,5-121,5)	1	0,0	5,3
	Mediamente agiata	123	104.734	117,0 (97,1-140,1)	1,16 (0,90-1,51)	17,2	5,4
	Disagiata	106	88.289	112,0 (91,3-136,2)	1,15 (0,88-1,51)	13,9	6,8
1997-2001	Agiata	108	127.881	86,4 (70,9-104,5)	1	0,0	3
	Mediamente agiata	113	117.670	94,0 (77,5-113,2)	1,09 (0,84-1,42)	9,3	3,9
	Disagiata	100	92.462	106,8 (86,9-130,0)	1,24 (0,94-1,62)	19,2	3,8
2002-2006	Agiata	114	133.597	79,9 (65,8-96,2)	1	0,0	3,3
	Mediamente agiata	154	160.299	87,2 (73,9-102,5)	1,11 (0,87-1,41)	14,7	3,2
	Disagiata	74	72.137	96,6 (75,7-121,9)	1,18 (0,88-1,59)	11,5	4,6
2007-2011	Agiata	90	145.401	55,3 (44,3-68,5)	1	0,0	2,2
	Mediamente agiata	130	161.098	68,7 (57,0-82,5)	1,25 (1,05-1,49)	26,2	2,9
	Disagiata	76	70.610	96,1 (75,4-121,4)	1,74 (1,43-2,12)	32,3	3,9

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	59	75.048	81,2 (61,7-105,1)	1	0,0	4,7
	Mediamente agiata	17	31.943	57,0 (33,1-92,4)	0,68 (0,39-1,16)	-8,2	2,2
	Disagiata	80	108.866	76,8 (60,8-95,8)	0,93 (0,67-1,31)	-5,7	3,8
1977-1981	Agiata	50	91.395	57,8 (42,8-76,5)	1	0,0	2,9
	Mediamente agiata	21	37.553	56,4 (34,9-86,4)	0,98 (0,85-1,13)	-0,4	2,9
	Disagiata	54	120.067	46,2 (34,7-60,4)	0,81 (0,72-0,90)	-13,0	2,5
1982-1986	Agiata	37	78.547	47,5 (33,4-65,7)	1	0,0	2,5
	Mediamente agiata	24	61.962	36,7 (23,4-55,3)	0,81 (0,40-1,64)	-5,8	1,9
	Disagiata	54	104.783	48,8 (36,6-64,1)	1,06 (0,60-1,90)	3,2	2,2
1987-1991	Agiata	28	96.900	28,5 (18,9-41,6)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	21	68.534	30,4 (18,7-47,0)	1,01 (0,57-1,78)	0,2	2,5
	Disagiata	56	106.860	48,5 (36,5-63,4)	1,73 (1,10-2,73)	23,7	2,1
1992-1996	Agiata	27	107.191	25,6 (16,8-37,8)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	31	104.734	30,3 (20,5-43,3)	1,14 (0,68-1,91)	3,8	1,1
	Disagiata	32	88.289	33,6 (22,8-47,9)	1,36 (0,81-2,27)	8,5	2
1997-2001	Agiata	29	127.881	23,2 (15,5-33,4)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	31	117.670	26,0 (17,7-37,0)	1,12 (0,68-1,87)	3,4	1,4
	Disagiata	23	92.462	24,8 (15,7-37,3)	1,08 (0,62-1,86)	1,6	1,3
2002-2006	Agiata	26	133.597	18,5 (12,1-27,4)	1	0,0	0,9
	Mediamente agiata	36	160.299	20,7 (14,4-28,9)	1,14 (0,88-1,46)	4,3	0,9
	Disagiata	15	72.137	19,8 (11,0-33,2)	1,05 (0,77-1,45)	0,8	1,1
2007-2011	Agiata	13	145.401	8,0 (4,2-14,1)	1	0,0	0,3
	Mediamente agiata	19	161.098	10,0 (5,9-16,3)	1,25 (1,03-1,53)	3,8	0,3
	Disagiata	6	70.610	7,8 (2,8-18,0)	0,94 (0,72-1,24)	-0,4	0,3

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	66	75.048	93,2 (72,0-119,0)	1	0,0	3,3
	Mediamente agiata	27	31.943	90,2 (59,4-132,3)	0,97 (0,62-1,52)	-0,9	2,7
	Disagiata	90	108.866	88,2 (70,9-108,7)	0,94 (0,69-1,30)	-5,3	3,2
1977-1981	Agiata	52	91.395	63,2 (47,1-83,1)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	33	37.553	89,3 (61,5-125,5)	1,42 (0,92-2,19)	9,7	2
	Disagiata	116	120.067	101,9 (84,2-122,4)	1,63 (1,17-2,26)	44,7	3,1
1982-1986	Agiata	46	78.547	58,2 (42,6-77,9)	1	0,0	1,5
	Mediamente agiata	51	61.962	79,2 (58,9-104,7)	1,36 (1,01-1,83)	13,6	1,7
	Disagiata	95	104.783	85,4 (69,0-104,8)	1,47 (1,13-1,91)	30,4	2,7
1987-1991	Agiata	37	96.900	36,5 (25,7-50,7)	1	0,0	1
	Mediamente agiata	27	68.534	35,8 (23,4-52,8)	0,94 (0,57-1,54)	-1,8	1
	Disagiata	62	106.860	52,6 (40,1-67,9)	1,38 (0,92-2,08)	17,2	2,1
1992-1996	Agiata	35	107.191	34,3 (23,7-48,2)	1	0,0	0,8
	Mediamente agiata	46	104.734	43,6 (31,8-58,6)	1,26 (0,81-1,95)	9,5	1,1
	Disagiata	34	88.289	33,0 (22,6-46,9)	1,03 (0,64-1,66)	1,1	1,3
1997-2001	Agiata	42	127.881	33,7 (24,3-45,7)	1	0,0	1,1
	Mediamente agiata	45	117.670	37,0 (27,0-49,7)	1,10 (0,72-1,67)	4,0	0,9
	Disagiata	36	92.462	38,0 (26,6-52,6)	1,13 (0,72-1,76)	4,1	0,5
2002-2006	Agiata	50	133.597	33,5 (24,8-44,5)	1	0,0	0,9
	Mediamente agiata	65	160.299	35,7 (27,5-45,9)	1,06 (0,73-1,53)	3,6	0,9
	Disagiata	32	72.137	40,7 (27,7-58,0)	1,16 (0,75-1,81)	4,4	1,2
2007-2011	Agiata	48	145.401	27,8 (20,4-37,4)	1	0,0	0,6
	Mediamente agiata	54	161.098	27,6 (20,4-36,8)	0,97 (0,65-1,42)	-1,9	1,1
	Disagiata	39	70.610	47,5 (33,5-66,1)	1,68 (1,10-2,56)	15,7	1,6

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la TIPOLOGIA ABITATIVA e il periodo di calendario.

Torino, 1972-2011. Uomini 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Tipologia abitativa	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Agiata	29	75.048	41,3 (27,6-59,7)	1	0,0	1,8
	Mediamente agiata	17	31.943	55,5 (32,2-90,1)	1,35 (0,86-2,13)	4,4	2,7
	Disagiata	28	108.866	27,2 (18,0-39,5)	0,66 (0,44-0,98)	-14,6	1,1
1977-1981	Agiata	30	91.395	33,7 (22,7-48,6)	1	0,0	2
	Mediamente agiata	16	37.553	42,6 (24,3-69,4)	1,28 (0,96-1,72)	3,5	3,3
	Disagiata	48	120.067	40,2 (29,6-53,4)	1,21 (0,97-1,51)	8,4	2,9
1982-1986	Agiata	15	78.547	19,6 (10,9-32,5)	1	0,0	1,6
	Mediamente agiata	24	61.962	37,6 (24,0-56,6)	2,00 (1,05-3,81)	12,0	1,6
	Disagiata	54	104.783	49,6 (37,2-65,2)	2,64 (1,49-4,67)	33,5	2,4
1987-1991	Agiata	24	96.900	24,6 (15,7-37,0)	1	0,0	1,4
	Mediamente agiata	20	68.534	26,9 (16,3-42,3)	1,12 (0,67-1,88)	2,1	1,6
	Disagiata	48	106.860	43,7 (32,1-58,4)	1,73 (1,13-2,66)	20,3	2,1
1992-1996	Agiata	30	107.191	27,8 (18,7-40,2)	1	0,0	1,9
	Mediamente agiata	36	104.734	33,7 (23,6-47,0)	1,22 (0,83-1,81)	6,6	2,6
	Disagiata	27	88.289	30,2 (19,8-44,3)	1,08 (0,71-1,65)	2,0	2,4
1997-2001	Agiata	23	127.881	18,6 (11,8-28,0)	1	0,0	0,7
	Mediamente agiata	24	117.670	20,1 (12,8-29,9)	1,09 (0,62-1,94)	2,1	0,9
	Disagiata	33	92.462	35,5 (24,4-49,9)	1,92 (1,13-3,27)	15,8	1,7
2002-2006	Agiata	23	133.597	16,5 (10,4-25,0)	1	0,0	0,8
	Mediamente agiata	26	160.299	15,4 (10,0-22,9)	0,93 (0,65-1,31)	-2,1	0,8
	Disagiata	12	72.137	15,4 (7,9-27,4)	0,96 (0,62-1,48)	-0,6	0,7
2007-2011	Agiata	19	145.401	13,1 (7,8-20,9)	1	0,0	1,1
	Mediamente agiata	34	161.098	18,2 (12,5-26,2)	1,59 (0,91-2,78)	12,6	0,8
	Disagiata	20	70.610	27,0 (16,3-42,5)	2,17 (1,16-4,07)	10,8	1,6