

**MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	286	145.467	245,5 (216,9-277,2)	1	0,0
	Una	1.000	384.233	283,0 (265,5-301,4)	1,12 (0,98-1,28)	109,5
	Due o più	2.854	793.279	350,1 (337,2-363,3)	<b>1,40 (1,24-1,58)</b>	809,5
1977-1981	Nessuna	314	177.348	230,9 (205,1-259,4)	1	0,0
	Una	924	403.751	252,5 (236,3-269,5)	1,07 (0,94-1,22)	63,7
	Due o più	2.402	736.206	314,7 (302,2-327,6)	<b>1,34 (1,19-1,51)</b>	608,4
1982-1986	Nessuna	502	258.451	233,2 (212,9-255,0)	1	0,0
	Una	1.107	446.709	247,8 (233,4-262,9)	1,07 (0,96-1,19)	70,7
	Due o più	2.025	597.384	290,9 (278,2-304,3)	<b>1,25 (1,13-1,38)</b>	402,2
1987-1991	Nessuna	463	284.408	188,1 (171,1-206,4)	1	0,0
	Una	947	446.266	204,7 (191,8-218,2)	1,10 (0,98-1,23)	83,7
	Due o più	1.765	515.183	273,8 (260,6-287,8)	<b>1,44 (1,30-1,60)</b>	541,5
1992-1996	Nessuna	584	374.473	178,8 (164,4-194,1)	1	0,0
	Una	967	438.850	200,9 (188,2-214,2)	<b>1,13 (1,02-1,26)</b>	114,5
	Due o più	1.228	362.062	256,7 (241,2-273,1)	<b>1,43 (1,29-1,58)</b>	369,0
1997-2001	Nessuna	633	411.809	169,1 (156,1-182,9)	1	0,0
	Una	802	424.072	173,5 (161,5-186,2)	1,03 (0,95-1,12)	22,9
	Due o più	960	299.222	234,6 (218,6-251,8)	<b>1,38 (1,28-1,50)</b>	266,4
2002-2006	Nessuna	716	486.301	154,0 (142,9-165,7)	1	0,0
	Una	778	365.431	193,3 (179,7-207,8)	<b>1,26 (1,14-1,39)</b>	159,4
	Due o più	529	174.383	222,9 (202,0-245,7)	<b>1,40 (1,25-1,57)</b>	151,1
2007-2011	Nessuna	648	455.455	134,0 (123,8-144,8)	1	0,0
	Una	609	307.559	176,0 (162,0-191,1)	<b>1,30 (1,16-1,45)</b>	140,0
	Due o più	408	128.653	234,2 (209,4-262,2)	<b>1,68 (1,48-1,91)</b>	165,2

**MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	158	145.467	137,7 (116,4-162,3)	1	0,0
	Una	453	384.233	129,0 (117,3-141,7)	0,92 (0,80-1,06)	-38,4
	Due o più	1.228	793.279	151,8 (143,3-160,6)	1,09 (0,96-1,24)	100,2
1977-1981	Nessuna	159	177.348	115,5 (97,8-135,9)	1	0,0
	Una	453	403.751	123,6 (112,4-135,6)	1,04 (0,87-1,24)	16,9
	Due o più	1.037	736.206	135,3 (127,2-143,9)	1,14 (0,96-1,35)	127,9
1982-1986	Nessuna	302	258.451	142,4 (126,5-159,7)	1	0,0
	Una	587	446.709	131,8 (121,3-142,9)	0,93 (0,81-1,07)	-43,2
	Due o più	965	597.384	138,2 (129,5-147,4)	0,97 (0,85-1,10)	-31,3
1987-1991	Nessuna	280	284.408	114,1 (101,0-128,6)	1	0,0
	Una	551	446.266	119,5 (109,7-129,9)	1,05 (0,93-1,20)	27,8
	Due o più	870	515.183	133,8 (124,7-143,6)	<b>1,17 (1,04-1,32)</b>	124,9
1992-1996	Nessuna	335	374.473	103,9 (92,9-115,7)	1	0,0
	Una	527	438.850	107,7 (98,6-117,5)	1,05 (0,92-1,21)	25,5
	Due o più	620	362.062	125,7 (115,3-137,2)	<b>1,20 (1,05-1,38)</b>	104,3
1997-2001	Nessuna	405	411.809	108,8 (98,4-120,0)	1	0,0
	Una	486	424.072	104,4 (95,1-114,3)	0,96 (0,87-1,07)	-17,9
	Due o più	513	299.222	122,8 (111,5-135,1)	<b>1,13 (1,01-1,25)</b>	57,7
2002-2006	Nessuna	482	486.301	103,9 (94,9-113,7)	1	0,0
	Una	447	365.431	111,0 (100,7-122,1)	1,07 (0,94-1,22)	29,4
	Due o più	284	174.383	116,8 (102,2-133,5)	1,10 (0,95-1,28)	26,2
2007-2011	Nessuna	432	455.455	89,0 (80,8-97,9)	1	0,0
	Una	386	307.559	110,1 (99,2-122,1)	<b>1,23 (1,07-1,41)</b>	72,4
	Due o più	209	128.653	118,3 (101,0-138,9)	<b>1,28 (1,08-1,51)</b>	45,4

**MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	4	145.467	3,7 (0,9-10,3)	1	0,0
	Una	8	384.233	2,2 (0,9-4,5)	0,62 (0,19-2,07)	-4,8
	Due o più	22	793.279	2,8 (1,7-4,2)	0,73 (0,25-2,14)	-8,0
1977-1981	Nessuna	5	177.348	3,1 (1,0-8,3)	1	0,0
	Una	4	403.751	1,0 (0,3-2,8)	0,30 (0,08-1,12)	-9,4
	Due o più	10	736.206	1,3 (0,6-2,5)	0,36 (0,12-1,08)	-17,5
1982-1986	Nessuna	5	258.451	2,6 (0,8-6,1)	1	0,0
	Una	11	446.709	2,5 (1,2-4,4)	1,00 (0,35-2,89)	0,0
	Due o più	26	597.384	3,5 (2,3-5,4)	1,45 (0,55-3,80)	8,1
1987-1991	Nessuna	9	284.408	3,7 (1,7-7,2)	1	0,0
	Una	13	446.266	2,8 (1,5-4,9)	0,77 (0,33-1,81)	-3,8
	Due o più	21	515.183	3,0 (1,8-5,0)	0,88 (0,40-1,95)	-2,8
1992-1996	Nessuna	11	374.473	3,4 (1,7-6,2)	1	0,0
	Una	11	438.850	2,4 (1,2-4,3)	0,68 (0,36-1,26)	-5,2
	Due o più	17	362.062	3,2 (1,8-5,8)	1,04 (0,59-1,85)	0,7
1997-2001	Nessuna	4	411.809	1,1 (0,3-2,8)	1	0,0
	Una	11	424.072	2,4 (1,2-4,4)	<b>2,22 (1,23-4,02)</b>	6,1
	Due o più	15	299.222	3,6 (2,0-6,7)	<b>3,39 (1,90-6,02)</b>	10,6
2002-2006	Nessuna	7	486.301	1,5 (0,6-3,2)	1	0,0
	Una	16	365.431	3,6 (2,0-6,1)	<b>2,43 (1,00-5,94)</b>	9,4
	Due o più	7	174.383	2,2 (0,8-6,1)	1,63 (0,57-4,70)	2,7
2007-2011	Nessuna	6	455.455	1,2 (0,4-2,8)	1	0,0
	Una	10	307.559	2,7 (1,3-5,4)	2,23 (0,92-5,37)	5,5
	Due o più	7	128.653	3,1 (1,2-9,5)	<b>2,74 (1,06-7,13)</b>	4,4

**MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	4	145.467	2,7 (0,7-8,5)	1	0,0
	Una	25	384.233	7,1 (4,6-10,6)	1,89 (0,66-5,44)	11,8
	Due o più	78	793.279	9,5 (7,5-11,9)	2,49 (0,91-6,81)	46,7
1977-1981	Nessuna	7	177.348	5,0 (1,9-11,1)	1	0,0
	Una	22	403.751	6,4 (4,0-9,7)	1,11 (0,47-2,59)	2,1
	Due o più	67	736.206	8,7 (6,7-11,1)	1,58 (0,73-3,45)	24,7
1982-1986	Nessuna	15	258.451	6,7 (3,7-11,3)	1	0,0
	Una	19	446.709	4,3 (2,6-6,7)	0,62 (0,31-1,22)	-11,8
	Due o più	49	597.384	7,2 (5,3-9,8)	1,02 (0,57-1,83)	1,0
1987-1991	Nessuna	11	284.408	4,7 (2,3-8,5)	1	0,0
	Una	17	446.266	3,7 (2,2-6,0)	0,86 (0,40-1,83)	-2,9
	Due o più	45	515.183	6,9 (5,0-9,7)	1,64 (0,84-3,19)	17,5
1992-1996	Nessuna	14	374.473	4,5 (2,5-7,6)	1	0,0
	Una	21	438.850	4,1 (2,5-6,4)	0,96 (0,57-1,62)	-0,9
	Due o più	29	362.062	5,6 (3,7-8,6)	1,28 (0,78-2,11)	6,3
1997-2001	Nessuna	10	411.809	2,6 (1,3-4,9)	1	0,0
	Una	13	424.072	2,7 (1,4-4,7)	1,06 (0,46-2,43)	0,8
	Due o più	33	299.222	8,3 (5,5-12,4)	<b>3,09 (1,50-6,36)</b>	22,3
2002-2006	Nessuna	16	486.301	3,4 (2,0-5,6)	1	0,0
	Una	18	365.431	4,4 (2,6-7,2)	1,32 (0,74-2,35)	4,4
	Due o più	6	174.383	3,0 (0,9-7,7)	0,75 (0,33-1,68)	-2,0
2007-2011	Nessuna	16	455.455	3,3 (1,9-5,5)	1	0,0
	Una	19	307.559	5,7 (3,4-9,3)	1,70 (0,87-3,30)	7,8
	Due o più	14	128.653	10,0 (5,0-19,3)	<b>2,61 (1,26-5,40)</b>	8,6

**MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	17	145.467	16,6 (9,5-27,2)	1	0,0
	Una	38	384.233	11,3 (8,0-15,6)	0,68 (0,38-1,20)	-18,2
	Due o più	76	793.279	9,2 (7,2-11,5)	0,57 (0,34-0,97)	-57,3
1977-1981	Nessuna	8	177.348	6,4 (2,7-13,3)	1	0,0
	Una	35	403.751	10,0 (6,9-13,9)	1,51 (0,92-2,48)	11,8
	Due o più	69	736.206	8,9 (7,0-11,4)	1,38 (0,86-2,22)	18,9
1982-1986	Nessuna	23	258.451	11,3 (7,1-17,0)	1	0,0
	Una	32	446.709	7,1 (4,9-10,1)	0,64 (0,49-0,82)	-18,4
	Due o più	63	597.384	8,7 (6,7-11,3)	0,77 (0,61-0,97)	-19,0
1987-1991	Nessuna	22	284.408	9,3 (5,8-14,3)	1	0,0
	Una	33	446.266	7,0 (4,8-9,9)	0,78 (0,45-1,33)	-9,5
	Due o più	45	515.183	7,1 (5,0-9,9)	0,72 (0,43-1,21)	-17,2
1992-1996	Nessuna	29	374.473	9,2 (6,1-13,3)	1	0,0
	Una	51	438.850	10,5 (7,8-13,9)	1,14 (0,77-1,67)	6,1
	Due o più	47	362.062	9,0 (6,5-12,6)	1,00 (0,67-1,48)	-0,2
1997-2001	Nessuna	32	411.809	8,8 (6,0-12,4)	1	0,0
	Una	41	424.072	9,1 (6,5-12,5)	1,03 (0,65-1,65)	1,3
	Due o più	31	299.222	7,3 (4,8-11,1)	0,87 (0,52-1,43)	-4,8
2002-2006	Nessuna	27	486.301	5,8 (3,8-8,5)	1	0,0
	Una	36	365.431	9,1 (6,3-12,7)	1,51 (0,91-2,49)	12,1
	Due o più	23	174.383	8,0 (4,8-13,4)	1,52 (0,87-2,67)	7,9
2007-2011	Nessuna	31	455.455	6,3 (4,3-9,1)	1	0,0
	Una	33	307.559	9,7 (6,6-14,0)	1,46 (0,90-2,39)	10,4
	Due o più	14	128.653	7,6 (3,8-15,3)	1,18 (0,63-2,24)	2,2

**MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	7	145.467	6,2 (2,4-13,6)	1	0,0
	Una	13	384.233	3,7 (1,9-6,4)	0,61 (0,24-1,53)	-8,4
	Due o più	40	793.279	4,9 (3,5-6,7)	0,82 (0,37-1,85)	-8,6
1977-1981	Nessuna	7	177.348	4,5 (1,8-10,3)	1	0,0
	Una	13	403.751	3,5 (1,9-6,1)	0,69 (0,28-1,74)	-5,8
	Due o più	30	736.206	3,9 (2,7-5,7)	0,77 (0,34-1,77)	-8,8
1982-1986	Nessuna	10	258.451	4,4 (2,1-8,4)	1	0,0
	Una	18	446.709	4,1 (2,4-6,5)	0,86 (0,40-1,87)	-2,9
	Due o più	37	597.384	5,2 (3,6-7,3)	1,12 (0,56-2,28)	4,1
1987-1991	Nessuna	7	284.408	2,9 (1,2-6,2)	1	0,0
	Una	14	446.266	3,0 (1,7-5,1)	1,07 (0,53-2,15)	0,9
	Due o più	23	515.183	3,3 (2,1-5,4)	1,25 (0,65-2,41)	4,6
1992-1996	Nessuna	4	374.473	1,2 (0,3-3,2)	1	0,0
	Una	20	438.850	3,9 (2,4-6,2)	<b>3,32 (1,13-9,76)</b>	14,0
	Due o più	21	362.062	4,3 (2,6-7,2)	<b>3,42 (1,16-10,08)</b>	14,9
1997-2001	Nessuna	9	411.809	2,4 (1,1-4,6)	1	0,0
	Una	13	424.072	2,7 (1,4-4,7)	1,16 (0,49-2,72)	1,8
	Due o più	16	299.222	3,8 (2,1-6,8)	1,57 (0,68-3,61)	5,8
2002-2006	Nessuna	10	486.301	2,2 (1,0-4,0)	1	0,0
	Una	16	365.431	4,4 (2,5-7,3)	<b>1,96 (1,07-3,58)</b>	7,8
	Due o più	9	174.383	4,4 (1,8-9,6)	1,86 (0,93-3,72)	4,2
2007-2011	Nessuna	7	455.455	1,4 (0,6-3,1)	1	0,0
	Una	11	307.559	3,0 (1,5-5,8)	1,17 (0,87-1,56)	5,6
	Due o più	6	128.653	2,5 (0,8-8,8)	1,89 (0,98-3,63)	2,8

**MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	5	145.467	5,8 (1,9-13,8)	1	0,0
	Una	12	384.233	3,4 (1,7-6,1)	0,75 (0,26-2,13)	-4,0
	Due o più	25	793.279	3,1 (2,0-4,7)	0,67 (0,25-1,75)	-12,4
1977-1981	Nessuna	3	177.348	1,9 (0,4-6,7)	1	0,0
	Una	5	403.751	1,5 (0,5-3,5)	0,59 (0,14-2,48)	-3,4
	Due o più	25	736.206	3,3 (2,1-4,9)	1,39 (0,42-4,63)	7,0
1982-1986	Nessuna	4	258.451	1,9 (0,5-5,1)	1	0,0
	Una	20	446.709	4,5 (2,7-6,9)	2,37 (0,92-6,15)	11,6
	Due o più	19	597.384	2,6 (1,5-4,2)	1,42 (0,54-3,71)	5,6
1987-1991	Nessuna	4	284.408	1,9 (0,5-4,9)	1	0,0
	Una	10	446.266	2,0 (1,0-3,8)	1,26 (0,16-9,74)	2,1
	Due o più	33	515.183	5,0 (3,4-7,4)	2,80 (0,45-17,62)	21,2
1992-1996	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1997-2001	Nessuna	4	411.809	1,1 (0,3-2,8)	1	0,0
	Una	12	424.072	2,4 (1,2-4,4)	2,19 (0,42-11,32)	6,5
	Due o più	14	299.222	2,5 (1,4-5,0)	2,67 (0,52-13,61)	8,8
2002-2006	Nessuna	9	486.301	1,9 (0,9-3,6)	1	0,0
	Una	8	365.431	1,8 (0,8-3,7)	0,98 (0,25-3,83)	-0,2
	Due o più	11	174.383	3,9 (1,8-8,4)	2,09 (0,58-7,52)	5,7
2007-2011	Nessuna	10	455.455	2,1 (1,0-3,9)	1	0,0
	Una	6	307.559	1,7 (0,6-4,1)	0,83 (0,20-3,52)	-1,2
	Due o più	5	128.653	2,5 (0,8-8,8)	1,30 (0,28-6,09)	1,1

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	9	145.467	9,2 (4,1-18,2)	1	0,0
	Una	29	384.233	8,2 (5,5-11,9)	0,99 (0,47-2,10)	-0,2
	Due o più	77	793.279	9,6 (7,5-12,0)	1,12 (0,56-2,25)	8,6
1977-1981	Nessuna	12	177.348	9,9 (5,0-17,9)	1	0,0
	Una	40	403.751	11,3 (8,1-15,5)	1,15 (0,78-1,69)	5,2
	Due o più	69	736.206	9,0 (7,0-11,4)	0,92 (0,64-1,33)	-5,9
1982-1986	Nessuna	29	258.451	14,3 (9,5-20,7)	1	0,0
	Una	49	446.709	10,9 (8,1-14,5)	0,79 (0,50-1,24)	-13,4
	Due o più	71	597.384	10,0 (7,8-12,8)	0,70 (0,46-1,09)	-29,9
1987-1991	Nessuna	29	284.408	12,3 (8,2-17,7)	1	0,0
	Una	42	446.266	9,1 (6,6-12,3)	0,74 (0,52-1,06)	-14,7
	Due o più	78	515.183	11,4 (9,0-14,6)	0,93 (0,67-1,28)	-5,9
1992-1996	Nessuna	33	374.473	10,3 (7,0-14,5)	1	0,0
	Una	50	438.850	10,0 (7,4-13,3)	0,98 (0,63-1,53)	-1,0
	Due o più	58	362.062	11,1 (8,3-15,1)	1,09 (0,70-1,68)	4,7
1997-2001	Nessuna	37	411.809	10,3 (7,3-14,3)	1	0,0
	Una	42	424.072	8,5 (6,1-11,6)	0,84 (0,54-1,32)	-7,8
	Due o più	42	299.222	9,9 (6,9-14,1)	0,87 (0,56-1,36)	-6,3
2002-2006	Nessuna	77	486.301	16,7 (13,2-20,9)	1	0,0
	Una	48	365.431	12,3 (9,0-16,5)	0,72 (0,50-1,03)	-19,0
	Due o più	32	174.383	14,1 (9,2-21,2)	0,77 (0,50-1,16)	-9,8
2007-2011	Nessuna	60	455.455	12,4 (9,4-16,0)	1	0,0
	Una	56	307.559	15,2 (11,4-20,1)	1,27 (0,88-1,84)	12,0
	Due o più	23	128.653	12,1 (7,2-20,7)	0,99 (0,61-1,61)	-0,3



**MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	42	145.467	33,2 (23,7-45,9)	1	0,0
	Una	134	384.233	38,0 (31,7-45,1)	1,06 (0,79-1,42)	7,1
	Due o più	348	793.279	43,2 (38,8-48,1)	1,22 (0,93-1,59)	61,7
1977-1981	Nessuna	59	177.348	43,5 (32,9-56,9)	1	0,0
	Una	154	403.751	40,5 (34,4-47,6)	0,97 (0,75-1,26)	-4,5
	Due o più	291	736.206	37,9 (33,6-42,5)	0,89 (0,70-1,14)	-34,5
1982-1986	Nessuna	105	258.451	49,6 (40,5-60,3)	1	0,0
	Una	181	446.709	40,9 (35,1-47,3)	0,84 (0,66-1,07)	-34,3
	Due o più	264	597.384	38,8 (34,2-44,0)	0,78 (0,62-0,99)	-72,3
1987-1991	Nessuna	102	284.408	41,1 (33,4-50,1)	1	0,0
	Una	178	446.266	38,9 (33,4-45,1)	0,94 (0,74-1,20)	-11,0
	Due o più	234	515.183	36,3 (31,6-41,6)	0,88 (0,69-1,11)	-33,3
1992-1996	Nessuna	115	374.473	35,9 (29,5-43,1)	1	0,0
	Una	171	438.850	35,5 (30,3-41,4)	1,01 (0,79-1,28)	1,4
	Due o più	174	362.062	35,9 (30,4-42,4)	1,01 (0,79-1,28)	0,9
1997-2001	Nessuna	128	411.809	34,5 (28,8-41,1)	1	0,0
	Una	135	424.072	29,9 (25,0-35,6)	0,87 (0,72-1,05)	-19,8
	Due o più	132	299.222	33,1 (27,3-40,1)	0,97 (0,80-1,17)	-4,5
2002-2006	Nessuna	145	486.301	31,1 (26,3-36,7)	1	0,0
	Una	120	365.431	31,0 (25,6-37,3)	0,99 (0,78-1,26)	-1,3
	Due o più	68	174.383	29,0 (21,9-38,3)	0,94 (0,70-1,26)	-4,4
2007-2011	Nessuna	147	455.455	30,5 (25,7-35,9)	1	0,0
	Una	105	307.559	31,3 (25,5-38,2)	1,01 (0,78-1,29)	0,7
	Due o più	47	128.653	28,5 (20,3-40,4)	0,90 (0,65-1,26)	-5,0

**MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	5	145.467	4,8 (1,5-12,0)	1	0,0
	Una	18	384.233	5,6 (3,3-8,9)	1,04 (0,39-2,82)	0,8
	Due o più	68	793.279	8,2 (6,4-10,5)	1,63 (0,66-4,05)	26,3
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Nessuna	5	374.473	1,4 (0,5-3,5)	1	0,0
	Una	13	438.850	2,5 (1,3-4,5)	1,66 (0,59-4,67)	5,2
	Due o più	26	362.062	4,5 (2,9-7,2)	<b>3,17 (1,20-8,40)</b>	17,8
1997-2001	Nessuna	4	411.809	1,1 (0,3-2,8)	1	0,0
	Una	11	424.072	2,2 (1,1-4,1)	2,03 (0,93-4,47)	5,6
	Due o più	33	299.222	7,0 (4,6-10,6)	<b>6,40 (3,12-13,16)</b>	27,8
2002-2006	Nessuna	9	486.301	1,9 (0,9-3,7)	1	0,0
	Una	10	365.431	2,4 (1,1-4,6)	1,27 (0,52-3,14)	2,1
	Due o più	13	174.383	4,6 (2,3-9,3)	<b>2,70 (1,13-6,41)</b>	8,2
2007-2011	Nessuna	6	455.455	1,2 (0,4-2,8)	1	0,0
	Una	9	307.559	2,6 (1,2-5,4)	1,93 (0,68-5,42)	4,3
	Due o più	11	128.653	4,2 (2,0-10,6)	<b>4,08 (1,49-11,18)</b>	8,3

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	52	145.467	46,3 (34,3-61,5)	1	0,0
	Una	254	384.233	72,6 (63,9-82,3)	<b>1,50 (1,11-2,02)</b>	84,7
	Due o più	761	793.279	92,2 (85,7-99,1)	<b>1,91 (1,44-2,53)</b>	362,9
1977-1981	Nessuna	71	177.348	56,8 (44,0-72,4)	1	0,0
	Una	223	403.751	62,4 (54,4-71,3)	1,10 (0,74-1,62)	20,1
	Due o più	649	736.206	84,7 (78,3-91,6)	<b>1,49 (1,05-2,13)</b>	214,6
1982-1986	Nessuna	93	258.451	44,4 (35,7-54,6)	1	0,0
	Una	225	446.709	50,2 (43,8-57,2)	1,12 (0,88-1,43)	24,0
	Due o più	524	597.384	71,8 (65,7-78,4)	<b>1,61 (1,29-2,01)</b>	199,1
1987-1991	Nessuna	72	284.408	30,2 (23,6-38,2)	1	0,0
	Una	166	446.266	35,3 (30,2-41,2)	1,17 (0,95-1,45)	24,5
	Due o più	419	515.183	60,8 (54,9-67,3)	<b>2,00 (1,65-2,43)</b>	209,3
1992-1996	Nessuna	89	374.473	27,9 (22,3-34,4)	1	0,0
	Una	161	438.850	32,8 (27,9-38,4)	1,18 (0,91-1,53)	24,1
	Due o più	283	362.062	55,6 (48,8-63,4)	<b>1,98 (1,56-2,52)</b>	140,2
1997-2001	Nessuna	76	411.809	20,7 (16,3-26,0)	1	0,0
	Una	118	424.072	25,1 (20,7-30,2)	1,23 (0,98-1,55)	22,4
	Due o più	187	299.222	46,2 (39,2-54,4)	<b>2,15 (1,74-2,66)</b>	100,0
2002-2006	Nessuna	78	486.301	16,8 (13,3-21,0)	1	0,0
	Una	127	365.431	30,4 (25,2-36,5)	<b>1,81 (1,37-2,41)</b>	57,0
	Due o più	104	174.383	40,2 (32,0-50,5)	<b>2,34 (1,74-3,16)</b>	59,6
2007-2011	Nessuna	74	455.455	15,3 (12,0-19,3)	1	0,0
	Una	73	307.559	21,4 (16,6-27,4)	<b>1,35 (1,02-1,79)</b>	18,8
	Due o più	70	128.653	35,1 (26,6-46,9)	<b>2,42 (1,81-3,23)</b>	41,1

**MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	12	145.467	11,1 (5,7-20,0)	1	0,0
	Una	79	384.233	22,9 (18,1-28,7)	<b>1,98 (1,08-3,63)</b>	39,1
	Due o più	221	793.279	27,0 (23,6-30,9)	<b>2,33 (1,30-4,17)</b>	126,1
1977-1981	Nessuna	24	177.348	19,5 (12,4-29,7)	1	0,0
	Una	71	403.751	20,3 (15,8-25,7)	1,02 (0,64-1,62)	1,3
	Due o più	218	736.206	28,6 (24,9-32,7)	1,45 (0,95-2,21)	67,3
1982-1986	Nessuna	26	258.451	13,0 (8,5-19,1)	1	0,0
	Una	84	446.709	18,7 (14,9-23,2)	1,48 (0,95-2,30)	27,3
	Due o più	168	597.384	22,9 (19,5-26,8)	<b>1,82 (1,20-2,76)</b>	75,8
1987-1991	Nessuna	18	284.408	7,6 (4,5-12,1)	1	0,0
	Una	52	446.266	11,0 (8,2-14,5)	1,42 (0,83-2,43)	15,4
	Due o più	124	515.183	17,3 (14,3-21,0)	<b>2,21 (1,35-3,63)</b>	67,9
1992-1996	Nessuna	19	374.473	6,2 (3,7-9,7)	1	0,0
	Una	48	438.850	9,8 (7,2-13,1)	1,60 (0,94-2,73)	18,0
	Due o più	88	362.062	16,8 (13,2-21,4)	<b>2,77 (1,68-4,57)</b>	56,2
1997-2001	Nessuna	12	411.809	3,4 (1,8-6,0)	1	0,0
	Una	24	424.072	4,9 (3,1-7,5)	1,49 (0,74-2,99)	7,9
	Due o più	51	299.222	11,1 (8,1-15,3)	<b>3,31 (1,75-6,25)</b>	35,6
2002-2006	Nessuna	14	486.301	3,0 (1,7-5,1)	1	0,0
	Una	38	365.431	8,7 (6,1-12,2)	2,79 (0,99-7,87)	24,4
	Due o più	26	174.383	9,4 (5,8-15,1)	2,85 (0,94-8,62)	16,9
2007-2011	Nessuna	18	455.455	3,7 (2,2-6,0)	1	0,0
	Una	17	307.559	5,0 (2,9-8,5)	1,26 (0,65-2,44)	3,5
	Due o più	20	128.653	7,9 (4,6-14,9)	<b>2,61 (1,37-4,98)</b>	12,3

**MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	22	145.467	19,0 (11,8-29,6)	1	0,0
	Una	80	384.233	22,8 (18,1-28,6)	1,12 (0,70-1,79)	8,5
	Due o più	220	793.279	26,8 (23,3-30,7)	1,31 (0,84-2,03)	51,9
1977-1981	Nessuna	25	177.348	20,1 (12,7-30,5)	1	0,0
	Una	72	403.751	19,8 (15,5-25,1)	1,01 (0,64-1,59)	0,5
	Due o più	216	736.206	28,2 (24,5-32,2)	1,41 (0,93-2,13)	62,7
1982-1986	Nessuna	36	258.451	16,7 (11,6-23,3)	1	0,0
	Una	71	446.709	15,8 (12,4-20,0)	0,92 (0,61-1,37)	-6,3
	Due o più	163	597.384	22,4 (19,0-26,3)	1,31 (0,91-1,88)	38,5
1987-1991	Nessuna	28	284.408	11,5 (7,6-16,8)	1	0,0
	Una	54	446.266	11,6 (8,7-15,2)	1,01 (0,64-1,60)	0,8
	Due o più	129	515.183	19,1 (15,8-23,1)	<b>1,69 (1,12-2,55)</b>	52,6
1992-1996	Nessuna	33	374.473	10,2 (7,0-14,5)	1	0,0
	Una	52	438.850	10,4 (7,7-13,7)	1,01 (0,76-1,34)	0,5
	Due o più	80	362.062	15,5 (12,0-20,1)	<b>1,49 (1,14-1,94)</b>	26,2
1997-2001	Nessuna	30	411.809	8,2 (5,5-11,8)	1	0,0
	Una	45	424.072	9,6 (7,0-13,0)	1,22 (0,77-1,94)	8,1
	Due o più	52	299.222	14,5 (10,5-19,9)	<b>1,58 (1,00-2,50)</b>	19,0
2002-2006	Nessuna	21	486.301	4,5 (2,8-6,9)	1	0,0
	Una	41	365.431	10,0 (7,1-13,8)	<b>2,26 (1,33-3,84)</b>	22,9
	Due o più	34	174.383	13,6 (9,0-20,4)	<b>3,08 (1,77-5,35)</b>	23,0
2007-2011	Nessuna	22	455.455	4,5 (2,8-6,9)	1	0,0
	Una	20	307.559	5,8 (3,5-9,5)	1,26 (0,69-2,31)	4,1
	Due o più	19	128.653	11,8 (6,8-20,7)	<b>2,29 (1,23-4,28)</b>	10,7

**MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	9	145.467	8,9 (4,1-17,5)	1	0,0
	Una	27	384.233	7,6 (5,0-11,2)	0,93 (0,44-1,97)	-2,1
	Due o più	94	793.279	10,8 (8,7-13,3)	1,38 (0,69-2,74)	25,8
1977-1981	Nessuna	4	177.348	3,2 (0,9-9,0)	1	0,0
	Una	16	403.751	4,5 (2,5-7,3)	1,41 (0,47-4,21)	4,6
	Due o più	65	736.206	8,6 (6,6-11,0)	2,67 (0,97-7,36)	40,7
1982-1986	Nessuna	5	258.451	2,4 (0,8-5,7)	1	0,0
	Una	25	446.709	5,6 (3,6-8,3)	2,39 (0,92-6,26)	14,6
	Due o più	63	597.384	9,0 (6,9-11,8)	<b>3,83 (1,54-9,56)</b>	46,6
1987-1991	Nessuna	7	284.408	2,6 (1,0-5,6)	1	0,0
	Una	21	446.266	4,5 (2,8-6,8)	1,66 (0,70-3,92)	8,4
	Due o più	32	515.183	5,1 (3,4-7,7)	1,86 (0,81-4,26)	14,8
1992-1996	Nessuna	6	374.473	1,8 (0,7-4,1)	1	0,0
	Una	18	438.850	3,8 (2,2-6,1)	2,01 (0,98-4,14)	9,0
	Due o più	33	362.062	6,5 (4,3-9,8)	<b>3,59 (1,81-7,14)</b>	23,8
1997-2001	Nessuna	17	411.809	4,3 (2,5-7,0)	1	0,0
	Una	18	424.072	3,9 (2,3-6,3)	0,90 (0,46-1,74)	-2,1
	Due o più	29	299.222	7,1 (4,5-10,9)	1,70 (0,92-3,14)	11,9
2002-2006	Nessuna	18	486.301	3,9 (2,3-6,2)	1	0,0
	Una	18	365.431	4,3 (2,5-7,0)	1,10 (0,57-2,13)	1,7
	Due o più	19	174.383	7,0 (4,0-12,2)	1,82 (0,95-3,51)	8,6
2007-2011	Nessuna	14	455.455	2,9 (1,6-5,0)	1	0,0
	Una	21	307.559	6,1 (3,8-9,8)	<b>2,06 (1,04-4,05)</b>	10,8
	Due o più	20	128.653	11,7 (6,5-20,9)	<b>3,71 (1,86-7,42)</b>	14,6

**MORTALITÀ per BPCO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	4	145.467	4,1 (1,1-11,1)	1	0,0
	Una	7	384.233	2,0 (0,8-4,4)	0,52 (0,15-1,79)	-6,4
	Due o più	40	793.279	4,6 (3,3-6,4)	1,26 (0,45-3,53)	8,2
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Nessuna	3	374.473	0,8 (0,2-2,6)	1	0,0
	Una	4	438.850	0,8 (0,2-2,3)	0,89 (0,20-3,98)	-0,5
	Due o più	18	362.062	3,1 (1,8-5,6)	<b>3,93 (1,13-13,63)</b>	13,4
1997-2001	Nessuna	3	411.809	0,8 (0,2-2,3)	1	0,0
	Una	6	424.072	1,2 (0,4-2,9)	1,58 (0,39-6,36)	2,2
	Due o più	9	299.222	2,0 (0,8-4,5)	2,65 (0,70-10,10)	5,6
2002-2006	Nessuna	4	486.301	0,9 (0,2-2,2)	1	0,0
	Una	5	365.431	1,0 (0,3-2,6)	1,29 (0,41-4,12)	1,1
	Due o più	5	174.383	1,6 (0,5-5,3)	1,92 (0,60-6,17)	2,4
2007-2011	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	9	145.467	7,3 (3,2-14,9)	1	0,0
	Una	38	384.233	11,1 (7,8-15,3)	1,36 (0,66-2,81)	10,1
	Due o più	176	793.279	22,1 (18,9-25,7)	<b>2,75 (1,41-5,38)</b>	112,0
1977-1981	Nessuna	4	177.348	2,8 (0,8-8,2)	1	0,0
	Una	40	403.751	10,7 (7,6-14,6)	<b>3,66 (1,31-10,25)</b>	29,1
	Due o più	158	736.206	20,6 (17,5-24,1)	<b>6,97 (2,58-18,82)</b>	135,3
1982-1986	Nessuna	8	258.451	3,8 (1,6-7,7)	1	0,0
	Una	56	446.709	12,5 (9,4-16,3)	<b>3,49 (1,66-7,33)</b>	40,0
	Due o più	115	597.384	17,2 (14,2-20,9)	<b>4,67 (2,28-9,59)</b>	90,4
1987-1991	Nessuna	6	284.408	2,6 (1,0-5,8)	1	0,0
	Una	37	446.266	8,0 (5,6-11,0)	<b>3,27 (1,38-7,76)</b>	25,7
	Due o più	93	515.183	14,6 (11,6-18,2)	<b>5,76 (2,51-13,18)</b>	76,8
1992-1996	Nessuna	12	374.473	4,0 (2,1-7,1)	1	0,0
	Una	32	438.850	6,7 (4,5-9,5)	1,85 (0,95-3,60)	14,7
	Due o più	84	362.062	18,3 (14,3-23,4)	<b>4,81 (2,60-8,87)</b>	66,5
1997-2001	Nessuna	10	411.809	2,8 (1,3-5,2)	1	0,0
	Una	20	424.072	4,5 (2,7-7,1)	1,64 (0,77-3,52)	7,8
	Due o più	59	299.222	15,0 (11,0-20,2)	<b>5,55 (2,81-10,96)</b>	48,4
2002-2006	Nessuna	16	486.301	3,4 (2,0-5,6)	1	0,0
	Una	28	365.431	7,2 (4,7-10,6)	<b>2,08 (1,28-3,38)</b>	14,5
	Due o più	33	174.383	13,3 (8,7-20,1)	<b>4,05 (2,52-6,53)</b>	24,9
2007-2011	Nessuna	13	455.455	2,6 (1,4-4,7)	1	0,0
	Una	16	307.559	4,7 (2,6-8,0)	1,75 (0,84-3,65)	6,9
	Due o più	16	128.653	11,2 (6,1-20,4)	<b>3,64 (1,73-7,67)</b>	11,6



**MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	9	145.467	6,9 (3,0-14,2)	1	0,0
	Una	42	384.233	11,8 (8,5-16,1)	<b>1,60 (1,09-2,35)</b>	15,9
	Due o più	128	793.279	16,0 (13,3-19,0)	<b>2,16 (1,50-3,10)</b>	69,0
1977-1981	Nessuna	13	177.348	8,5 (4,3-15,5)	1	0,0
	Una	39	403.751	10,2 (7,2-14,0)	1,21 (0,85-1,71)	6,7
	Due o più	111	736.206	14,7 (12,1-17,8)	<b>1,73 (1,26-2,39)</b>	47,0
1982-1986	Nessuna	18	258.451	7,7 (4,5-12,5)	1	0,0
	Una	52	446.709	11,7 (8,7-15,3)	<b>1,54 (1,03-2,28)</b>	18,2
	Due o più	90	597.384	14,1 (11,3-17,6)	<b>1,82 (1,25-2,65)</b>	40,6
1987-1991	Nessuna	14	284.408	5,3 (2,9-9,2)	1	0,0
	Una	35	446.266	7,7 (5,3-10,7)	<b>1,45 (1,02-2,05)</b>	10,7
	Due o più	79	515.183	13,3 (10,4-17,1)	<b>2,49 (1,80-3,45)</b>	47,0
1992-1996	Nessuna	21	374.473	6,1 (3,8-9,5)	1	0,0
	Una	42	438.850	9,3 (6,7-12,7)	1,52 (0,99-2,35)	14,5
	Due o più	57	362.062	13,0 (9,6-17,6)	<b>2,19 (1,44-3,33)</b>	30,9
1997-2001	Nessuna	19	411.809	4,9 (2,9-7,7)	1	0,0
	Una	29	424.072	6,7 (4,4-9,7)	1,35 (0,75-2,42)	7,4
	Due o più	42	299.222	11,8 (8,2-16,8)	<b>2,44 (1,40-4,27)</b>	24,8
2002-2006	Nessuna	23	486.301	4,8 (3,1-7,3)	1	0,0
	Una	25	365.431	6,5 (4,1-9,8)	<b>1,33 (1,02-1,72)</b>	6,1
	Due o più	24	174.383	10,5 (6,3-17,1)	<b>2,25 (1,72-2,94)</b>	13,1
2007-2011	Nessuna	18	455.455	3,9 (2,3-6,2)	1	0,0
	Una	19	307.559	5,8 (3,5-9,5)	1,49 (0,97-2,30)	6,3
	Due o più	13	128.653	9,6 (4,8-18,5)	<b>2,22 (1,37-3,60)</b>	7,1

**MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	26	145.467	24,4 (15,8-36,5)	1	0,0
	Una	97	384.233	27,9 (22,6-34,2)	1,14 (0,95-1,38)	12,2
	Due o più	286	793.279	34,8 (30,9-39,2)	<b>1,42 (1,20-1,69)</b>	85,0
1977-1981	Nessuna	33	177.348	26,6 (18,1-38,1)	1	0,0
	Una	96	403.751	27,0 (21,9-33,1)	1,00 (0,80-1,25)	0,3
	Due o più	258	736.206	33,7 (29,7-38,1)	<b>1,25 (1,02-1,53)</b>	51,1
1982-1986	Nessuna	51	258.451	24,7 (18,3-32,6)	1	0,0
	Una	112	446.709	25,0 (20,6-30,1)	1,02 (0,80-1,31)	2,5
	Due o più	219	597.384	30,2 (26,3-34,6)	1,23 (0,98-1,55)	41,5
1987-1991	Nessuna	46	284.408	19,2 (13,9-25,7)	1	0,0
	Una	89	446.266	19,2 (15,4-23,6)	1,00 (0,79-1,27)	0,2
	Due o più	186	515.183	27,0 (23,2-31,6)	<b>1,42 (1,15-1,76)</b>	55,3
1992-1996	Nessuna	55	374.473	17,2 (12,9-22,5)	1	0,0
	Una	88	438.850	17,9 (14,3-22,2)	1,03 (0,77-1,37)	2,5
	Due o più	136	362.062	25,9 (21,4-31,4)	<b>1,51 (1,15-1,97)</b>	45,6
1997-2001	Nessuna	54	411.809	14,8 (11,1-19,4)	1	0,0
	Una	73	424.072	15,3 (11,9-19,3)	1,05 (0,80-1,38)	3,7
	Due o più	94	299.222	22,5 (17,8-28,5)	<b>1,43 (1,10-1,86)</b>	28,3
2002-2006	Nessuna	83	486.301	18,0 (14,3-22,3)	1	0,0
	Una	82	365.431	20,0 (15,9-25,1)	1,12 (0,95-1,31)	8,7
	Due o più	59	174.383	23,7 (17,4-32,1)	<b>1,26 (1,05-1,50)</b>	12,0
2007-2011	Nessuna	69	455.455	14,2 (11,1-18,1)	1	0,0
	Una	68	307.559	19,0 (14,7-24,6)	1,34 (0,96-1,88)	17,5
	Due o più	43	128.653	21,8 (15,2-31,9)	<b>1,58 (1,07-2,32)</b>	15,8

**MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	129	145.467	113,1 (93,9-135,5)	1	0,0
	Una	463	384.233	132,2 (120,3-145,0)	1,14 (0,94-1,38)	56,1
	Due o più	1.272	793.279	156,0 (147,4-164,9)	<b>1,35 (1,13-1,62)</b>	331,0
1977-1981	Nessuna	151	177.348	115,1 (97,0-136,0)	1	0,0
	Una	441	403.751	120,6 (109,6-132,6)	1,05 (0,87-1,26)	19,7
	Due o più	1.081	736.206	141,0 (132,7-149,7)	<b>1,22 (1,03-1,44)</b>	192,8
1982-1986	Nessuna	237	258.451	111,5 (97,6-127,0)	1	0,0
	Una	475	446.709	106,5 (97,1-116,6)	0,95 (0,83-1,09)	-23,0
	Due o più	886	597.384	125,0 (116,8-133,8)	1,12 (0,99-1,27)	95,8
1987-1991	Nessuna	214	284.408	87,2 (75,8-100,0)	1	0,0
	Una	402	446.266	86,6 (78,4-95,6)	0,99 (0,84-1,17)	-2,7
	Due o più	740	515.183	112,4 (104,1-121,4)	<b>1,27 (1,09-1,48)</b>	157,4
1992-1996	Nessuna	248	374.473	76,6 (67,3-86,9)	1	0,0
	Una	413	438.850	85,6 (77,5-94,5)	1,13 (0,96-1,32)	47,2
	Due o più	524	362.062	108,0 (98,2-118,7)	<b>1,41 (1,21-1,64)</b>	152,2
1997-2001	Nessuna	244	411.809	65,7 (57,7-74,6)	1	0,0
	Una	328	424.072	71,9 (64,2-80,3)	1,10 (0,95-1,27)	30,5
	Due o più	370	299.222	92,0 (82,0-103,1)	<b>1,41 (1,22-1,62)</b>	107,1
2002-2006	Nessuna	261	486.301	56,0 (49,4-63,3)	1	0,0
	Una	315	365.431	79,3 (70,6-88,8)	<b>1,41 (1,20-1,67)</b>	92,1
	Due o più	203	174.383	83,7 (71,4-98,1)	<b>1,50 (1,24-1,81)</b>	67,7
2007-2011	Nessuna	248	455.455	51,2 (45,0-58,0)	1	0,0
	Una	214	307.559	63,4 (55,0-73,0)	<b>1,20 (1,00-1,44)</b>	35,3
	Due o più	143	128.653	78,8 (65,1-95,8)	<b>1,55 (1,26-1,91)</b>	50,9

**MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	17	145.467	12,4 (7,1-20,9)	1	0,0
	Una	94	384.233	25,3 (20,4-31,1)	<b>1,92 (1,15-3,22)</b>	45,1
	Due o più	178	793.279	21,8 (18,7-25,3)	<b>1,66 (1,01-2,74)</b>	71,0
1977-1981	Nessuna	37	177.348	23,3 (16,1-33,3)	1	0,0
	Una	85	403.751	22,1 (17,6-27,4)	0,95 (0,65-1,40)	-4,3
	Due o più	149	736.206	20,2 (17,1-23,8)	0,87 (0,61-1,26)	-21,7
1982-1986	Nessuna	46	258.451	18,9 (13,7-25,6)	1	0,0
	Una	100	446.709	22,5 (18,3-27,3)	1,20 (0,73-1,95)	16,3
	Due o più	133	597.384	21,2 (17,6-25,3)	1,13 (0,70-1,81)	14,8
1987-1991	Nessuna	38	284.408	14,1 (9,9-19,6)	1	0,0
	Una	62	446.266	13,7 (10,5-17,6)	0,99 (0,66-1,49)	-0,6
	Due o più	116	515.183	22,2 (18,0-27,1)	<b>1,51 (1,04-2,20)</b>	39,3
1992-1996	Nessuna	57	374.473	16,0 (12,0-20,8)	1	0,0
	Una	95	438.850	21,4 (17,2-26,2)	1,33 (0,95-1,85)	23,4
	Due o più	46	362.062	11,8 (8,3-16,5)	0,72 (0,48-1,07)	-17,8
1997-2001	Nessuna	46	411.809	11,8 (8,6-15,8)	1	0,0
	Una	52	424.072	11,9 (8,8-15,7)	1,01 (0,67-1,50)	0,3
	Due o più	34	299.222	9,9 (6,6-14,6)	0,83 (0,52-1,30)	-7,2
2002-2006	Nessuna	46	486.301	9,6 (7,1-12,9)	1	0,0
	Una	35	365.431	9,2 (6,4-12,9)	0,97 (0,62-1,51)	-1,1
	Due o più	18	174.383	12,0 (6,8-19,9)	0,96 (0,55-1,67)	-0,8
2007-2011	Nessuna	33	455.455	7,1 (4,9-10,1)	1	0,0
	Una	32	307.559	9,8 (6,6-14,3)	1,41 (0,87-2,30)	9,4
	Due o più	12	128.653	11,0 (5,5-20,8)	1,17 (0,60-2,29)	1,8

**MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	6	145.467	4,1 (1,5-10,2)	1	0,0
	Una	35	384.233	9,4 (6,5-13,3)	2,03 (0,85-4,82)	17,7
	Due o più	57	793.279	6,9 (5,3-9,1)	1,51 (0,65-3,51)	19,2
1977-1981	Nessuna	14	177.348	9,5 (5,1-16,8)	1	0,0
	Una	21	403.751	5,6 (3,5-8,7)	0,61 (0,22-1,72)	-13,2
	Due o più	66	736.206	9,0 (6,9-11,5)	1,00 (0,41-2,43)	0,1
1982-1986	Nessuna	14	258.451	5,3 (2,8-9,2)	1	0,0
	Una	28	446.709	6,3 (4,2-9,1)	1,16 (0,61-2,22)	4,0
	Due o più	36	597.384	6,1 (4,2-8,6)	1,12 (0,60-2,10)	3,9
1987-1991	Nessuna	7	284.408	2,6 (1,0-5,6)	1	0,0
	Una	15	446.266	3,3 (1,8-5,4)	1,28 (0,52-3,15)	3,3
	Due o più	41	515.183	7,9 (5,5-11,1)	<b>2,81 (1,25-6,35)</b>	26,4
1992-1996	Nessuna	14	374.473	3,9 (2,1-6,7)	1	0,0
	Una	30	438.850	7,0 (4,7-10,1)	1,72 (0,91-3,26)	12,6
	Due o più	13	362.062	2,8 (1,4-5,4)	0,83 (0,39-1,80)	-2,6
1997-2001	Nessuna	18	411.809	4,6 (2,7-7,3)	1	0,0
	Una	15	424.072	3,3 (1,8-5,6)	0,74 (0,37-1,48)	-5,2
	Due o più	9	299.222	2,4 (1,0-5,4)	0,56 (0,25-1,28)	-7,0
2002-2006	Nessuna	8	486.301	1,6 (0,7-3,2)	1	0,0
	Una	5	365.431	1,2 (0,4-2,9)	0,77 (0,25-2,35)	-1,5
	Due o più	5	174.383	2,5 (0,7-7,1)	1,43 (0,45-4,52)	1,5
2007-2011	Nessuna	4	455.455	0,9 (0,3-2,5)	1	0,0
	Una	3	307.559	0,9 (0,2-3,2)	1,20 (0,51-2,78)	0,5
	Due o più	2	128.653	1,8 (0,2-8,4)	1,87 (0,71-4,90)	0,9

**MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**  
Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1977-1981	Nessuna	5	177.348	3,4 (0,9-9,3)	1	0,0
	Una	11	403.751	2,8 (1,4-5,2)	0,86 (0,30-2,48)	-1,8
	Due o più	17	736.206	2,3 (1,3-3,7)	0,66 (0,24-1,82)	-8,6
1982-1986	Nessuna	9	258.451	3,9 (1,7-7,7)	1	0,0
	Una	15	446.709	3,4 (1,9-5,6)	0,88 (0,38-2,02)	-2,0
	Due o più	29	597.384	4,6 (3,0-6,8)	1,18 (0,55-2,53)	4,5
1987-1991	Nessuna	5	284.408	1,6 (0,5-4,1)	1	0,0
	Una	12	446.266	2,6 (1,4-4,6)	1,40 (0,49-3,99)	3,4
	Due o più	20	515.183	3,2 (1,9-5,3)	1,79 (0,66-4,85)	8,8
1992-1996	Nessuna	6	374.473	1,7 (0,6-3,9)	1	0,0
	Una	13	438.850	2,7 (1,4-4,7)	1,52 (0,57-4,02)	4,4
	Due o più	4	362.062	0,7 (0,2-2,7)	0,47 (0,13-1,69)	-4,6
1997-2001	Nessuna	6	411.809	1,5 (0,5-3,3)	1	0,0
	Una	7	424.072	1,3 (0,5-2,9)	0,89 (0,30-2,68)	-0,8
	Due o più	4	299.222	1,1 (0,3-3,6)	0,57 (0,15-2,08)	-3,1
2002-2006	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2007-2011	Nessuna	3	455.455	0,6 (0,1-1,9)	1	0,0
	Una	4	307.559	1,2 (0,3-3,5)	1,88 (0,42-8,43)	1,9
	Due o più	3	128.653	2,7 (0,6-9,8)	2,74 (0,54-13,87)	1,9

*n.c.*: non calcolabile per numero di casi insufficiente

**MORTALITÀ per SUICIDI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.**

Torino, 1972-2011. Donne 30-64 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili
1972-1976	Nessuna	9	145.467	6,6 (2,9-13,8)	1	0,0
	Una	36	384.233	9,6 (6,7-13,5)	1,39 (0,67-2,90)	10,2
	Due o più	65	793.279	8,0 (6,1-10,2)	1,15 (0,57-2,32)	8,6
1977-1981	Nessuna	15	177.348	8,5 (4,7-15,1)	1	0,0
	Una	42	403.751	10,9 (7,8-14,9)	1,17 (0,65-2,11)	6,1
	Due o più	56	736.206	7,6 (5,7-9,9)	0,82 (0,46-1,46)	-12,2
1982-1986	Nessuna	12	258.451	4,9 (2,5-8,8)	1	0,0
	Una	42	446.709	9,5 (6,8-12,8)	1,88 (0,99-3,58)	19,7
	Due o più	49	597.384	7,7 (5,6-10,3)	1,52 (0,80-2,87)	16,7
1987-1991	Nessuna	23	284.408	9,1 (5,7-13,8)	1	0,0
	Una	24	446.266	5,3 (3,4-8,0)	0,63 (0,35-1,11)	-14,2
	Due o più	37	515.183	7,2 (4,9-10,3)	0,78 (0,46-1,32)	-10,6
1992-1996	Nessuna	31	374.473	8,6 (5,8-12,3)	1	0,0
	Una	41	438.850	9,2 (6,6-12,6)	1,07 (0,67-1,71)	2,6
	Due o più	18	362.062	4,8 (2,6-8,2)	<b>0,53 (0,29-0,97)</b>	-15,8
1997-2001	Nessuna	16	411.809	4,4 (2,5-7,1)	1	0,0
	Una	24	424.072	5,9 (3,8-8,9)	1,37 (0,48-3,90)	6,4
	Due o più	14	299.222	4,0 (2,0-7,4)	0,98 (0,30-3,23)	-0,2
2002-2006	Nessuna	19	486.301	4,0 (2,4-6,3)	1	0,0
	Una	16	365.431	4,2 (2,4-7,0)	1,10 (0,56-2,15)	1,5
	Due o più	4	174.383	3,7 (1,0-9,4)	0,55 (0,19-1,65)	-3,2
2007-2011	Nessuna	19	455.455	4,1 (2,5-6,6)	1	0,0
	Una	18	307.559	5,6 (3,2-9,2)	1,38 (0,72-2,63)	4,9
	Due o più	5	128.653	4,9 (1,4-13,3)	0,88 (0,32-2,38)	-0,7