

MORTALITÀ per TUTTE LE CAUSE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	526	20.308	2734,8 (2505,3-2980,2)	1	0,0	100,9
	Una	2.714	91.131	2943,6 (2833,9-3056,6)	1,09 (0,99-1,19)	213,1	120,3
	Due o più	8.119	232.025	3360,1 (3287,2-3434,3)	1,24 (1,13-1,35)	1.558,5	143,8
1977-1981	Nessuna	590	25.941	2211,5 (2036,5-2397,9)	1	0,0	83,9
	Una	2.974	107.223	2597,5 (2504,4-2693,2)	1,18 (1,08-1,28)	445,5	102,9
	Due o più	8.546	261.096	3047,6 (2982,8-3113,5)	1,38 (1,27-1,49)	2.332,1	124,4
1982-1986	Nessuna	886	34.828	2344,6 (2191,2-2506,7)	1	0,0	99,3
	Una	3.568	122.834	2521,4 (2437,3-2608,0)	1,09 (0,96-1,24)	296,8	96,7
	Due o più	7.762	229.501	2937,3 (2870,1-3006,0)	1,25 (1,11-1,40)	1.540,6	126
1987-1991	Nessuna	916	46.496	1873,6 (1752,0-2002,2)	1	0,0	81
	Una	3.419	137.636	2114,4 (2041,1-2189,8)	1,14 (1,08-1,21)	421,1	88,3
	Due o più	7.109	237.638	2513,8 (2452,7-2576,2)	1,34 (1,27-1,42)	1.819,8	107
1992-1996	Nessuna	1.314	68.923	1876,1 (1774,2-1982,6)	1	0,0	71,9
	Una	3.865	167.922	2020,4 (1955,0-2087,6)	1,08 (0,96-1,21)	279,1	82,2
	Due o più	5.501	208.096	2241,7 (2179,6-2305,2)	1,19 (1,06-1,33)	879,0	97,2
1997-2001	Nessuna	1.366	83.935	1562,8 (1480,8-1648,4)	1	0,0	59,1
	Una	3.631	183.779	1754,2 (1696,5-1813,4)	1,12 (1,01-1,25)	394,8	70
	Due o più	4.847	212.447	2007,7 (1950,2-2066,7)	1,27 (1,14-1,42)	1.039,9	85,6
2002-2006	Nessuna	2.215	124.710	1563,6 (1497,7-1631,7)	1	0,0	58,7
	Una	4.032	205.623	1632,6 (1580,4-1686,3)	1,04 (1,00-1,08)	156,8	65,4
	Due o più	3.868	174.992	1768,2 (1709,4-1828,8)	1,13 (1,08-1,17)	436,6	70,3
2007-2011	Nessuna	2.276	141.359	1362,6 (1305,3-1421,9)	1	0,0	51,3
	Una	3.794	202.709	1464,6 (1414,7-1516,0)	1,06 (1,01-1,12)	226,2	60
	Due o più	3.529	162.146	1641,9 (1582,2-1703,6)	1,18 (1,12-1,25)	544,0	69

MORTALITÀ per TUMORI MALIGNI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	125	20.308	630,9 (524,8-752,9)	1	0,0	34,1
	Una	609	91.131	663,8 (612,1-718,7)	1,06 (0,87-1,28)	33,0	35,7
	Due o più	1.708	232.025	723,5 (689,5-758,8)	1,15 (0,96-1,38)	221,6	42,2
1977-1981	Nessuna	154	25.941	582,8 (494,3-682,9)	1	0,0	27,3
	Una	725	107.223	655,2 (608,2-705,1)	1,12 (0,94-1,33)	76,7	36,6
	Due o più	1.822	261.096	675,0 (644,2-707,0)	1,15 (0,98-1,36)	240,7	37,5
1982-1986	Nessuna	250	34.828	683,7 (600,7-775,7)	1	0,0	38
	Una	971	122.834	728,8 (682,4-777,8)	1,07 (0,93-1,23)	67,3	39,2
	Due o più	1.983	229.501	808,4 (771,8-846,4)	1,16 (1,02-1,33)	279,5	47,9
1987-1991	Nessuna	318	46.496	668,8 (596,1-748,5)	1	0,0	41,8
	Una	1.025	137.636	686,8 (643,9-732,1)	1,03 (0,93-1,14)	27,5	38,7
	Due o più	1.899	237.638	722,5 (688,8-757,5)	1,09 (0,99-1,20)	154,1	40,1
1992-1996	Nessuna	447	68.923	645,3 (586,0-709,3)	1	0,0	35,1
	Una	1.237	167.922	688,0 (649,2-728,7)	1,07 (0,98-1,17)	77,7	37,4
	Due o più	1.634	208.096	720,0 (683,9-757,5)	1,11 (1,02-1,21)	158,1	40,4
1997-2001	Nessuna	505	83.935	582,8 (532,9-636,3)	1	0,0	28,7
	Una	1.214	183.779	617,9 (583,0-654,5)	1,05 (0,95-1,17)	62,2	33,7
	Due o più	1.512	212.447	664,4 (630,6-699,7)	1,13 (1,02-1,25)	169,7	37,1
2002-2006	Nessuna	796	124.710	602,7 (560,8-647,0)	1	0,0	32,1
	Una	1.319	205.623	581,2 (549,0-615,0)	0,97 (0,89-1,06)	-41,9	31,9
	Due o più	1.239	174.992	613,8 (578,1-651,5)	1,04 (0,95-1,14)	52,3	31,3
2007-2011	Nessuna	848	141.359	539,9 (503,1-578,8)	1	0,0	26
	Una	1.384	202.709	588,6 (555,7-623,3)	1,07 (0,99-1,17)	94,4	32,1
	Due o più	1.167	162.146	613,5 (575,1-654,2)	1,10 (1,01-1,20)	105,4	34,8

MORTALITÀ per TUMORI VADS secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	3	20.308	14,9 (3,1-45,3)	1	0,0	0,9
	Una	16	91.131	17,3 (9,9-28,2)	1,16 (0,34-4,00)	2,3	1
	Due o più	31	232.025	13,2 (9,0-18,8)	0,87 (0,27-2,86)	-4,4	0,7
1977-1981	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1982-1986	Nessuna	7	34.828	19,8 (7,8-42,3)	1	0,0	1,7
	Una	22	122.834	16,5 (10,2-25,7)	0,87 (0,37-2,05)	-3,2	0,8
	Due o più	36	229.501	14,8 (10,2-21,0)	0,76 (0,34-1,71)	-11,4	0,9
1987-1991	Nessuna	8	46.496	16,3 (6,9-33,6)	1	0,0	0,7
	Una	23	137.636	14,5 (9,0-22,5)	0,88 (0,57-1,37)	-3,0	0,5
	Due o più	50	237.638	18,5 (13,5-24,8)	1,09 (0,73-1,64)	4,2	0,9
1992-1996	Nessuna	9	68.923	13,4 (6,1-26,2)	1	0,0	0,7
	Una	29	167.922	15,8 (10,4-23,2)	1,25 (0,70-2,22)	5,8	1
	Due o più	34	208.096	14,9 (10,1-21,3)	1,15 (0,65-2,03)	4,5	0,9
1997-2001	Nessuna	8	83.935	9,4 (4,0-18,8)	1	0,0	0,7
	Una	32	183.779	14,9 (10,1-21,4)	1,70 (0,49-5,93)	13,2	0,5
	Due o più	26	212.447	11,8 (7,6-17,6)	1,20 (0,34-4,29)	4,4	0,8
2002-2006	Nessuna	17	124.710	12,9 (7,4-21,0)	1	0,0	0,7
	Una	31	205.623	13,6 (9,1-19,8)	1,07 (0,84-1,37)	2,1	0,8
	Due o più	21	174.992	11,0 (6,6-17,6)	0,84 (0,64-1,09)	-4,1	0,6
2007-2011	Nessuna	14	141.359	8,5 (4,6-14,9)	1	0,0	0,3
	Una	22	202.709	10,4 (6,3-16,6)	1,09 (0,56-2,13)	1,8	0,7
	Due o più	18	162.146	13,0 (7,4-21,6)	1,11 (0,55-2,23)	1,8	1,3

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DELLO STOMACO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	8	20.308	41,9 (18,1-83,5)	1	0,0	0,7
	Una	66	91.131	71,7 (55,4-91,2)	1,75 (0,84-3,64)	28,3	3,1
	Due o più	241	232.025	100,3 (88,0-113,9)	2,44 (1,21-4,94)	142,4	4,4
1977-1981	Nessuna	13	25.941	49,6 (26,4-85,2)	1	0,0	2,6
	Una	59	107.223	52,1 (39,6-67,5)	1,07 (0,66-1,73)	3,7	2,4
	Due o più	231	261.096	83,8 (73,2-95,4)	1,71 (1,09-2,68)	95,7	3,7
1982-1986	Nessuna	13	34.828	33,3 (17,6-58,5)	1	0,0	0,8
	Una	79	122.834	55,7 (43,7-70,3)	1,65 (0,92-2,97)	31,2	2,3
	Due o più	171	229.501	66,1 (56,2-77,4)	1,88 (1,07-3,31)	80,1	3,1
1987-1991	Nessuna	15	46.496	30,1 (16,6-51,1)	1	0,0	1,2
	Una	66	137.636	42,3 (32,3-54,7)	1,35 (0,93-1,97)	17,1	1,9
	Due o più	164	237.638	57,8 (48,9-68,1)	1,90 (1,33-2,72)	77,8	2,5
1992-1996	Nessuna	28	68.923	39,8 (26,2-58,5)	1	0,0	1,6
	Una	64	167.922	33,5 (25,6-43,3)	0,85 (0,55-1,33)	-11,2	1,3
	Due o più	116	208.096	50,2 (41,1-60,8)	1,19 (0,79-1,81)	18,8	2,4
1997-2001	Nessuna	14	83.935	15,6 (8,5-26,6)	1	0,0	0,3
	Una	52	183.779	25,8 (19,1-34,1)	1,58 (0,95-2,62)	19,0	1,2
	Due o più	84	212.447	35,0 (27,8-43,8)	2,17 (1,33-3,53)	45,3	1,6
2002-2006	Nessuna	27	124.710	19,3 (12,6-28,5)	1	0,0	0,7
	Una	50	205.623	23,0 (16,9-30,8)	1,08 (0,68-1,73)	3,7	1,5
	Due o più	64	174.992	32,2 (24,4-42,0)	1,59 (1,01-2,49)	23,7	1,6
2007-2011	Nessuna	28	141.359	18,4 (12,1-27,1)	1	0,0	1,1
	Una	46	202.709	19,4 (13,8-26,7)	1,08 (0,86-1,34)	3,3	0,9
	Due o più	75	162.146	38,5 (29,5-49,9)	2,13 (1,74-2,62)	39,8	1,9

MORTALITÀ per TUMORE DEL COLON secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	15	20.308	75,1 (42,0-125,1)	1	0,0	3,8
	Una	68	91.131	73,8 (57,3-93,7)	0,97 (0,55-1,69)	-2,5	3,4
	Due o più	210	232.025	87,6 (76,1-100,4)	1,14 (0,68-1,93)	26,5	4,5
1977-1981	Nessuna	17	25.941	62,7 (36,5-101,0)	1	0,0	1,1
	Una	78	107.223	69,3 (54,7-86,8)	1,08 (0,64-1,82)	5,6	3,4
	Due o più	195	261.096	70,6 (61,0-81,4)	1,10 (0,67-1,80)	17,6	3,3
1982-1986	Nessuna	26	34.828	67,0 (43,7-99,7)	1	0,0	1,7
	Una	102	122.834	75,0 (60,8-92,0)	1,07 (0,73-1,57)	6,9	3,7
	Due o più	196	229.501	77,1 (66,3-89,4)	1,09 (0,76-1,56)	16,0	3,9
1987-1991	Nessuna	32	46.496	63,6 (43,4-91,1)	1	0,0	4,1
	Una	94	137.636	59,6 (47,7-73,8)	0,92 (0,62-1,38)	-7,7	2,8
	Due o più	188	237.638	70,0 (59,9-81,5)	1,05 (0,72-1,53)	9,4	3,7
1992-1996	Nessuna	35	68.923	52,9 (36,6-74,3)	1	0,0	2,7
	Una	131	167.922	72,4 (60,2-86,4)	1,41 (0,97-2,05)	38,1	3,4
	Due o più	168	208.096	69,2 (58,6-81,4)	1,40 (0,97-2,02)	48,4	3,7
1997-2001	Nessuna	49	83.935	56,3 (41,6-74,7)	1	0,0	2,5
	Una	117	183.779	59,8 (49,2-72,1)	1,03 (0,74-1,44)	3,4	3,7
	Due o più	137	212.447	58,3 (48,7-69,4)	1,03 (0,74-1,43)	3,8	2,9
2002-2006	Nessuna	81	124.710	59,2 (46,8-74,2)	1	0,0	2,9
	Una	129	205.623	55,0 (45,6-66,1)	0,92 (0,79-1,08)	-11,0	2,8
	Due o più	135	174.992	64,5 (53,5-77,5)	1,10 (0,94-1,29)	12,2	2,8
2007-2011	Nessuna	81	141.359	50,3 (39,7-63,2)	1	0,0	2,2
	Una	137	202.709	54,2 (44,8-65,3)	1,10 (0,83-1,45)	12,3	2,5
	Due o più	108	162.146	56,9 (45,8-70,5)	1,05 (0,78-1,40)	4,7	3

MORTALITÀ per TUMORE DEL RETTO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	9	20.308	45,2 (20,6-87,1)	1	0,0	2,6
	Una	29	91.131	31,5 (21,1-45,3)	0,70 (0,33-1,48)	-12,3	2
	Due o più	100	232.025	42,3 (34,4-51,6)	0,94 (0,47-1,86)	-6,6	2,5
1977-1981	Nessuna	4	25.941	15,1 (4,1-39,2)	1	0,0	0,4
	Una	36	107.223	31,8 (22,3-44,3)	2,12 (0,75-5,95)	19,0	1,1
	Due o più	99	261.096	36,1 (29,3-44,0)	2,40 (0,88-6,51)	57,7	1,5
1982-1986	Nessuna	7	34.828	17,8 (7,1-38,6)	1	0,0	0,7
	Una	42	122.834	32,3 (23,0-44,5)	1,67 (0,75-3,71)	16,8	2
	Due o più	87	229.501	35,9 (28,4-44,8)	1,83 (0,85-3,96)	39,5	2,2
1987-1991	Nessuna	7	46.496	14,8 (5,8-32,1)	1	0,0	1,2
	Una	36	137.636	24,1 (16,6-34,0)	1,60 (0,71-3,59)	13,5	1,2
	Due o più	85	237.638	31,3 (24,7-39,3)	2,15 (0,99-4,64)	45,4	1,3
1992-1996	Nessuna	20	68.923	28,8 (17,3-45,5)	1	0,0	0,5
	Una	31	167.922	17,5 (11,8-25,3)	0,57 (0,32-1,00)	-23,6	0,9
	Due o più	66	208.096	27,2 (20,7-35,3)	0,93 (0,56-1,54)	-5,0	1,2
1997-2001	Nessuna	18	83.935	21,1 (12,5-33,6)	1	0,0	1
	Una	51	183.779	24,5 (18,2-32,6)	1,21 (0,80-1,84)	8,8	0,9
	Due o più	55	212.447	23,6 (17,7-31,1)	1,11 (0,73-1,68)	5,5	1,2
2002-2006	Nessuna	19	124.710	13,3 (7,9-21,2)	1	0,0	0,6
	Una	48	205.623	21,9 (15,9-29,6)	1,48 (0,87-2,51)	15,5	1,4
	Due o più	41	174.992	19,7 (13,8-27,6)	1,45 (0,84-2,49)	12,6	1
2007-2011	Nessuna	25	141.359	16,8 (10,8-25,3)	1	0,0	1
	Una	21	202.709	9,5 (5,6-15,4)	1,17 (0,87-1,56)	-16,8	0,7
	Due o più	28	162.146	13,6 (8,7-21,0)	0,90 (0,57-1,44)	-3,0	0,5

MORTALITÀ per TUMORE DEL FEGATO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
1977-1981	Nessuna	7	25.941	25,8 (10,4-53,9)	1	0,0	0,2
	Una	21	107.223	18,1 (11,2-27,9)	0,69 (0,17-2,83)	-9,5	0,3
	Due o più	51	261.096	18,7 (13,9-24,7)	0,73 (0,19-2,79)	-19,0	1
1982-1986	Nessuna	14	34.828	36,2 (19,6-62,3)	1	0,0	1,3
	Una	43	122.834	32,9 (23,6-45,1)	0,85 (0,46-1,55)	-7,7	1,9
	Due o più	109	229.501	44,3 (36,1-54,1)	1,14 (0,65-1,99)	13,5	2,6
1987-1991	Nessuna	10	46.496	20,4 (9,7-38,9)	1	0,0	1
	Una	50	137.636	33,9 (24,8-45,5)	1,59 (0,61-4,15)	18,6	2,3
	Due o più	95	237.638	35,1 (28,1-43,5)	1,73 (0,69-4,34)	40,1	1,8
1992-1996	Nessuna	10	68.923	14,3 (6,7-27,1)	1	0,0	0,6
	Una	62	167.922	35,1 (26,7-45,5)	2,39 (1,22-4,66)	36,1	2,3
	Due o più	81	208.096	34,8 (27,4-43,9)	2,45 (1,27-4,73)	47,9	1,8
1997-2001	Nessuna	13	83.935	14,8 (7,9-25,6)	1	0,0	0,7
	Una	43	183.779	22,3 (16,1-30,4)	1,47 (1,00-2,16)	13,7	1,2
	Due o più	78	212.447	33,8 (26,6-42,5)	2,29 (1,59-3,30)	43,9	1,6
2002-2006	Nessuna	32	124.710	25,3 (17,2-36,1)	1	0,0	1,5
	Una	57	205.623	24,6 (18,4-32,5)	1,05 (0,73-1,50)	2,7	1,3
	Due o più	65	174.992	33,8 (25,7-44,1)	1,38 (0,97-1,96)	17,8	2
2007-2011	Nessuna	26	141.359	16,9 (10,9-25,2)	1	0,0	0,8
	Una	65	202.709	27,0 (20,5-35,3)	1,62 (1,35-1,93)	24,8	1,2
	Due o più	65	162.146	32,7 (24,6-43,2)	1,96 (1,64-2,35)	31,9	1,4

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per TUMORE DEL POLMONE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	11	20.308	55,6 (27,7-100,8)	1	0,0	3,5
	Una	38	91.131	41,6 (29,4-57,1)	0,75 (0,42-1,34)	-12,5	2
	Due o più	93	232.025	39,6 (31,9-48,6)	0,71 (0,42-1,23)	-37,4	2,4
1977-1981	Nessuna	13	25.941	49,2 (26,2-84,6)	1	0,0	1,8
	Una	58	107.223	52,7 (40,0-68,4)	1,07 (0,59-1,95)	3,7	3
	Due o più	122	261.096	46,1 (38,2-55,1)	0,92 (0,52-1,64)	-10,1	3
1982-1986	Nessuna	14	34.828	38,5 (21,0-65,9)	1	0,0	2,1
	Una	82	122.834	65,6 (51,8-82,3)	1,63 (0,71-3,73)	31,5	4,8
	Due o più	164	229.501	65,4 (55,5-76,8)	1,72 (0,78-3,82)	68,9	3,4
1987-1991	Nessuna	34	46.496	74,0 (50,9-104,7)	1	0,0	5,3
	Una	104	137.636	70,8 (57,5-86,6)	0,99 (0,67-1,46)	-1,1	4,5
	Due o più	167	237.638	64,5 (54,6-75,7)	0,91 (0,63-1,32)	-16,4	3,7
1992-1996	Nessuna	58	68.923	82,8 (62,6-107,9)	1	0,0	4,6
	Una	135	167.922	78,1 (65,2-92,9)	0,92 (0,67-1,25)	-12,0	4,5
	Due o più	158	208.096	75,1 (63,5-88,3)	0,85 (0,63-1,16)	-26,8	4,7
1997-2001	Nessuna	68	83.935	77,9 (60,4-99,0)	1	0,0	3,6
	Una	144	183.779	75,0 (63,1-88,7)	0,94 (0,70-1,25)	-9,6	4,9
	Due o più	158	212.447	70,2 (59,5-82,4)	0,89 (0,67-1,18)	-20,5	3,9
2002-2006	Nessuna	120	124.710	93,1 (77,0-111,8)	1	0,0	5
	Una	176	205.623	81,8 (69,7-95,5)	0,87 (0,69-1,10)	-26,1	5,6
	Due o più	137	174.992	72,6 (60,3-87,0)	0,79 (0,61-1,00)	-37,4	4,5
2007-2011	Nessuna	121	141.359	78,5 (64,8-94,5)	1	0,0	3,9
	Una	200	202.709	88,1 (75,4-102,6)	1,10 (0,94-1,28)	17,5	5,3
	Due o più	161	162.146	85,0 (71,1-101,2)	1,08 (0,91-1,27)	11,4	4,7

MORTALITÀ per TUMORE DELLA MAMMELLA secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	29	20.308	148,8 (99,5-214,7)	1	0,0	7
	Una	112	91.131	122,5 (100,8-147,4)	0,84 (0,56-1,27)	-20,9	7,9
	Due o più	227	232.025	96,3 (84,2-109,8)	0,66 (0,45-0,98)	-115,1	5,9
1977-1981	Nessuna	30	25.941	113,3 (76,4-162,2)	1	0,0	5,4
	Una	140	107.223	129,1 (108,5-152,5)	1,12 (0,75-1,66)	14,8	8,5
	Due o più	289	261.096	108,7 (96,5-122,2)	0,95 (0,65-1,38)	-16,2	7,1
1982-1986	Nessuna	52	34.828	146,4 (108,9-193,3)	1	0,0	10
	Una	148	122.834	115,5 (97,2-136,7)	0,80 (0,58-1,10)	-36,8	7,4
	Due o più	326	229.501	140,9 (125,4-157,9)	0,94 (0,70-1,26)	-20,0	10,1
1987-1991	Nessuna	73	46.496	151,0 (118,0-191,4)	1	0,0	11,3
	Una	170	137.636	118,8 (101,1-139,0)	0,76 (0,61-0,95)	-52,6	7,5
	Due o più	269	237.638	107,5 (94,5-121,9)	0,70 (0,56-0,86)	-117,7	7
1992-1996	Nessuna	93	68.923	136,0 (109,5-167,4)	1	0,0	10
	Una	200	167.922	113,3 (97,7-130,7)	0,86 (0,70-1,06)	-31,8	7,4
	Due o più	234	208.096	108,5 (94,5-124,1)	0,81 (0,66-0,99)	-56,6	7,6
1997-2001	Nessuna	98	83.935	112,3 (91,1-137,1)	1	0,0	5
	Una	218	183.779	113,6 (98,8-130,1)	0,99 (0,71-1,39)	-1,3	6,9
	Due o più	227	212.447	104,9 (91,4-119,9)	0,89 (0,64-1,24)	-27,5	7,2
2002-2006	Nessuna	144	124.710	112,5 (94,6-132,9)	1	0,0	6,6
	Una	193	205.623	85,1 (73,1-98,8)	0,79 (0,63-0,98)	-52,4	4,8
	Due o più	185	174.992	91,2 (77,8-106,6)	0,87 (0,70-1,08)	-28,5	4,6
2007-2011	Nessuna	141	141.359	90,7 (76,0-107,6)	1	0,0	4,2
	Una	204	202.709	91,5 (78,4-106,4)	0,96 (0,78-1,19)	-8,0	5,9
	Due o più	158	162.146	87,7 (73,2-104,6)	0,91 (0,72-1,14)	-15,6	5,6

MORTALITÀ per DIABETE MELLITO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	23	20.308	118,4 (74,9-178,6)	1	0,0	4,9
	Una	101	91.131	110,1 (89,7-133,9)	0,94 (0,71-1,25)	-6,5	4,6
	Due o più	335	232.025	140,7 (126,0-156,7)	1,20 (0,92-1,56)	55,4	7,1
1977-1981	Nessuna	16	25.941	59,8 (34,2-97,7)	1	0,0	1,8
	Una	77	107.223	68,0 (53,6-85,2)	1,13 (0,70-1,81)	8,7	2,6
	Due o più	337	261.096	121,4 (108,7-135,3)	2,02 (1,30-3,13)	170,1	5,2
1982-1986	Nessuna	13	34.828	34,2 (18,1-60,0)	1	0,0	1,3
	Una	58	122.834	40,4 (30,4-53,0)	1,20 (0,72-2,00)	9,8	1,4
	Due o più	139	229.501	52,1 (43,6-62,1)	1,52 (0,94-2,45)	47,3	1,9
1987-1991	Nessuna	16	46.496	29,3 (16,6-49,3)	1	0,0	0,4
	Una	61	137.636	40,4 (30,6-52,6)	1,18 (0,50-2,77)	9,3	2
	Due o più	166	237.638	59,7 (50,6-70,2)	1,82 (0,82-4,04)	74,9	2,9
1992-1996	Nessuna	35	68.923	49,9 (34,6-70,4)	1	0,0	1,9
	Una	129	167.922	67,4 (55,9-80,7)	1,35 (0,97-1,87)	33,1	2,2
	Due o più	200	208.096	81,1 (69,7-94,0)	1,60 (1,17-2,20)	75,1	3,3
1997-2001	Nessuna	29	83.935	32,9 (22,0-47,6)	1	0,0	1,2
	Una	92	183.779	43,9 (35,2-54,2)	1,34 (0,97-1,86)	23,4	1,6
	Due o più	218	212.447	91,1 (79,1-104,6)	2,70 (1,99-3,66)	137,3	4,3
2002-2006	Nessuna	34	124.710	25,1 (17,2-35,4)	1	0,0	0,8
	Una	100	205.623	40,8 (33,0-50,3)	1,68 (1,14-2,48)	40,4	1,4
	Due o più	123	174.992	54,9 (45,1-66,6)	2,33 (1,59-3,40)	70,1	1,9
2007-2011	Nessuna	42	141.359	25,5 (18,2-35,1)	1	0,0	1
	Una	98	202.709	39,5 (31,4-49,3)	1,51 (1,05-2,17)	33,1	2
	Due o più	108	162.146	50,7 (40,5-63,3)	2,00 (1,40-2,86)	53,9	2,5

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. CIRCOLATORIO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	267	20.308	1413,2 (1248,3-1594,3)	1	0,0	37,3
	Una	1.460	91.131	1579,8 (1499,7-1663,1)	1,13 (0,99-1,29)	171,4	54,1
	Due o più	4.375	232.025	1791,5 (1738,6-1845,6)	1,28 (1,14-1,45)	969,3	62,9
1977-1981	Nessuna	283	25.941	1052,2 (933,1-1182,7)	1	0,0	31,5
	Una	1.560	107.223	1342,5 (1276,4-1411,4)	1,28 (1,12-1,45)	338,0	43,1
	Due o più	4.693	261.096	1648,6 (1601,4-1696,9)	1,56 (1,38-1,76)	1.681,3	56,7
1982-1986	Nessuna	438	34.828	1137,6 (1032,6-1251,3)	1	0,0	39,7
	Una	1.764	122.834	1206,8 (1150,0-1266,1)	1,08 (0,97-1,20)	129,4	35,7
	Due o più	3.963	229.501	1444,0 (1398,0-1491,3)	1,27 (1,15-1,40)	840,6	49
1987-1991	Nessuna	388	46.496	781,6 (704,2-866,0)	1	0,0	23,7
	Una	1.620	137.636	947,1 (899,6-996,7)	1,24 (1,05-1,47)	317,1	29,7
	Due o più	3.439	237.638	1164,8 (1124,2-1206,7)	1,49 (1,27-1,74)	1.128,9	40,1
1992-1996	Nessuna	545	68.923	769,1 (704,5-838,3)	1	0,0	19,6
	Una	1.683	167.922	840,3 (799,1-883,2)	1,10 (0,90-1,35)	158,5	25,6
	Due o più	2.444	208.096	949,2 (909,7-990,1)	1,26 (1,02-1,55)	501,7	33,3
1997-2001	Nessuna	519	83.935	589,9 (540,1-643,2)	1	0,0	17
	Una	1.457	183.779	678,7 (643,8-715,2)	1,15 (0,98-1,36)	192,7	19,6
	Due o più	1.953	212.447	771,4 (736,8-807,4)	1,30 (1,12-1,53)	456,0	24,2
2002-2006	Nessuna	801	124.710	533,7 (496,6-573,1)	1	0,0	13,9
	Una	1.537	205.623	589,6 (559,2-621,4)	1,08 (0,99-1,18)	113,9	17,6
	Due o più	1.483	174.992	640,0 (605,9-675,9)	1,17 (1,07-1,27)	210,6	20
2007-2011	Nessuna	723	141.359	405,9 (375,9-438,0)	1	0,0	9,8
	Una	1.244	202.709	437,6 (412,0-464,8)	1,07 (0,98-1,17)	81,0	11,9
	Due o più	1.227	162.146	523,4 (491,7-557,3)	1,24 (1,14-1,36)	241,3	16

MORTALITÀ per MAL. ISCHEMICHE DEL CUORE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	79	20.308	416,1 (329,2-519,5)	1	0,0	12,7
	Una	467	91.131	506,2 (461,3-554,3)	1,23 (1,03-1,47)	87,6	19,6
	Due o più	1.255	232.025	515,1 (486,9-544,6)	1,26 (1,06-1,48)	255,0	18,8
1977-1981	Nessuna	86	25.941	321,4 (257,1-397,4)	1	0,0	9,9
	Una	489	107.223	424,6 (387,6-464,4)	1,32 (1,05-1,66)	119,3	15,4
	Due o più	1.423	261.096	504,8 (478,7-532,0)	1,57 (1,26-1,95)	514,2	18,9
1982-1986	Nessuna	90	34.828	246,9 (198,0-305,0)	1	0,0	13,8
	Una	333	122.834	238,8 (213,3-267,0)	1,01 (0,80-1,27)	2,5	9,7
	Due o più	766	229.501	295,6 (274,4-318,2)	1,22 (0,98-1,52)	140,1	13,2
1987-1991	Nessuna	91	46.496	193,0 (154,7-238,6)	1	0,0	8,8
	Una	357	137.636	219,2 (196,1-244,4)	1,20 (0,96-1,52)	60,6	8,6
	Due o più	766	237.638	280,9 (260,4-302,7)	1,47 (1,18-1,82)	243,3	12,5
1992-1996	Nessuna	128	68.923	178,8 (148,6-213,7)	1	0,0	6,4
	Una	420	167.922	213,6 (192,9-236,0)	1,19 (0,97-1,45)	66,2	7,3
	Due o più	625	208.096	252,7 (232,2-274,7)	1,35 (1,11-1,63)	161,6	10,3
1997-2001	Nessuna	131	83.935	148,8 (124,4-176,9)	1	0,0	4,3
	Una	394	183.779	188,0 (169,6-208,1)	1,25 (1,03-1,52)	78,7	6,6
	Due o più	541	212.447	217,5 (199,1-237,3)	1,45 (1,20-1,76)	168,6	8,2
2002-2006	Nessuna	204	124.710	138,2 (119,4-159,2)	1	0,0	4,2
	Una	416	205.623	160,6 (144,9-177,8)	1,15 (1,06-1,26)	55,2	5,1
	Due o più	431	174.992	190,1 (171,5-210,5)	1,34 (1,23-1,46)	109,3	6,6
2007-2011	Nessuna	183	141.359	103,4 (88,6-120,4)	1	0,0	2,4
	Una	298	202.709	110,4 (97,4-125,1)	1,02 (0,87-1,19)	5,3	3,7
	Due o più	308	162.146	134,5 (118,5-152,6)	1,25 (1,07-1,46)	61,1	4,1

MORTALITÀ per MAL. CEREBROVASCOLARI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	89	20.308	472,7 (379,4-582,5)	1	0,0	10,8
	Una	416	91.131	449,8 (407,6-495,3)	0,97 (0,77-1,22)	-13,7	13,6
	Due o più	1.358	232.025	556,7 (527,4-587,2)	1,20 (0,96-1,48)	221,8	19,8
1977-1981	Nessuna	96	25.941	357,9 (289,9-437,6)	1	0,0	12,5
	Una	521	107.223	446,2 (408,5-486,6)	1,25 (1,05-1,49)	105,5	13,5
	Due o più	1.502	261.096	524,9 (498,5-552,4)	1,47 (1,24-1,73)	477,2	16,8
1982-1986	Nessuna	170	34.828	436,2 (372,6-508,6)	1	0,0	13
	Una	624	122.834	420,6 (387,6-456,0)	0,98 (0,83-1,16)	-12,2	11
	Due o più	1.473	229.501	532,7 (505,1-561,8)	1,21 (1,03-1,42)	255,6	17,6
1987-1991	Nessuna	136	46.496	270,0 (225,7-321,4)	1	0,0	7,4
	Una	570	137.636	325,7 (298,5-355,1)	1,23 (1,06-1,44)	108,4	8,8
	Due o più	1.214	237.638	398,4 (375,2-422,9)	1,48 (1,28-1,71)	394,0	12,4
1992-1996	Nessuna	196	68.923	272,9 (235,3-315,3)	1	0,0	5,4
	Una	586	167.922	285,5 (262,0-310,8)	1,04 (0,81-1,33)	22,4	7
	Due o più	859	208.096	324,3 (301,7-348,4)	1,14 (0,90-1,45)	108,3	10,2
1997-2001	Nessuna	181	83.935	205,0 (176,2-237,5)	1	0,0	4,8
	Una	463	183.779	213,2 (193,9-234,1)	1,04 (0,79-1,36)	16,7	6,1
	Due o più	652	212.447	253,7 (234,2-274,6)	1,23 (0,95-1,59)	121,9	6,9
2002-2006	Nessuna	287	124.710	189,0 (167,3-213,0)	1	0,0	4,6
	Una	509	205.623	190,9 (174,1-209,2)	0,99 (0,88-1,12)	-4,1	4,7
	Due o più	439	174.992	183,4 (165,7-202,8)	0,95 (0,84-1,08)	-21,5	4,8
2007-2011	Nessuna	222	141.359	125,5 (109,0-144,0)	1	0,0	3,2
	Una	408	202.709	138,6 (124,6-154,2)	1,14 (1,00-1,29)	48,7	3,4
	Due o più	414	162.146	168,1 (150,9-187,4)	1,35 (1,20-1,53)	108,2	4

MORTALITÀ per MAL. DELL'APP. RESPIRATORIO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	24	20.308	125,4 (80,2-187,6)	1	0,0	5,3
	Una	120	91.131	129,6 (107,5-155,1)	1,04 (0,67-1,61)	4,4	4,1
	Due o più	419	232.025	172,0 (155,9-189,4)	1,37 (0,91-2,07)	113,8	6,3
1977-1981	Nessuna	27	25.941	101,7 (67,0-148,5)	1	0,0	4,4
	Una	139	107.223	119,7 (100,5-141,7)	1,19 (0,83-1,71)	22,5	4
	Due o più	406	261.096	142,7 (129,1-157,5)	1,41 (1,01-1,98)	119,0	4,8
1982-1986	Nessuna	37	34.828	95,9 (67,3-133,7)	1	0,0	3,5
	Una	215	122.834	148,9 (129,3-171,1)	1,56 (1,21-2,03)	77,5	4,8
	Due o più	474	229.501	175,6 (159,7-193,0)	1,81 (1,41-2,32)	211,8	6,7
1987-1991	Nessuna	34	46.496	69,0 (47,4-97,9)	1	0,0	2,3
	Una	159	137.636	94,6 (79,9-111,6)	1,40 (1,09-1,80)	45,2	3,2
	Due o più	360	237.638	123,1 (110,1-137,4)	1,78 (1,40-2,27)	158,2	4,2
1992-1996	Nessuna	65	68.923	94,4 (72,5-121,4)	1	0,0	2,8
	Una	174	167.922	90,5 (77,1-105,7)	0,96 (0,72-1,28)	-6,5	3,4
	Due o più	272	208.096	105,2 (92,4-119,5)	1,15 (0,88-1,51)	35,4	3,6
1997-2001	Nessuna	77	83.935	87,3 (68,9-109,5)	1	0,0	2,5
	Una	221	183.779	104,3 (90,8-119,5)	1,20 (0,92-1,55)	36,5	3,3
	Due o più	291	212.447	119,8 (106,1-135,0)	1,34 (1,04-1,72)	73,6	5
2002-2006	Nessuna	138	124.710	93,4 (78,2-111,0)	1	0,0	2,2
	Una	256	205.623	99,1 (86,8-112,8)	1,05 (0,89-1,23)	11,5	3,2
	Due o più	244	174.992	106,9 (93,1-122,5)	1,12 (0,95-1,31)	25,7	3,6
2007-2011	Nessuna	147	141.359	81,3 (68,2-96,4)	1	0,0	2,2
	Una	231	202.709	80,3 (69,6-92,5)	0,97 (0,79-1,20)	-6,1	2
	Due o più	240	162.146	101,7 (88,2-117,4)	1,19 (0,97-1,47)	38,8	2,7

MORTALITÀ per BPCO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	12	20.308	61,9 (31,9-109,3)	1	0,0	3,3
	Una	43	91.131	46,4 (33,6-62,6)	0,76 (0,40-1,44)	-13,8	2,2
	Due o più	151	232.025	62,9 (53,3-73,9)	1,02 (0,56-1,83)	2,3	2,6
1977-1981	Nessuna	14	25.941	52,4 (28,6-88,4)	1	0,0	2,4
	Una	45	107.223	39,8 (29,0-53,6)	0,75 (0,41-1,37)	-14,8	1,7
	Due o più	156	261.096	55,7 (47,2-65,3)	1,06 (0,61-1,83)	8,9	2,5
1982-1986	Nessuna	17	34.828	46,3 (26,7-75,5)	1	0,0	2,6
	Una	77	122.834	54,6 (42,9-69,1)	1,24 (0,84-1,83)	14,9	2,1
	Due o più	171	229.501	67,7 (57,6-79,3)	1,45 (1,00-2,10)	53,3	3,6
1987-1991	Nessuna	17	46.496	35,6 (20,5-58,5)	1	0,0	1,5
	Una	83	137.636	49,1 (38,6-61,8)	1,45 (0,86-2,45)	25,9	1,7
	Due o più	182	237.638	61,4 (52,4-71,6)	1,80 (1,09-2,95)	80,7	1,8
1992-1996	Nessuna	32	68.923	47,8 (32,5-68,4)	1	0,0	1,3
	Una	102	167.922	53,6 (43,4-65,6)	1,16 (0,81-1,66)	14,2	2,3
	Due o più	154	208.096	60,6 (50,9-71,8)	1,34 (0,96-1,89)	39,4	2,3
1997-2001	Nessuna	35	83.935	39,9 (27,8-55,9)	1	0,0	1,5
	Una	118	183.779	56,4 (46,6-68,0)	1,42 (0,97-2,07)	35,0	1,9
	Due o più	143	212.447	59,2 (49,7-70,2)	1,46 (1,01-2,12)	45,4	2,5
2002-2006	Nessuna	69	124.710	46,2 (35,8-59,0)	1	0,0	0,8
	Una	127	205.623	48,2 (39,9-58,1)	1,03 (0,80-1,34)	4,1	1,3
	Due o più	112	174.992	48,2 (39,2-59,1)	1,02 (0,78-1,32)	1,9	1,4
2007-2011	Nessuna	63	141.359	33,3 (25,4-43,4)	1	0,0	0,6
	Una	91	202.709	30,3 (24,0-38,2)	0,89 (0,56-1,39)	-11,7	0,7
	Due o più	96	162.146	39,3 (31,4-49,4)	1,10 (0,70-1,71)	8,4	0,7

MORTALITÀ per CIRROSI EPATICA secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	3	20.308	14,1 (2,9-43,5)	1	0,0	1,6
	Una	46	91.131	50,5 (37,0-67,4)	3,39 (1,06-10,91)	32,4	3,6
	Due o più	138	232.025	58,9 (49,4-69,6)	4,00 (1,27-12,54)	103,5	4,3
1977-1981	Nessuna	10	25.941	39,0 (18,7-72,0)	1	0,0	3,6
	Una	59	107.223	53,4 (40,6-69,2)	1,41 (0,72-2,77)	17,3	3,1
	Due o più	176	261.096	66,3 (56,9-77,0)	1,73 (0,92-3,27)	74,3	4,4
1982-1986	Nessuna	15	34.828	44,9 (25,0-75,1)	1	0,0	4
	Una	55	122.834	42,0 (31,4-55,4)	1,03 (0,58-1,83)	1,7	2,3
	Due o più	159	229.501	68,5 (57,9-80,6)	1,59 (0,94-2,71)	59,2	5
1987-1991	Nessuna	22	46.496	47,3 (29,3-73,1)		0,0	3,1
	Una	53	137.636	38,1 (28,3-50,5)	0,78 (0,47-1,28)	-15,0	2,5
	Due o più	143	237.638	57,4 (48,0-68,2)	1,21 (0,77-1,89)	24,6	3,2
1992-1996	Nessuna	29	68.923	41,3 (27,6-60,1)		0,0	3,4
	Una	68	167.922	40,1 (31,0-51,1)	0,93 (0,60-1,44)	-5,0	2,4
	Due o più	115	208.096	52,4 (42,9-63,4)	1,26 (0,84-1,89)	23,5	2,9
1997-2001	Nessuna	26	83.935	30,5 (19,9-45,0)		0,0	2
	Una	71	183.779	35,8 (27,8-45,5)	1,21 (0,77-1,90)	12,5	1,9
	Due o più	133	212.447	59,8 (49,8-71,2)	1,96 (1,28-2,98)	65,0	3,5
2002-2006	Nessuna	48	124.710	36,1 (26,5-48,3)		0,0	1,4
	Una	89	205.623	38,4 (30,6-47,8)	1,08 (0,76-1,53)	6,6	1,7
	Due o più	112	174.992	57,3 (46,6-70,1)	1,56 (1,11-2,18)	40,0	3,2
2007-2011	Nessuna	34	141.359	23,0 (15,8-32,6)		0,0	1,5
	Una	60	202.709	28,4 (21,3-37,5)	1,19 (0,74-1,92)	9,6	1,9
	Due o più	75	162.146	35,7 (27,2-46,6)	1,75 (1,10-2,80)	32,2	1,8

MORTALITÀ per CAUSE ALCOOL-CORRELATE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	9	20.308	47,8 (22,1-90,9)	1	0,0	2
	Una	61	91.131	66,6 (51,0-85,6)	1,39 (1,12-1,72)	17,3	2,8
	Due o più	173	232.025	71,7 (61,4-83,3)	1,50 (1,22-1,84)	57,5	3,3
1977-1981	Nessuna	15	25.941	56,0 (31,2-93,1)	1	0,0	2,9
	Una	70	107.223	61,4 (47,8-77,9)	1,11 (0,77-1,60)	7,2	2,6
	Due o più	190	261.096	68,4 (58,9-79,0)	1,22 (0,87-1,72)	34,6	3,3
1982-1986	Nessuna	19	34.828	52,7 (31,6-83,6)	1	0,0	3,1
	Una	73	122.834	51,9 (40,4-66,1)	1,05 (0,71-1,53)	3,2	2,1
	Due o più	174	229.501	67,6 (57,5-79,1)	1,31 (0,91-1,88)	41,2	3,4
1987-1991	Nessuna	18	46.496	38,3 (22,5-61,8)	1	0,0	1,6
	Una	69	137.636	43,8 (33,7-56,4)	1,16 (0,94-1,43)	9,5	2,2
	Due o più	145	237.638	53,0 (44,3-63,0)	1,39 (1,14-1,69)	40,6	2,5
1992-1996	Nessuna	25	68.923	34,0 (21,8-51,3)	1	0,0	1,9
	Una	69	167.922	38,5 (29,7-49,1)	1,07 (0,78-1,47)	4,6	2,1
	Due o più	103	208.096	43,6 (35,2-53,5)	1,24 (0,92-1,68)	20,1	2
1997-2001	Nessuna	28	83.935	32,2 (21,2-46,9)	1	0,0	1,9
	Una	67	183.779	32,3 (24,9-41,5)	1,05 (0,74-1,49)	3,1	1,3
	Due o più	114	212.447	49,2 (40,4-59,5)	1,52 (1,09-2,11)	38,7	2,6
2002-2006	Nessuna	42	124.710	30,9 (22,1-42,3)	1	0,0	1,3
	Una	81	205.623	33,5 (26,4-42,3)	1,12 (0,87-1,45)	8,9	1,5
	Due o più	90	174.992	44,3 (35,0-55,5)	1,41 (1,09-1,82)	25,9	2,4
2007-2011	Nessuna	37	141.359	23,5 (16,3-33,1)	1	0,0	1,3
	Una	63	202.709	27,1 (20,3-35,7)	1,12 (0,84-1,49)	6,8	1,6
	Due o più	69	162.146	31,9 (24,1-42,1)	1,48 (1,12-1,96)	22,5	1,4

MORTALITÀ per CAUSE FUMO-CORRELATE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	40	20.308	206,8 (147,3-282,9)	1	0,0	8,2
	Una	190	91.131	205,5 (177,3-237,0)	1,00 (0,82-1,22)	-0,1	7,7
	Due o più	572	232.025	235,9 (216,9-256,1)	1,14 (0,95-1,38)	72,4	9
1977-1981	Nessuna	45	25.941	167,2 (121,8-224,4)	1	0,0	5,8
	Una	222	107.223	193,6 (168,8-221,1)	1,16 (1,02-1,31)	29,8	7,4
	Due o più	632	261.096	224,2 (206,9-242,6)	1,34 (1,19-1,50)	159,1	8,9
1982-1986	Nessuna	66	34.828	175,2 (135,2-224,2)	1	0,0	7,5
	Una	298	122.834	212,8 (188,7-239,5)	1,22 (1,10-1,34)	53,0	8,8
	Due o più	628	229.501	235,6 (217,0-255,7)	1,35 (1,23-1,48)	161,2	9,6
1987-1991	Nessuna	76	46.496	158,9 (124,6-200,4)	1	0,0	7,4
	Una	294	137.636	179,0 (158,3-201,9)	1,17 (0,96-1,41)	41,8	7,2
	Due o più	574	237.638	198,3 (181,6-216,2)	1,29 (1,07-1,54)	128,0	7,5
1992-1996	Nessuna	112	68.923	160,2 (131,4-193,9)	1	0,0	6
	Una	323	167.922	171,2 (152,5-191,8)	1,07 (0,94-1,21)	20,0	7,4
	Due o più	443	208.096	182,0 (164,6-201,0)	1,12 (0,99-1,27)	48,8	8
1997-2001	Nessuna	122	83.935	139,5 (115,8-166,8)	1	0,0	5,4
	Una	322	183.779	157,0 (140,1-175,7)	1,12 (0,98-1,27)	34,2	6,8
	Due o più	384	212.447	160,0 (144,0-177,4)	1,14 (1,00-1,29)	45,9	6,9
2002-2006	Nessuna	210	124.710	151,0 (130,8-173,5)	1	0,0	5,8
	Una	356	205.623	147,8 (132,2-165,0)	0,97 (0,82-1,16)	-9,6	7
	Due o più	305	174.992	142,7 (126,1-161,2)	0,95 (0,79-1,13)	-17,4	6,3
2007-2011	Nessuna	203	141.359	121,2 (104,6-140,0)	1	0,0	4,4
	Una	329	202.709	129,8 (115,1-146,3)	1,04 (0,90-1,20)	12,5	6
	Due o più	295	162.146	138,9 (121,9-158,1)	1,11 (0,96-1,29)	30,1	5,7

MORTALITÀ per CAUSE EVITABILI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	112	20.308	531,6 (437,7-640,9)	1	0,0	47,8
	Una	653	91.131	718,0 (663,9-775,2)	1,35 (1,30-1,40)	169,9	66,2
	Due o più	1.813	232.025	809,3 (772,5-847,5)	1,52 (1,47-1,58)	623,3	74,4
1977-1981	Nessuna	111	25.941	431,5 (354,9-519,8)	1	0,0	37
	Una	632	107.223	609,5 (562,8-659,1)	1,41 (1,29-1,53)	183,1	55,3
	Due o più	1.805	261.096	723,2 (690,2-757,4)	1,67 (1,54-1,81)	724,9	65,4
1982-1986	Nessuna	175	34.828	531,4 (455,2-617,2)	1	0,0	51,6
	Una	591	122.834	516,6 (475,1-561,1)	0,99 (0,89-1,10)	-8,0	47,6
	Due o più	1.406	229.501	673,1 (637,5-710,3)	1,27 (1,15-1,40)	296,9	64,5
1987-1991	Nessuna	175	46.496	415,1 (355,1-482,6)	1	0,0	39,3
	Una	476	137.636	417,3 (380,6-456,6)	1,00 (0,93-1,08)	0,6	39,5
	Due o più	1.046	237.638	546,6 (514,0-580,8)	1,31 (1,22-1,41)	247,2	50,2
1992-1996	Nessuna	237	68.923	335,2 (293,9-381,3)	1	0,0	32,7
	Una	588	167.922	374,2 (344,5-405,9)	1,12 (0,96-1,30)	63,7	33,7
	Due o più	828	208.096	451,5 (421,2-483,4)	1,34 (1,16-1,55)	211,8	43
1997-2001	Nessuna	235	83.935	280,1 (245,3-318,6)	1	0,0	22,8
	Una	519	183.779	310,6 (284,4-338,7)	1,09 (0,93-1,27)	42,3	28,9
	Due o più	643	212.447	338,1 (312,4-365,4)	1,18 (1,02-1,38)	100,2	31,6
2002-2006	Nessuna	285	124.710	254,2 (225,6-285,6)	1	0,0	23,4
	Una	491	205.623	271,8 (248,2-297,2)	1,07 (1,02-1,13)	33,4	24,5
	Due o più	421	174.992	285,7 (258,7-314,9)	1,12 (1,07-1,18)	45,0	26,5
2007-2011	Nessuna	228	141.359	178,7 (156,2-203,6)	1	0,0	16,5
	Una	342	202.709	207,6 (185,8-231,4)	1,15 (1,07-1,23)	44,6	20,1
	Due o più	291	162.146	232,3 (205,9-261,5)	1,29 (1,20-1,39)	66,2	22,1

MORTALITÀ per CAUSE ACCIDENTALI E VIOLENTE secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	32	20.308	165,7 (113,2-235,0)	1	0,0	5,9
	Una	131	91.131	141,5 (118,3-168,0)	0,85 (0,49-1,47)	-23,6	4,4
	Due o più	381	232.025	156,2 (140,9-172,8)	0,93 (0,56-1,55)	-28,7	5,3
1977-1981	Nessuna	31	25.941	116,5 (79,1-165,8)	1	0,0	5,2
	Una	136	107.223	116,5 (97,6-138,2)	1,01 (0,73-1,40)	1,6	4
	Due o più	348	261.096	120,3 (107,9-133,9)	1,05 (0,77-1,42)	15,0	3,8
1982-1986	Nessuna	36	34.828	97,4 (67,9-136,2)	1	0,0	5
	Una	151	122.834	102,8 (86,7-121,6)	1,13 (0,78-1,62)	17,0	3,2
	Due o più	325	229.501	118,6 (105,6-133,0)	1,27 (0,90-1,79)	68,8	4,2
1987-1991	Nessuna	26	46.496	54,2 (35,0-81,0)	1	0,0	1,3
	Una	132	137.636	80,2 (66,5-96,1)	1,54 (1,01-2,34)	46,1	3,3
	Due o più	229	237.638	79,0 (68,6-90,7)	1,51 (1,01-2,27)	77,3	3,3
1992-1996	Nessuna	35	68.923	47,5 (32,8-67,0)	1	0,0	1,5
	Una	101	167.922	53,1 (43,0-65,2)	1,05 (0,71-1,54)	4,5	2,5
	Due o più	159	208.096	62,9 (52,9-74,3)	1,26 (0,87-1,82)	32,6	2,4
1997-2001	Nessuna	39	83.935	43,5 (30,9-59,8)	1	0,0	0,9
	Una	104	183.779	49,4 (40,2-60,2)	1,12 (0,64-1,95)	10,8	1,8
	Due o più	139	212.447	58,3 (48,8-69,3)	1,26 (0,74-2,17)	29,0	2,9
2002-2006	Nessuna	62	124.710	44,4 (33,9-57,5)	1	0,0	1,7
	Una	119	205.623	49,0 (40,2-59,3)	1,10 (0,81-1,50)	11,1	2,4
	Due o più	104	174.992	47,2 (38,0-58,3)	1,09 (0,80-1,50)	8,7	1,9
2007-2011	Nessuna	65	141.359	40,5 (30,9-52,2)	1	0,0	1,9
	Una	96	202.709	38,2 (30,4-47,8)	0,95 (0,73-1,23)	-5,4	1,7
	Due o più	96	162.146	41,8 (33,0-52,9)	1,13 (0,87-1,48)	11,2	1,6

MORTALITÀ per ACCIDENTI DI TRAFFICO secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	9	20.308	47,2 (21,5-90,5)	1	0,0	1,4
	Una	26	91.131	28,4 (18,6-41,7)	0,62 (0,19-2,08)	-15,7	1,2
	Due o più	97	232.025	41,2 (33,4-50,4)	0,89 (0,30-2,65)	-11,5	2,2
1977-1981	Nessuna	5	25.941	19,7 (6,4-46,2)	1	0,0	2
	Una	20	107.223	18,1 (11,0-28,2)	0,95 (0,35-2,52)	-1,2	0,9
	Due o più	59	261.096	21,4 (16,2-27,7)	1,14 (0,46-2,85)	7,4	0,9
1982-1986	Nessuna	9	34.828	25,7 (11,7-49,9)	1	0,0	1,9
	Una	26	122.834	20,0 (12,9-30,1)	0,80 (0,38-1,71)	-6,4	1,2
	Due o più	51	229.501	20,8 (15,4-27,9)	0,84 (0,41-1,70)	-9,9	1,2
1987-1991	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
1992-1996	Nessuna	8	68.923	10,5 (4,5-21,8)	1	0,0	0,6
	Una	18	167.922	10,2 (5,9-16,4)	0,88 (0,44-1,75)	-2,4	0,8
	Due o più	28	208.096	11,9 (7,7-17,7)	1,08 (0,56-2,07)	2,0	0,6
1997-2001	Nessuna	8	83.935	9,1 (3,9-18,3)	1	0,0	0,4
	Una	17	183.779	8,7 (5,0-14,3)	0,95 (0,41-2,21)	-0,8	0,4
	Due o più	15	212.447	7,2 (4,0-12,2)	0,72 (0,31-1,71)	-5,7	0,7
2002-2006	Nessuna	14	124.710	9,6 (5,2-16,6)	1	0,0	0,1
	Una	19	205.623	8,9 (5,2-14,3)	0,79 (0,30-2,09)	-5,1	0,6
	Due o più	16	174.992	8,1 (4,5-14,0)	0,76 (0,28-2,09)	-5,1	0,4
2007-2011	Nessuna	10	141.359	5,9 (2,7-11,5)	1	0,0	0,3
	Una	10	202.709	4,7 (2,1-9,4)	0,67 (0,28-1,60)	-5,0	0,3
	Due o più	5	162.146	2,2 (0,5-6,9)	0,40 (0,14-1,18)	-7,4	0,2

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente

MORTALITÀ per CADUTE E ALTRI INFORTUNI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	16	20.308	84,2 (48,1-137,7)	1	0,0	1,9
	Una	81	91.131	86,4 (68,6-107,5)	1,02 (0,59-1,74)	1,3	1,3
	Due o più	251	232.025	101,0 (88,8-114,3)	1,17 (0,71-1,95)	37,2	2,2
1977-1981	Nessuna	22	25.941	81,7 (51,2-124,2)	1	0,0	2,4
	Una	101	107.223	84,2 (68,5-102,6)	1,04 (0,66-1,65)	4,0	1,8
	Due o più	242	261.096	80,6 (70,7-91,6)	1,00 (0,65-1,55)	0,0	1,4
1982-1986	Nessuna	20	34.828	52,0 (31,6-81,9)	1	0,0	1,8
	Una	101	122.834	63,5 (51,6-77,9)	1,33 (0,67-2,65)	25,1	0,5
	Due o più	223	229.501	76,9 (66,9-88,3)	1,53 (0,79-2,94)	76,8	1,7
1987-1991	Nessuna	17	46.496	33,5 (19,3-55,2)	1	0,0	0,3
	Una	82	137.636	45,1 (35,5-56,9)	1,40 (0,83-2,36)	23,5	1,2
	Due o più	156	237.638	49,5 (41,6-58,6)	1,50 (0,91-2,47)	51,9	1,3
1992-1996	Nessuna	21	68.923	27,8 (17,0-43,6)	1	0,0	0,4
	Una	52	167.922	25,2 (18,6-33,6)	0,85 (0,51-1,41)	-9,4	0,7
	Due o più	84	208.096	30,1 (23,6-38,0)	1,02 (0,63-1,64)	1,5	0,7
1997-2001	Nessuna	24	83.935	26,8 (17,2-40,3)	1	0,0	0,5
	Una	61	183.779	26,9 (20,5-35,0)	1,01 (0,63-1,63)	0,9	0,4
	Due o più	84	212.447	32,4 (25,7-40,5)	1,17 (0,74-1,85)	12,3	0,8
2002-2006	Nessuna	26	124.710	17,1 (11,1-25,6)	1	0,0	0,3
	Una	65	205.623	23,5 (17,9-30,6)	1,39 (1,10-1,76)	18,2	0,5
	Due o più	63	174.992	25,6 (19,3-33,7)	1,49 (1,18-1,90)	20,8	0,6
2007-2011	Nessuna	36	141.359	21,2 (14,7-30,0)	1	0,0	0,6
	Una	60	202.709	20,4 (15,3-27,1)	1,03 (0,72-1,45)	1,5	0,4
	Due o più	63	162.146	24,9 (18,7-33,4)	1,27 (0,90-1,79)	13,2	0,5

MORTALITÀ per SUICIDI secondo la DEPRIVAZIONE INDIVIDUALE e il periodo di calendario.
Torino, 1972-2011. Donne 65-84 anni. Gli indicatori di occorrenza, associazione e impatto sono controllati per età.

PERIODO	Deprivazione Individuale	Osservati	Anni persona	Tasso std di mortalità x 100.000 (lim. conf. 95%)	Rischio relativo (lim. conf. 95%)	Morti attribuibili	Tasso std anni di vita persi x 1.000
1972-1976	Nessuna	5	20.308	24,3 (7,9-58,6)	1	0,0	1,9
	Una	19	91.131	21,1 (12,7-32,9)	0,85 (0,32-2,28)	-3,3	1,6
	Due o più	21	232.025	9,0 (5,6-13,9)	0,37 (0,14-0,98)	-35,7	0,6
1977-1981	Nessuna	4	25.941	15,1 (4,1-39,3)	1	0,0	0,8
	Una	14	107.223	13,2 (7,2-22,4)	0,85 (0,44-1,67)	-2,4	1,1
	Due o più	37	261.096	14,5 (10,2-20,0)	0,93 (0,50-1,74)	-2,8	1,2
1982-1986	Nessuna	6	34.828	16,3 (5,9-37,0)	1	0,0	0,8
	Una	16	122.834	12,7 (7,1-21,5)	0,74 (0,44-1,25)	-5,5	0,9
	Due o più	35	229.501	14,2 (9,7-20,3)	0,86 (0,53-1,40)	-5,6	0,9
1987-1991	Nessuna	4	46.496	9,9 (2,6-26,2)	1	0,0	0,4
	Una	22	137.636	15,3 (9,4-23,8)	1,78 (0,61-5,17)	9,6	0,9
	Due o più	38	237.638	15,6 (10,9-21,8)	1,76 (0,63-4,95)	16,5	1
1992-1996	Nessuna	4	68.923	5,8 (1,6-15,9)	1	0,0	0,3
	Una	21	167.922	12,6 (7,7-19,5)	2,02 (1,03-3,94)	10,6	0,8
	Due o più	28	208.096	12,4 (8,1-18,3)	2,11 (1,09-4,08)	14,7	0,6
1997-2001	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
2002-2006	Nessuna	10	124.710	8,7 (4,1-16,1)	1	0,0	0,9
	Una	14	205.623	6,7 (3,5-11,7)	0,86 (0,38-1,95)	-2,2	0,6
	Due o più	11	174.992	6,0 (2,9-11,5)	0,80 (0,34-1,90)	-2,7	0,4
2007-2011	Nessuna	8	141.359	5,6 (2,4-11,5)	1	0,0	0,5
	Una	15	202.709	7,9 (4,3-13,6)	1,35 (0,57-3,19)	3,9	0,6
	Due o più	11	162.146	7,6 (3,6-14,7)	1,26 (0,50-3,14)	2,3	0,7

n.c.: non calcolabile per numero di casi insufficiente