

SEZIONE 10

MORTALITÀ

SECTION 10 – MORTALITY

Nel biennio 2015-2016 sono deceduti complessivamente 102 pazienti (49 maschi e 53 femmine); sono 8 i decessi riportati fra i pazienti di età inferiore ai 18 anni (il 7,8% dei decessi) (tabella 10). L'età mediana al decesso nel 2015-2016 è stata di circa 37,7 anni (incluso anche i pazienti trapiantati), mentre nel periodo 2011-2014 è stata di 32 anni² e nel 2000-2004 di 23,2 anni: nel solo 2016, escludendo i pazienti sottoposti a trapianto, l'età mediana al decesso è stata di 36,5 anni.

La figura 29 mostra il tasso grezzo di mortalità che varia dall'8,5 per mille nel 2015 al 10,9 per mille nel 2016; se si escludono, però, i trapiantati, il tasso grezzo rimane costante e uguale al 6,2 per mille.

La tabella 11 mostra le cause principali di decesso: la principale causa di morte, nel periodo 2015-2016, è stata l'insufficienza respiratoria (circa il 57% del totale). La complicanza post-trapianto è stata la seconda maggiore causa di decesso (il 23,5%); circa il 16% dei decessi è stato causato da comorbidità e complicanze non correlate alla fibrosi cistica.

ETÀ AL DECESSO (ANNI)	MASCHI	FEMMINE
0-1	–	–
2-6	–	1
7-17	2	5
18-35	15	22
≥36	32	25
Total	49	53

Tabella 10. Distribuzione dei decessi, per età e sesso. Anni 2015-2016
Table 10. Distribution of patients deceased, per year and sex. 2015-2016.

CAUSA DEL DECESSO	n.	%
Insufficienza respiratoria	58	56,9
Complicanze post-trapianto	24	23,5
Non inerenti la fibrosi cistica	16	15,7
Insufficienza epatica	2	2,0
Missing o sconosciute	2	2,0
Totale	102	

Tabella 11. Distribuzione dei decessi, per causa. Anni 2015-2016.
Table 11. Cause of death distribution, by year. Years 2015-2016.




Figura 29. Decessi per anno e per trapianto. Anni 2015-2016.
Figure 29. Deaths by year and transplantation. Years 2015-2016.