

SEZIONE 7

COMPLICANZE

SECTION 7 – COMPLICATIONS

Il miglioramento della qualità dei dati e la conseguente riduzione dei dati *missing* (dal 30% in età pediatrica e superiore al 10% per gli adulti negli anni precedenti)² intorno all'1,2% permette di trarre stime stabili circa la prevalenza delle complicanze nel gruppo di pazienti FC in Italia, come mostra la **figura 24**.

L'indicatore sull'insufficienza pancreatica viene calcolato partendo dall'assunzione degli enzimi pancreatici. La pre-

valenza dei pazienti pancreas insufficienti è inferiore rispetto a quella indicata in altri registri (per esempio, per l'anno 2016: 86,3% riportato nel rapporto americano,¹¹ 81,9% nel rapporto francese¹²), verosimilmente come conseguenza della diversità genetica fra le diverse popolazioni.

In precedenza, come mostra la **figura 25**, questa prevalenza era comunque sottostimata a causa della presenza di numerosi *missing*.




Figura 24. Prevalenza delle complicanze più comuni in pazienti pediatrici (n. 2.324) e adulti (n. 3.038). Anno 2016.
Figure 24. Prevalence of the most common complications in paediatric (No. 2,324) and adult (No. 3,038) patients. Year 2016.




Figura 25. Distribuzione dei pazienti con e senza insufficienza pancreatica, per anno. Anni 2015-2016.
Figure 25. Distribution of patients with pancreatic insufficiency and sufficiency, by year. Years 2015-2016.